

Emberiza calandra.

- 7-VII-47 - Una familia en La Rubia.
- 1948 - Fines de Enero, Laguna de Duero. Bastantes dispersos entre las charcas. Parecen menos que en Noviembre y Diciembre.
- 5-X-48-- Conseguimos en primero que tengo. Nº 129. Hay en Zaratán bandos de unos 15. A causa del error de las tablas de Latget llamaré a él desde ahora a esta especie.
- 10-X-48 - Zaratán. Muerto otro individuo, solitario que conservo en piel. Es muy posible que todas las citas de los que hasta ahora llamamos Melanocoripha calandra.
- 24-XII-48- Laguna. Hay bastantes.
- 27-II-49 - Magaz (Palencia). aun algunos a orillas del Duero.
- 3-IV-49 - Laguna. Hay algunos.
- 19-IV-49 - Laguna. Encuentro por doquier o cantando con chillido monótono (guardo notación) en los caños altos, amtorrales y alguno en alambres. Es verdaderamente abundante. Se trasladan muy de vez en cuando con vuelo tembloroso a punto para seguir cantando. Desde las 9 hasta las 14 h. no lo dejaron, hacia la última hora ya cantaban menos. Peleas de o, con duda. Probablemente ya incuban.
- 23-IV-49 - Laguna. ~~de En~~ ~~el~~ día lluvioso cantaban menos. No llovió mas que unas gotas a intervalos.
- 8-V-49 - Medina del Campo. Establecidos allí.  
Burgos. Huevos y crias a mediados de Junio.
- 26-VI-49 - Toro. Crias grandes.
- 9-X-49 - Burgos. Una albina matan.
- 22-IV-50 - Zaratán. Dicen ya hay huevos.
- 23-IV-50 - La Fraila (hasta ella). Solo las vemos menos abundantes que Calandrella, Lullula y Galerida, en terrenos cultivados, llanos posados en algún mato. Falta o escasean en partes más húmedas y pedregosas.  
A fines de Mayo (día 29) cantan mucho los ♂ en Laguna, los o incuban. Traen ahora muchos huevos, finca de Miranda.
- 13-V-50 - Zaratán. Nido con 5 huevos en un prado junto a un arroyo.  
La Fraila. Julio y Agosto. Solo hay en el arroyo.
- 31-III-51 - Ya cantan los ♂♂, pero aún están en grupos y en los cables o tierras. Aún no hay ninguno en el sitio en que anidarán.  
Anida en los alrededores de Burgos.
- 19-IV-51 - Laguna. Dispersos por los puntos de nidificación. Cantan los ♂, levanto uno entre los juncos y no encuentro nido. Andan mas por tierra firme que M. flava.
- 15-V-51 - Laguna. Ver notas.
- 28-V-51 - Zarat'an. Ver notas. Común en los valles.
- IX-51 - Fuensaldaña. Ver notas.

Emberiza calandra.

- 1951 - Primeros de Octubre, Les encuentro comunes en Wamba y dispersos por doquier (en bandito). Levanto muchos del prado, entre cardos, y en las orillas del arroyo. En las tierras hay pocos, sustituidos por Galerida. Es quizá la sp. más común.
- 15-II-52 - Wamba. Ya comunes en el prado. Han faltado en las visitas de Enero y fin de año.
- 20-22-II-52 - Laguna. Sufruticetum. (Nota).  $\circ\circ$  cantando, pleno celo, y iniciando dispersión y localización. Veo muchos más que en diciembre, quizá por ser más ostensibles. El día 4 de Marzo, aún no han invadido graminetum. El día 25 de Marzo, tampoco, pero ya más extendidos, parejas cantando a más y mejor.
- 16-IV-52 - Solo una media docena en el arroyo de Wamba.
- 19-V-52 - Laguna. Casi solo veo  $\circ$ , cantando poco pero con vuelo de mariposa. En plena incubación en apariencia.

Como Emberiza Calandra, pero más pequeños. Son Emb. calandra, según Bernis.

- 4-I-48 - Un bando de unos 12 en las matas, junto a una pradera cultivada, en valle. Burgos. Creo haberlas conseguido en Zaratán, en Noviembre. Comparados en el Museo con Bernis resultaron E. calandra.
- 8-II-48 - La Cistérniga. Varias parejas, tríos y pequeños bandos, el mayor de 16 individuos. Había muchas cantando en cardos y alambres de telegrafo.
- 4-III-48 - Laguna de Duero. Sueltas, como siempre, algunos individuos.
- 2-VII-48 - Laguna de Duero. Sabemos donde hay un nido desde hace tiempo.

*Eub. calandra.*

Habitat.

Común en los <sup>suavos</sup> jardines riberanos donde coexiste con *M. flava*, anidando en lugares algo más secos y alejados del agua que esta. Abunda también en los grandes ~~huertos~~ <sup>por</sup> cereales y huertas del valle constituyendo una especie de transición entre el *cardo* <sup>verde</sup> y el campo ultimateño o *cardi. verde* en que ~~abunda~~ <sup>abundancia</sup> *calandrella*. En el páramo se la encuentra con relativa <sup>abundancia</sup> ~~facilidad~~ en cuanto una pequeña extensión de regadío rompe la monotonía del trigal ~~inverso~~. Su habitat coincide pues con el de *lectura*, aunque su dispersión no sea tan general como la de esta última especie.

Seis. Toda clase de arbolado, preferentemente el *carduifolius*. La máxima abundancia corresponde al *seto*, donde es sin duda el *fringilido* más común, abunda aún en los ~~linderos~~ <sup>de</sup> arbolado <sup>de</sup> *berquillos* y *avenas* en pinar. Es ~~común~~ <sup>poro común</sup> en *espineros* y *esmercales*, *robledos*.

*Acanthis* muy disperso por terrenos semi-áridos con anatural esuro, cultivos de *avena* y *regado*, huertas *viñedos* etc. <sup>(P.)</sup> atendiendo ~~al~~ <sup>al</sup> ~~predominio~~ <sup>predominio</sup> de la extensión de estas modalidades <sup>de</sup> *fauna* regional <sup>de</sup> *fauna* global de *pardillos* es muy elevado, lo que se ~~ve~~ <sup>ve</sup> ~~claro~~ <sup>claro</sup> de vez durante el invierno, cuando ~~se~~ <sup>se</sup> ~~repartidos~~ <sup>repartidos</sup> en pequeños bandos ~~en~~ <sup>en</sup> ~~los~~ <sup>los</sup> ~~campos~~ <sup>campos</sup> ~~se~~ <sup>se</sup> ~~encuentra~~ <sup>encuentra</sup> muy abundante, sin embargo, buena parte de estas *piegas* ~~se~~ <sup>se</sup> ~~reducen~~ <sup>reducen</sup> a la *forma* típica <sup>se</sup> ~~en~~ <sup>en</sup> ~~invernantes~~ <sup>invernantes</sup> ~~extranjeros~~ <sup>extranjeros</sup>, como ~~comproban~~ <sup>comproban</sup> los *abunda* en ningún punto.

Emberiza calendra. (L)

Muy localizada en terrenos bajos y húmedos, donde se la puede considerar común. Su biotopo coincide casi con el de *M. flava*. ~~cetero de donde más por la confusión.~~

En Laguna de Duero es común durante todo el año, en invierno recorren las tierras arregadas, como podía hacerlo casi un *Sedopacidae*, aunque no penetra en los charcos.

A ~~fin de Marzo~~ <sup>orava</sup> ~~del 1949~~ ~~estaban~~ ya los ♂ en pleno celo, lanzando su chillido al aire desde los matos destocados de la pradera. Vimos persecuciones y riñas. Hemos cogido pollos y huevos a mediados de Junio.

Desde Septiembre los vemos más dispersas y abundantes, generalmente en pequeños bandos.

Emberiza cirrus. (L)

Poco común como nidificante, hemos encontrado huevos a mediados de Mayo. Desde fines de Septiembre hasta fines de Febrero, ~~Son~~ ~~abundantes~~ abundantes, en grupos y pequeños bandos que se reúnen ~~con frecuencia~~ con el resto de *Fringilidae* ~~invernantes~~. ~~Una excepción de Fr. coelebs~~ ~~Es el más común de los granívoros.~~

Hemos recibido <sup>un pollo</sup> ~~una~~ *Emberiza hortulana* muerto en Villabragima a fines de Agosto. Es seguro que se encuentran en Valladolid, donde lo habremos confundido con *E. cirrus*,

(1) y de *Carduelis*

Emberiza cia. (L)

La hemos visto en la Fraile y otras localidades poblados de pinos desde ~~2~~ ~~de~~ ~~Octubre~~ ~~a~~ ~~fin~~ ~~de~~ ~~Enero~~ en bandos numerosos. ~~Ne~~ ~~conocemos~~ ~~las~~ ~~fechas~~ ~~de~~ ~~partida~~, ~~pero~~ ~~hay~~ ~~seguramente~~ ~~a~~ ~~fin~~ ~~de~~ ~~Septiembre~~.  
Ea hemos visto ~~as~~ ~~menudo~~ ~~asociada~~ a *Fringilla coelebs*.