

Galerida cristata

- 27-V-47 - Laguna de Duero. Cazando un insecto grande.
- 27-VI-47 - Nido en un campo de cebada. Estaba dentro de una ligera depresión, contenía 4 crias en cañones y pluma y un huevo huero.
- 2-VII-47 - Arrabal de Portillo. Con cebo en el pico.
- 9-XI-47 - Colección pieles nº 94. o.
- 8-II-48 - Un individuo. Ver colección pieles nº 9.
- 8-II-48 - Colección pieles. o. Cont. est.-
- Insectos.
Tiene el nº 97.
- 10-II-48 - Hay muchos individuos sueltos y en pequeñas bandadas.
- 18-VI-48 - Una cria colicorta recién salida del nido.
- 21-VI-48 - Un nido con 4 huevos frescos, nº 98 de la Ooteca, en la cuesta de la Maruquesa, en un trigal. Quizá todo esto pertenezca a Alauda arvensis.
- 15-VIII-48 - Un joven que volaba poco, probablemente por estar en plena muda. Andan ahora en pequeños grupos, probablemente familias. Le conservo enjaulado.
Fines de Septiembre, hay bastantes en parejas y tríos.
- 1949 - Abundantes en Enero, pero no en bandos.
Enero y Febrero, algunas muertas en la cañada por Accipiter nisus.
- 20-IV-49 - Laguna. Se persiguen los ♂♂ pegándose.
- 21-V-49 - Zaratán. Nidos con huevos y uno con dos crias.
- 30-XII-49 - Una muy rojiza cobrada en la Maruquesa.
Zaratán, anidan muchos en las remolachas, en las alfalfas en los espinos, junto a los cardunchos en los linderos. Algunos en los trigos y en las viñas.
- 8-III-50 - Una en la otra orilla. ¿No han emparejado?
- 13-III-50 - Cantan.
- 23-IV-50 - Hasta La Fraila. Es el Alaudidae más común, pero no lo veo emparejado, en los terrenos algo secos y llanos. Quizá sea más común Calandrella en campos cultivados.
Julio y Agosto. En La Fraila, no hay ni una, solo en tierras y Hoyo del Muerto.
- 1951 - A fines de Marzo ya están emparejadas y cantan a más y mejor.
- 14-V-51 - Wamba. Hasta la subida al páramo muy común. En el páramo, ni una. Ninguna en las cuestas de las Contiendas, donde la sustituye Calandrella.
- 15-VI-51 - 5 huevos frescos. Ooteca nº 79. Cebaba, hueco de 10 cms. en el Cabildo.
- 19-VI-51 - Santovenia. Nido con 4 pollos grandes. Nota y dibujo en trigal.

Galerida cristata.

- VIII-51 - Se confirma lo del año pasado. No las hay en el pinar de Las Frailla ni en las tierras pedregosas, pero si cerca del pueblo.
- 31-X-51 - En Octubre cantan igual. Ver nota. Puente Duero. Cobrada una.
- 1952 - Ya cantan a fines de Enero.
- 23-III-52 - Nota de La Frailla. A lo largo de la carretera, el ave más común, en parejas la mayoría de las vistas, no se si todas. Aún no hay Calandrella. Su habitat, terrenos desforestados, entre campos de cereales, algunos en el páramo pedregoso, no se si igual en el valle.
- 11-VI-52 - Finca Pili. Nido de profundidad, pollo grande ya cavidad de 6 dedos de \emptyset xrx3 hierbecillas, trigo, con un escapado.
- 19-VI-51 - Santovenia.

El nido estaba justo a ras del suelo, de modo que relleno de pollos aplastados no se notaba diferencia de nivel.

El plumaje rayado de estos, con el plumón amarillento y los bordes del nido alisados contra el suelo se distinguían a la perfección, a pesar de ser ralo el sembrado.


Santovenia, trival 4 crias que ya se dispersaban. Esquema del nido de Galerida cristata.

Los pollos ya casi emplumados conservaban plumón cabeza (lateral sobre los ojos) y escapulares y regiones posteriores. Después de cogerles no hubo modo de hacerles permanecer en el nido. Se alejaban enseñada saltando agilmente y en silencio, en diferentes direcciones. Me dijo el labrador que siempre ocurre igual. No les cogen; sabía otros 5 nidos más con huevos y uno vacío. Hace 4 días cogimos puesta -- ffresca.

19-VI-51. Santovenia

Galeriola cristata.


El nido estaba justo a ras del suelo. Se veían que se llenó de pollos apretados no se notaba dif. de un nido. El plumaje rayado de estos, con el plumón amarillento y los bordes del nido alisados contra el suelo ~~ya~~ ~~se~~ ~~discretaban~~ a la perfección a pesar de ser raso al sembrado.



Santovenia. tripal. 4 crías que ya se dispersaban. Esquema nido Galeriola cristata.



pollos. mt. nel hecho.



Los pollos ya van en plumadas. conservaban plumón cabecera (lateral sobre ojos) y exopalmos y regiones posteriores. Después de cogidos no hubo modo de hacerles permanecer en el nido. Se dejaban escarpiados saltando agilmente con silencio, en diferentes direcciones. Me dijo el labrador que siempre ocurre igual. No les cogues; había otros 5 nidos más con huevos y uno vacío. Hare 4 días cogidos puestas frescas