

Turdus viscivorus

- 2-VI-42 - Un nido formado con pajas, ramas y barro, este último más abundante en el interior, se encontraba sujeto en la bifurcación de una gruesa rama de chopo, a unos 10 m. altura. Contenía 4 huevos con feto bastante desarrollado. Ver Coteca nº 11.
- 22-IV-43 - Un nido a orillas del Pisuerga en un chopo, a bastante altura. Contenía huevos.
- 24-IV-43 - En el mismo sitio, otro nido con pollos muertos y un huevo.
- 8-VII-43 - Traen cria ya emplumada de las Moreras.

Todos los nidos de T. viscivorus encontrados estaban contruidos sobre chopos, olmos o álamos, en las orillas del Pisuerga, generalmente a bastante altura.
Abunda en los pinares en los meses de Agosto y Septiembre en grandes bandos.

- 5-VIII-46- Montemayor de Pililla. Muertas 6 de un bando de una docena en un bebedero.
- 27-VIII-46- La Fraila (Montemayor de Pililla) otros 7 de un bando de 10. En bebedero.
- 29-VIII-46- En el mismo sitio, matamos 11 de un bando de unas 20.
- 3-IX-46 - En el mismo sitio, muertas 10 de otro bando igual.
- 4-IX-46 - Muertas 5 en el mismo sitio de otro bando pequeño. Todos estos bandos se reunian en un pinar de albares.
- 2-V-47 - A 1'5 de altura fué encontrado un nido conteniendo 4 huevos poco empollados. La madre se dejó coger en el nido, acercándose por detrás. Cogido en un chopo a orillas del Cega. Valladolid. Ver Coteca, nº 56.
- 4-VI-47 - Me entró una a Otus scops, una mañana de viento y niebla, en las orillas del Pisuerga. Ese mismo día cazada una a la cucaracha. Colección pieles, nº 46.
o. Cont. est. -
- pequeños coleopteros, semillas y dos titos de guinda.
- 28-II-48 - Se vieron algunas en La Fraila (Montemayor). Algunos individuos se mezclaban con los bandos de T. pilaris durante el invierno. (Vease T. pilares).
- 22-II-48 - Con nieve, solo se ven un par de ellos a orillas del rio, mientras abunda T. merula y T. philomenus.
A fines de Enero de 1947, Con tiempo de nieve, una pareja a orillas del Pisuerga. Abundan bastante T. merula y T. philomenus.
- 10-III-48 - Emparejados a orillas del Pisuerga.
- 6-V-48 - A orillas del Cega, un nido con 4 huevos bastante empollados. El nido, sobre un chopo inclinado, a unos 3 m. de altura estaba hecho con raicillas y una capa exterior de ramas. Era bastante visible.

Turdus viscivorus

- 1943 - Primeros de Junio. Hay bastantes anidando en el paseo de Las Moreras, a orillas del río.
- 2-XI-48- Una pareja al menos en el soto del Pisuerga.
- 27-II-49- La Fraila. Bandos numerosos .
- A primeros de Marzo, no hay pocas a orillas del río.
- 13-III-49- La Fraila. Bando de unos 20 en el pinar.
- A primeros o mediados de abril andan ya chillando emparejados por el soto del Pisuerga. Hacia el 17 me parecieron establecidos en los álamos de la barriada nueva, chillan mucho.
- 26-VI-49- Toro, un nido en chopo, contra el tronco, a orillas del Duero, ¿con crías?
- 17-XI-49- Pareja a orillas del Pisuerga.
- 4-IV-50- Pinarillo. Parejas a orillas del río.
- 5-IV-50- Parejas en la otra orillas del río. Ya han llegado a los puntos de cría.
- 9-IV-50- La Fraila. Ya no las hay. Por lo tanto es seguro que son subemigrantes.
- 23-IV-50- No vemos ninguna hasta La Fraila. Dice Justo que anidan algunas en los pinares (negrales?)
- 5-V-50- Pinarillo. Un nido, con 4 huevos, a 1'50 m. en chopo inclinado, en el soto, otro en un olmo, contra el tronco, junto a los despojos de crecidas, sin huevos pero terminado.
- Van a La Fraila a fines de Julio y primeros de Agosto.
- 9-VII y 17-VIII-50- La Fraila. No se ven en bandos, aunque quizá haya. Hay poco.
- 1951- Agosto. La Fraila. Durante todo el mes se nota creciente afluencia de charlas. Como anidan pronto, de ser dispersión de juv. se hubiera notado antes. Abundan menos en Agosto que en invierno sin embargo.
- 21-X-51 - Comunes en La Fraila. El 28 en Laguna pinar, algunos menos que ericetorum y merula, ambos claro paso.
- 10-I-52 - Abundancia en La Fraila. Se ha visitado pocas veces este invierno pero hasta hoy no se ha notado los invernantes claramente. Es probable que hayan llegado a fines de Diciembre.
- 24-II-52- La Fraila y pinares del camino. Comunes, probablemente hay invernantes. Cobrada una, en piel.