

Falco tinnunculus L.

- 26-XII-42 - Un ♂ cogido con red, al lanzarse a los jilgueros de reclamo. Esto no es nada raro. *La Cañada.*
- 28-VI-43 - San Pedro de Latarce (Valladolid). Cogen 2 crias ya emplumadas pero con plumón en la cabeza en el tejado de la fabrica. Me traen una, que es la primera que veo y crío.
- 29-VII-44 - La Fraila (Montemayor de Pililla). En un nido de marica, en un pino albar, tenía tres crias ya en plumón.
- 6-VIII-46 - La Fraila. Crias colicortas, que todavía andaban con los padres. Crié una de ellas.
- 15-IX-46 - Carabanchel. Quizá primillas, muy probable. Veo el primero. El 22 ya comunes.
- 15-VI-47 - La Fraila. Le pareció a Cesar oír crias en nido.
- 20-VII-47 - La Fraila. Tres crias, una de ellas en plumón y las otras dos cañones. Había mucha diferencia de color entre ellas. En un nido de marica.
- 29-IX-47 - Las Frailas conseguimos un beherido en un gala, la crío un par de meses.
En La Fraila, pinar de albares con alguna encina, F. tinunculus anida siempre en nidos viejos de marica, con capota o sin ella. Parece ser que ponen en nidos de marica que conservan la capota, que se va deshaciendo poco a poco cuando las crias se van haciendo grandes, de tal modo que al estar estas volanderas, el hueco medio relleno y las paredes destruidas le hacen parecer plano. Las crias se ven bien desde abajo, ya que agman continuamente la cabeza por los bordes. Hemos visto a los padres llevando una musaraña al nido.
Anidan indistintamente en pleno pinar o en los pinos de los bordes de las tierras próximas al pinar.
En La Fraila, F. tinnunculus es quizá algo más abundante que F. subbuteo. Creo que la misma proporción existía en el resto de los pinares.
- 21-XI-47 - Dos muy grises, en las orillas del Pisuerga.
- 5-I-48 - Laguna de Duero. Vimos un individuo.
- 1-II-48 - Villanueva de Duero. Un individuo.
- 15-II-48 - En el embalse del Esla (Zamora), un ♂ joven, la cabeza empieza a grisear, así como la cola, y en el dorso se ven mezcladas las plumas rojo-amarillentos de joven con los grises avinados de los viejos.
Cont. est. -
- !27 grillos y 5 ó 6 saltamontes!
Fué muerto al atardecer, posado en un árbol. Había muchísimos en un monasterio, 5 grillos más en el buche.

Falco tinnuculus L.

- 8-VIII-48 - Un ♂? colicorto. Tiene ya grisacea la cola.
He visto hace una semana otra cria con la cola ya larga.
- 31-VIII-48 - Con duda, una familia de 6 en la carretera de Zaratán, posados en arboles bajos, parecían volar poco.
- 26-IX-48 - Montemayor de Pililla. Se ven 3 ó 4.
- 2-X-48 - Villanubla. Una ♀ muy grande.
Cont. est. -
- Una scolopendra cingulata (no mositans) de unos 8 cms. de long.
- Una docena de grillos, y media de saltamontes y otros ortopteros.
Cont. est. - Conservado.
- XII-48 - Fines de Diciembre, Burgos. Un ♂ y una ♀, la última grandes cantidades de grillos y el primero 2 grillos, un roedor como un topillo, un insecto. ~ 40?
- 27-II-49 - Magaz (Palencia). Una pareja y un solitario.
- 4-IV-49 - Parecen cernícalos y no primillas los que sobrevolaban la Laguna de Duero, lejos del pueblo.
- 10-IV-49 - La Fraila. les encontramos observantes allí y en todo el camino hasta el límite de Segovia. Es común.
Abundante en Abril en Burgos.
- 15-V-49 - Medina del Campo. Me traen tres huevos frescos. El día 7, decían que aún no habían puesto.
- 19-V-49 - Empollaba uno en el Pinar, cerca del cuartel de Aviación. Por allí cerca cogieron un nido el 25 con huevos frescos.
- 8-VI-49 - Maruquesa, volaba uno junto a los restos de un mulo muerto, acompañando a dos M. milvus.
A fines de Junio tienen muchos crias en Medina.
- 10-VII-49 - Medina. un nido en albar a 6 ms. de altura con 4 crias apuntando plumas, los chavales tienen allí muchos, casi todos con plumón, unos apuntando la cola y otros mas emplumada. Algunos ya completamente. Hay muchísimos.
- 13-VIII-49 - Un ♂ del año mudando a viejo, quizá 4 rectices centrales, de sarrollados del todo y los 2 externos, a medio de medio crecimiento. Mudadas remiges primarias y todas las centrales - secundarias, excepto las dos iniciales y terminales, con las coberteras primarias y secundarias correspondientes y parte de los pequeños coberteras del ala. El cap. mudados Pecho y vientre empezando crec.
- 26-IX-49 - Cabezón. Un bando de (10), probablemente cernícalos, quizá primillas.
- 11-IX-49 - Según Tonono, unos 12 en bando, al N. de Burgos.

Falco tinnunculus L.

- 14-IX-49 - Orbaneja del Castillo (Burgos), un bando, de 30, dotro de 12, otro de 6 y una pareja, todos en el mismo valle.
- 28-IX-49 - Cabezón, un bando de 10 y solitarios. Aún no se han marchado.
- 2-X-49 - La Fraila. Bando de 6, Otros sueltos. Tres días más tarde otro bando.

Desde el 28-IX al 13-X, en sitios extraños, probablemente invernales llegados en Burgos (Saez-Royuela).

Quizá lo mismo en Valladolid, ya no hay bandos a mediados de Octubre. Después no vemos.

- 15-XI-49 - Palencia, ♂ invernante. Cabeza gris rojiza, rayada. Cola y uropigio gris. Completamente mudado. Ala, 243 mm. Cola, 165 mm. 245 mm.
- Cont. est. -
- Un Gryllus y un Sturnus, probablemente vulgaris.
- 20
-XI-49 - Uno caza gorriones sobre la capital.
- 2-XII-49 - Poza (Burgos). Mata uno Medina. Enero y Diciembre, bastantes en la capital.

- I-50 - Permanece unos 15 días en la finca de Pinacho, en la segunda mitad del mes.
- 10-III-50 - En todo el día hasta los 3 Hermanos, solo vemos un macho. !~~Es~~ la única rapaz!
- 31-III-50 - Un ♂ en la laguna. Ala, Cola,
- 23-IV-50 - Hasta La Fraila les vemos comunes, aunque no distingo bien de naumannii, que abunda en Aldeamayor. A excepción de Pica es el ave de tamaño mediano más común en los pequeños pinares, llanuras cultivadas, etc. Una ♀, cobrada al atardecer, sobre un poste. Pl. raído, bonito color rubio.
- Cont. est. -
- 2 Gryllotalpa.
- 3 saltamontes
- 3 grandes gusanos.
- 4 escarabajos rayados, de los negros.
- 1 pelotero negro.
- 4 ó 5 Gryllus y otro coleóptero.

Plumaje algo raído ya, con un bonito tono bronceado rojizo o rubio.

- 1-V-50 - Burriel (Burgos). Un nido con 6 huevos, en el hueco de un puente. Restos de 2 ó 3 Coturnix, una rana, un Sturnus y más aves tamaño pequeño-grande.
- 6-VI-50 - Medina del Campo, tres nidos. Uno en pino albar a 6 ms. con 4 huevos frescos. Otro en albar a unos 4'5 ms. con 6 huevos, casi para salir, uno muy claro (Coteca nº) y otro en negro, la ♀ echada. Uno en el centro del pinar, otros dos en lindes con trigos y prados. Unos en parte rala y otros - no.

Falco tinnunculus

3-V-50 - Burgos.

Nido de Cernicalo. Examen de restos.

<u>Coturnix coturnix</u>	2
<u>Sturnus</u>	1
<u>Muscicapidae</u> <u>Acrocephalus arundinaceus</u>	1
<u>Passer domesticus</u> ♂ ad.	1
<u>Alaudidae</u> <u>Anthus</u>	1
<u>Alaudidae</u> <u>Galerida</u> prob.	1
<u>Rodentia</u> , pequeño	1
<u>Lacerta ocellata</u> , al.menos.	1
<u>Rana</u> o <u>Bufo</u>	3
<u>Arvicola sapidus?</u>	1
<u>Forphiculo</u>	1
<u>Coleópteros</u> , varios.	

El nido estaba habitado al menos desde hace 5 años. Tenía entonces puesta completa. (6 huevos). Todos los restos de años anteriores. En un agujero del puente sobre el Arlanzón.

17-~~XX~~-50 - Palencia.

XI 3

♀ de este año, plumaje juv. solo mudado en el dorso, parte de la cabeza y parte cobertera superior de la cola y obispillo y parte de región inferior. Plumas grandes plumaje viejo.

Cont. est. -

- Contando Grillidae por cabezas, única parte que se conservaba bien. Acrididae por cabezas y fémures, Himenoptero por abdomen (uno bien conservado, entero).

Pompilidos	4
Grillidos86
Acrididos varios generos ,	.26
" <u>Lacerta hispanica</u> " diminuta	1
Total	117

Medidas en fresco..

Ala	232 mm.	natural.
Cola	153 mm.	
Tarso	47 mm.	

2-XII-50 -

Cont. est. de Cernícalos.

♂. Long. T. 347 mm. Ala, 239'5. Cola, 157. Tarso, 46 mm.

Había comido un Alaudido (Alauda arvensis), la acababa de comer. Patas, mandíbula superior y ramfotera, Alas peladas; y un Soricidae, quizá un roedor pequeño, poca probabilidad.

Falco tinnunculus

2-XII-50 - Densamente moteado el dorso que hace negruzco, gris de la cabeza muy intenso, 3 rectrices externas bastante moteado dorso cabeza más rojiza. Solo 6 bandas rectriz, 7 bandas negras cara externa. Manchas más grandes y posiblemente menos numerosas que el otro, más oscuro y en general peor delimitadas.

♂. Long. T. 349 mm. Ala 257 mm. Cola, 168. Tarso, 48 mm. Es grandísimo.

Cont. est. -

- Un Turdus meruale, las patas
- Una lacerta jagilis?, solo queda el extremo de la cola.
- 10 Grillus, alguno entero, (Grillo común)
- Media docena de Acrídidos, (no se pueden contar bien).

Ambos magnífico plumaje de ♂ ♂ viejos, testículos muy pequeños o amarillos.

Ambos resultados confirman la avifagia invernal.

29-XII-54-

♀ ad.

Cogida por la mañana al tirarse a una jaula con un pájaro en plena calle de las Angustias.

Long. T. 336. Ala, 244. Cola, 165. Tarso, 39.

Cont. est. -

- Restos de la epidermis de una lagartija que conserva bien la región plantar de una mano, guiones y escamas. ¡No había ni un trozo de hueso siquiera!

Plumaje:

Muy bueno, impecable, bien manchado y muy rojizo. Cola enteramente gris, con algún borde leonado. Dorso bien manchado y plumas con borde más claro muy notable.

Falco tinnunculus L.

- 7-IX-50 - Veo muchos desde el tren en el N. de Palencia, cerca de Herrera de Pisuegra. Probablemente llegan hasta allí primillas también.
- 17-IX-50 - Palencia una ♀.
- ~~22-X-50 - A orillas del río, en o las orillas que no hay nunca. Ha empezado la instalación de invernantes.~~
- 17-III-50 - A fines de Diciembre sigue el del regato.
- 22-X-50 - A orillas del río ♂, en sitio en que no hay nunca. Ha empezado la instalación de invernantes?
- III-51 Probablemente a primeros o mediados de Marzo llegan los estivales. Se ven más ahora. (17-III) que durante el invierno.
- 24-III-51 Adaja. En el soto ya se ven casi únicamente parejas establecidas en sus lugares estivales y seguramente que ya han elegido el nido. Atacan con furor a Milanos y Aguilas rastreras.
- III-51 - En el prado de Laguna y pinar, parejas. Creo que ya en sus distritos. A mediados ya les vió en el Puente Tonono.
- 15-IV-51 - Una ♀, Ala, promedio 261
Cola, 172, Tarso, 51 mm. Pico, 19-20. Long. t. 368.
- El plumaje ya raído como corresponde a la época y es tan acusado en los cernícalos. Es un isabela muy pálido, las rectices medianas. 12 contando la apical. 1ª primaria 1 mm. 4ª, 2ª a 3ª un poco más sin llegar a 2 mm. Escotadura interna de la 1ª, 4 mm. más corta que el ápice 6º.
- 25-IV-51 - Zaratán. 2 ó 3 en el Monte.
- 11-VIII-51 - La Fraila. No sabemos si varió el número, a primeros, día 11, una familia cazaba al atardecer insectos, probablemente hormigas, con 2 - 4 Coracias. Este año no ha sido común.
- 3-IX-51 - Villanueva de (Valle Esgueva) bando 12, a las 9 9'30 h. en paso activo, Hay leve duda sean primillas, aunque parecían cernícalos, pero ahora deben ir aquellos en bandos. Ver nota de primillas, día 14-IX.
- 23-IX-51 - Hasta La Fraila y en ella, no mirando bien, solo se ven 2! Ya han partido sin duda.
- 14-X-51 - En el Monte Blanco y pinar, solo uno entra al buho (un ♂). Hay muy pocos. Ya partieron todos.
- X-51 - Valdestillas, Laguna, Monte Blanco, días 7-14-21-28-31. Solo veo una vez, o, en Monte de Blanco y me traen otro ♂. Practicamente han desaparecido.
- 21-X-15-XI-51-Valdestillas. Solo la segunda vez uno con duda. No queda aquí ni un invernante. No se ven en 3 visitas mas, en Octubre y Noviembre, solo uno el 28 de Noviembre.

Invierno 51-52. Noviembre y Diciembre 2 en Valdestillas; otro el 17 de Diciembre en Traspinedo. Me traen uno (Nota) fines de Diciembre, cogido en Valladolid al tirarse a una jaula.

Falco tinnunculus

12-VIII-51 - La Fraila.

♀ Long. . . . 364-65 mm.
Ala, est. . . . 251 mm.
Cola. . . . 169 mm.
Tarso 50 mm.

Estado del plumaje.

Se trata de una o ad. en plena muda.

Parte inferior mudada, excepto el buche, la cabeza entera en plena muda, con auriculares etc. viejos, nuevos y en crecimiento.

Cont. est. -

- Acrídidos. Contados por extremo abdomen. Probablemente un recuento de mandíbulas varía la cifra. . . 34:
Ephyphigera. Abdomenes reconocibles claramente 3, uno de ellos ♀.
Diseminados hay huesos, probablemente de ella. Por rudimentos ala, 4. por mandíbulas 5 ó 6. Total. . . . 5-6.

Orugas. 1, verde amarillenta, de 4 cms.
Orites? Dos patas.

Un scarabeido pequeño, que podía parecer a un orites de 1 - 1'5 cms.

Gryllotalpa? Dos mandíbulas, del mismo lado, procedentes probablemente de digestión anterior. No hay restos de patas por lo que la determinación es insegura. A prescindir.

Hay además dos yerbas de unos 5 cms.

21-IX-51 - Villabrágima.

♀ Ala, 230 mm. Me lo comunicó todo Artero.
♀ Cont. est. -
- Un ratón y 3 ó 4 Scolopendra.

22-X-51 - Valladolid.
Alimentación y notas.

♀ examinado estómago.
♀ juv. de este año casi con absoluta seguridad. Plumaje en magnífico estado, sin acusar muda alguna. Medidas en fresco.
♀ Long. T. 340 mm. Ala, 233. Cola, 158. Tarso, 39-40.

Estómago:

Acrídidos, 14. Casi todos ellos son de ala roja, blanca y negra, ahora comunes en el campo. Uno de ala gris-azulada, negra y blanca.

Scolopendra, 14. De tamaños variables desde muy gruesos hasta muy finos y pequeños. Los gruesos son devorados en trozos o muy desmenuzados, los medianianos y chicos enteros.

Falco tinnunculus

22-X-51 - Valladolid.

Alimentación y notas. cont.

Coléoptero. Uno negro, pequeño.

Aves. Encuentro un estómago y la cara plantar de un insectívoro ya muy digeridos. Muy fresca aún un ala entera desde el hombro y cuidadosamente despojada de las remiges, (no de las coberteras). Indudablemente ha sido comida mucho después de la anterior.

Las plumas manchadas que aparecen en cantidad podrían ser de Saxicola rubetra, especie común ahora en los campos abiertos y pedregosos donde se cogerían Scolopendra y Acrididos.

Después de comer el ala fresca cazó una gran Scolopendra cuyos restos cuarteados saqué de la boca.

¿Se comen únicamente parte de los pájaros que cazan?

¿Vuelven a ellos después de un rato? El ala del buche, no digerida.

Los Acrididos con la entrada del frío que se hace sentir en estos últimos días, ya escasean más. Hace tres aún cogí una chicharra y vi bastantes, pero no como en Agosto.

En cambio, Scolopendra debe verse más, dificultada de coger sus presas, o salir al sol que todavía calienta. Se explica que se hayan invertido las proporciones de Acrididos - Scolopendra, con respecto al verano.

Y por fin ya han empezado a cazar pájaros, con la escasez de insectos. Aquí seguramente un Saxicola torquata. Caeran ahora también Oenanthe oenanthe y Anthus de vuelo más rápido, Phoenicurus está aún en pleno paso, por sitios abiertos. Ninguna presa tan fácil como Saxicola. Mas en matos, Sylvia borin y Phylloscopus.

22-X-51 - El 20 no vi ninguno en el Adaja. Ya han desaparecido totalmente los estivales y por lo tanto este es casi seguro un emigrante extranjero.

♂ ad.

Long. T. 333 mm. Ala izq. 230 mud. Cola, 152. Tarsos ant. 37 mm.

Plumaje: - Terminando muda, aún en crecimiento 1ª primaria, las 2 ó 3 1ªs. secundarias, y muchas coberteras en la nuca, abdomen, pecho, cuello, dorso, etc.

Colorido: - Dorso bastante abundantemente moteado. Uropigio gris limpio tallos oscuros, cola idem. con manchas tranversales negras incompletas en la mitad basal. Cabeza muy oscura, fuertemente teñida de pardo y bigotitos muy desvanecidos, sin negro, solo gris. Escamas de las patas en muda ¿señalando ave ad. o vieja? Pecho y abdomen bien moteados así como ala interior.

Alimentación:

10 grillos comunes, contados por los fémures y un Gymopleurus del que solo quedan algunas patas.

Estado. - Bastante gordo, grasa subcutánea aunque no excesiva.

Testículos atrofiados.


Falco tinunculus. L.

- 22-II-52 - No hay aún en Laguna.
- 24-II-52 - La Fraila, se ve uno que podía ser invernante
- 2-III-52 - La Fraila, Ya se vieron 2 ó 3, sin mirar bien.
- 9-III-52 - Ya comunes, establecidos en el soto del Adaja, en Puente Duero. El día 14, también abundancia en pinares de Puente Duero, hasta Pesqueruela.
En total, no se sabe la primera fecha de llegada, aunque se puede establecer en la última decena de Febrero (este año) y la máxima en la primera decena de Marzo.
- 18-IV-52 - Probablemente cernícalos, 6-8 que se reúnen rápidamente para atacar a un cárbano en el pinarillo. Quizá naumanni.
- 20-VII-52 - Bando de mas o menos 12, en Checa (Guadalajara).
- 27-VII-52 - Bandos de unos 10 (al menos 2) en La Nava.
- 2-I-56 - ♂ ad. magnifico plumaje. Un pájaro (regiones plantares y uñas) algunos huesos y plumas, probablemente granivoro grande Passer más 1 larva indeterminada.
- 3-I-56 - o ad., Villanubla. Cont. est. -
- 3 grillos
- 1 ratón
- 21-IX-52 - ♀ ad. Plumaje perfecto.
Cont. est. -
--Grillos comunes 11 (casi enteros)
Acridius 12 (por extremo abdomen)
Hormigas de ala 15 (De las gordas, negras que ahora utilizo para ceptos.



JAV.

Camacho 5-8-99.



Falco tinnunculus ♂
29 XI 49.

JAV



JAV