Hieraetus fasciatus

- Nos han parecido de esta especie dos que hemos visto en Puente Duero, en Abril.
En la misma localidad, a finales de Enero, nos parecieron de esta sp. Ver la nota de Blanes en A. heliaca.

VIII-51- La Fraila. Vista una vez la que lleva las gallinas a Justo, parece ser un juv. de esta especie. El día 10.

6-X-51 - Me traen de Palencia un juv. sin sexo, parece o por el tamaño, buen plumaje, muy gordo. Cont. est. -
- bigote de liebre o conejo.

Ver nota con medidas y descripción. En poder de Carrasco.

Del examen de un individuo

Ala est. izq. 482. Cola 268 mm. Pata izq. uña post. 52-53.
Pata der. " " 53.

Pico siguiendo curva

Enverg. 1645 mm.
Long. T. 717

Estado del plumaje. Perfecto, sin acusar muda en ningún punto. Por el leve deshilachado de las puntas de las plumas parece reciente.

14-I-57 - Aranda de Duero (Burgos). Traen o de 2º-3º año. Plumaje intacto, sin acusar ninguna muda. Delgada, buche y estómago vacios completamente. Ovario derecho grande, casi la mitad que el izquierdo.

JAV

JAV

4-III-58.

JAV