

# Clamator glandarius, L.

1942.

1942. 7-III. Serrade. En el pinar, dos nidos de Pica con crías de Clamator, una de ellas ya bastante grande. Los llaman criados

1943. 19-IV. Uno o 2 en el pinarillo de los arcos Reales.

1944.

5-IV. El pinarillo. lobardos & machos, cont. est. orejas procesionarias

1  
2-3

6-IV. La Fraile. 2 ♂ cont. est. orejas procesionarias

4

14-IV. " abundan mucho en el pinar estos días. Hay muchos nidos ♂ que ♀. Se ve la ♀ - orejas procesionarias.

5

1947. 4-IV. Adaja. ♂ - orejas procesionarias

6

5-V. La Fraile. ♂ - orejas procesionarias

7

6-V. Adaja. ♂ - orejas procesionarias

8

6-VI. Oritas Adaja. - Hay bastante. Uno arrancado enciendo en mi cuatral con unas Pine acaba por tirar al río donde muere un rato a contracorriente y salió después volando con facilidad. Ceb. ♂ - orejas procesionarias

9

7-VI. Soto Principe. 2 perseguidos por Pine.

10

25-VI. Cuestas Marquesa. Un nido Pine con 2 pollitos (uno de criados) y un huevo.

11

25-VI. " " " . . . Mis nidos, un hueco con bastante plumón-cañón y 2 juis. Pine mucho más pequeños. Casi el hueco con marcas y le veo muy bien.

12

8-VII. Lagune. Vito uno.

13

24-VII. Cabildo. La chaual lleva un colicorte seguido allí (con Pine) en el que tiene nido.

1948.

6-III. Lagune. Oido el 1<sup>er</sup> del año.

14-III. La Fraile, 6-8, solit. y en parejas; 3-4 iban reunidos con un bando de Sternus unicolor (~50) y C. cyanea (~50).

Me dicen que el día 7 no se vio ningún; que en la mañana intermedia han aparecido las orejas procesionarias.

1-VI. La Fraile. 5, no nulos pero jóvenes.

15-VI. Puerto Nuevo. oido uno.

14

A 1<sup>er</sup> junio, en Medina del Campo hay nidos ya empollados. Coincide la salida de pollitos con los de Pine, abundantísimos a mediados de junio. Pican ser abundantísimos en Medina.

AV 1

14-VII. Una ciega colicorte junto a un nido de Pine. (14-VI)

15

29-VII. Huete del Rey. Ciega colicorte, que vuela perfectamente, pidiendo comidas al atardecer a Pine. Este graznaba cuando los apresumaban y luego se lamió de lejos y el cuello se fue. No vi otras crías de Pine ni al otro padre. - Outreayer le vi en el mismo sitio. (23-VII)

16

15-VIII. Cuestas del manzomis. Pone uno. cien veces almendras

1949.

27-III. La Fraile. Otoño el 1º del año.

Las mancas les persiguen siempre a menudo se ven 4 o 5 canagueando y dando golpes a los críos. Prob. suan un buen redamo, nrios, jorobado.

28-IV. La Fraile. Uno solit. dicien pinar y 2 ♂, corretean persiguiéndose.

10-IV. La Fraile. Algunos, dos jinetes quisejaban. Pintau mucho sobre

17-IV. La Fraile. 2 parejas en los chopos junto a la carretera, donde el día 4.

+ indudablemente están establecidos. Vistos hasta el día 20. Se traua e menudo al campo y cantan algunos vez. He visto bien 1 ♂, mu-

24-IV. La Fraile. Matan ♀ con hueso formado en el conducto, y 2 hembras desarrolladas. cont. est. — ojos progresivamente.

28-IV. Mediuia. Nido de C. coronue con 2 h. de clamator y 3 de graje.

15-V. " Traen cría que empieza con algún coñec en la cabeza.

14-V. Mediuia. Nido Pica con hueso fresco de clamator. N° 111. octeca. (No apunto los de Pica).

19-V. Huerte del Rey. Nido Pica con 5 h.; 4 indudables de Pica, exactamente iguales, con pico grande y 1 bastante dif. prob. de clamator, pico grande.

En el uno 5 nros. Jinetes al río. Octeca. N° 123, 123' (el otro uno de los de Pica).  
8-V. Mediuia. Nido coronue con h. de este y uno de nro (solo allí) muy mediados y 3 polluelos jóvenes.

10-III. Falsa Pinaclo. El 1º del año.

23-IV. Huerte La Fraile. Varios 3, uno en pinos y una pareja caducif. corretean en la Pedraja, al atardecer.

30-IV. Cabildo. ♂ y ♀ jinetes, uno Ponierte?. Vistos en caminamientos.

~ 15-V. Traen de las cortas de Blas huevos de Pica y entre ellos uno de clamator. Vio otro del año anterior, ambos muy redondos.

6-V. Mediuia. Algunos 3 nidos de C. coronue; 2 criados empinados; una cría volandera (otra se ha roulado ya, le vienen hace días); 2 polluelos en cascos. Alturas nidos: 7, 5 y 5 nros. (prob. más) Todos en pinos (dos de ellos, P. pinaster) El chico ha cogido los críos de graje que habían en los nidos y solo ha dejado los críos, que se han ido, aunque el no lo confiere. La madre ♀ a punto de poner (hueso oxidado casi blanda). No viene el cont. est.

Es posible que allí paralice a Coloeus, que anida huevos pinos. Dice el guia de que paralizan también los nidos altos de Pica.

28-VI. Sotillo. 2 jires colilargos cebados por Pica, ya volando.

7-VII. " Coludo un jirón indef., prob. de la vidriera del 28-VI.

Desde el 20-VII al 17-VIII no se ve ni uno en la Fraile, a pesar de mirar bien. Se puede establecer pues que la partida qual. es anterior a mediados-jires de julio.

# Clamator glandarius.

1951

14-II. Laguna. Poco solitario todavía salió 2 veces los 1<sup>o</sup> del año.

24-III. Ondara. 2 veces.

31-III. Laguna. En el pinar, se perdió uno 3, al menos 2 más o 3, y

chillan 9 veces y mejor. Se les oye continuamente.


31-IV. Cercos. Solo un o 2 veces cada vez, él es raro.

22-VI. Soto a finales. Solo uno, cuchado por Pica, en el soto. Volaba bien. Traía un p. ~~alas~~ vidrio, de la Fraile, perfectamente aplumado que fue el único que se vio ese día.

1 Melocotón o gen. andago rd.

2 Tettigia (por los ojos, quiere algo más)

1 gran oruga.



Largo 5-6 cm. Piel desnuada.

15 anillo, pieza dura junta a calibre.  
ultimo cm 3 "

Color marrón pálido (por haber estado en H2O?) con puntos negros (uno por anillo) y cuando estos son negros, parecen más oscuros. Piezas azules y del protuberante color gacharras con puntos

Vall. hasta finales (por el soto), solo quedan muy pocos y jóvenes.

19-VII. La Fraile. Vito uno. ? Prob era luculus.

20-VIII. " " . Unos 8 localizados en un pequeño corral, en los troncos, cerca del de Pica.

Son los mismos observados del 2 al 30-VII ! Se quedaron solo algunos restos - dos que se encuentran en algún punto?

1952. Inicios. El 28-VIII dice Carlos vio uno en el pinar y no lo dudó.

1952.

22-II. Laguna. Vi uno. Los busco en vaina

24-II. La Fraile. Al menos 3 pinar, chillando, posándose cuando oyeron pieza. No los perseguían Pica. Al menos 2 eran ♂♂.

8-III. Ondara. Vitos 6-8, prob. habrá más. Todos pinar, algunos chirriaban al lado M. Blanco, casi todos perdiendo piezas. Recorriendan mucho, no persecución de Morcas.

♂. testículos. diámetro 8 mm. largo 6 mm.

Plumaje. Cola corta y desgastada. Una rectriz central no ha mudado aún, obs. 2 mm. nuevos. 1 mm. desgastados en la punta blanca.

Tiene peludo un buen trozo de la nuca. ¿Por piezas de los Pica? ; Pelas entre ellos?

Cort. est.


35 + haematoxilina pinura, cortadas por calares exteriores. Había 3-4 mas.

Había una docena de orugas en el pinar

14-III. P. Duros. - Pequeña - Adojo. Pinar y ribera pins grupo n 10, otros 26 sueltos saltando y persiguiéndose. Cercos leonado n 20 lagomorpho + strumus.

9

10



143

- 25-III. Lugo. Pinos. 203 solit., uno cerca de Pice. Esquinas. No daban nulos pero si a ratos.
- Pteronotus extraordinariamente comas, algunos pinos bellis desnudos, aglomerados en el suelo pero no juncos. Ongas muertas o muereadas. (Nota).
- 23-III. Hato de Fraile; allí, 1 baderne ciliado cerca de Pice, juncos ♀.; ♂ pinos; Pinares, no lejos Fraile, ♂ en pino puro con onga poco hacia las 6:30 h. (Comprando el nro de ongas); de clamator de la Fraile y Largua, inferioridad hace la juventud
- Pteronotus comen la carne de fruta e piña y frutas. Hace 2 serranos, sin tránsito, ni una juventud, pero los pinos juncos. Añadir el 1<sup>o</sup> III en el Ondarre.
- 27-IV. M. Blasco. 3 cucarachas y 2 pteronotus devorando baderne.
- 27-III. P. Nuevo. Se ven 2 + 2 en alto pino. Cobrido ♂, con ranuras en la maza!
- cult. est. - 41 pteronotus.
- 19-IV. Pinares. - Muchos.
- 23-IV. Valdetillas. - ♂. - 22 pteronotus
- 10-V. Canal, cerca de Santovenia. Uno al lado de nidos marcas con 2-3 y 3 + 4 (pitos) huecos. No nos dif. en los huecos, que no eran de clamator ni gatos.
- 20-II-52. Canal. Nido Pice, olmo, con crías casi cumplidos y 5 polluelos Pice desnudos. huecos  
cult. est.  
poco total.  
5 gr.
- Ongas. - 15. Sin pelos. No parecen lepidópteros, sino coleópteros y arácnidos en tierra.
- Gritos - 1  
Ardidos - 1  
Hemípteros - 1  
Carrizos - 1  
Coleópteros ± 30-40. y tanacetioides, cirrionoides y algún metacostido y corálico?
- Le devoran Pice. Ya cumplidos, alargados y cortos. Los polluelos tiene "hermanos" apenes tienen los ojos abiertos.
- Comprando con estos magos Pice jóvenes nubes die y lateralidad buscan (distintos) el otro nido más 100 mts) se aprecia alimentándose únicamente de insectos en clamator y más cult. est. en jeso. (Ver nota Pice).
- 27-II. Solillo. - Nido Pice, después vidiendo sobre el río, 6 mts altura, con 2 h. de Pice con polluelos grandes y uno de clamator fresco, nro 188.
- 8-VI. Medina. 2 pteronotus. Otro más. Inf. ya hace tiempo que hay más.
- 19-VI. Hato tro. Cenizas pinas, un pino. ♂. En torosillos uno.
- 29-VI. Inform. el alambrado "Hace 15 días 2 crías jes. cobrados por 4 turmas padres. Paracitran Pice y cenizas. Rompen y comen huesos antiguos de otros".
- 15-VII. Villabriguine. Tiene uno antiguo cobrado en esta fecha.