

Chlidonias leucopareius.

- Enviadas dos pieles de individuos juvenes a F. Bernis, las clasificó como pertenecientes a esta especie, quedándose con una en el Museo Nacional.

8-VI-47 - Laguna de Duero. Observamos 6 u 8 individuos.

24-VI-47 - Laguna de Duero. Había unos 20 individuos a la vista.

22-VII-47 - Laguna de Duero. Observamos un bando numeroso, de unos 30 al menos.  
Durante todo el mes de junio y parte de Mayo, por lo menos, ha habido muchos en Laguna de Duero.

14-VIII-47 - Laguna de Duero. Había centenares de individuos en la laguna, al parecer todos con el pecho blanco. Conseguimos dos juvs.

Nº 84, Det. Bernis. Cont. est. -

- restos de ranas.

Enviada a Bernis, queda en el Museo.

Nº 85. Det. Bernis. Cont. est. -

- Restes de ranas pequeñas.

Dos días más tarde conseguimos otro individuo también joven.

23-VIII-47 - Laguna de Duero. Encontramos uno o dos individuos con el -  
pecho oscuro, en un bando muy numeroso.

A primeros de Septiembre, en Laguna de Duero, había bastantes individuos.

14-X-47-- Laguna de Duero. Después de no ir a Laguna en un mes, no -  
encontramos ni un solo individuo.

III-48 - A fines de Marzo. Laguna de Duero. Aun cuando la Laguna tiene toda el agua del año pasado, aun no han venido Chlidonias.

Laguna de Duero. Me dice el pastor que las "gaviotas" (no les distinguen de Larus ridibundus abundan en invierno) anidan en gran número en las islas del centro, entre las cañas. Según el ponen tres huevos manchados y forman poco menos que una colonia. Otros me dijeron ponían 5 huevos.  
La fecha aproximada debe ser desde el 20 de Mayo en adelante, y probablemente en la primera quincena de junio. Los chavales recogen huevos para tirárselos a las chicas en la fiesta del pueblo.

Chlidonias leucopareius, al menos cuando forma un bando numeroso, acompañado ya por las crias, vuela en círculos y giros a poca altura, dejándose caer al agua de vez en cuando. Todo el bando permanece como estacionado sobre un sitio y se va trasladando poco a poco, generalmente a lo largo de las orillas de las islitas del interior. Chillan mucho y parecen llevarse bien con los limicolae, tan abundantes en Agosto.

Se posan a veces en una piedra que sobresale del agua, muy derechos, aunque el cuerpo este horizontal.

10-V-48 - Laguna de Duero. Aun no han llegado, aunque me ha parecido ver individuos de esta especie.

Chlidonias leucopareius.

- He observado más tarde que la laguna está seca, lo que quiere decir que no anidaran este año 1948. Es pues, muy posible - que la nota anterior sea cierta.

119-IV-49- - Burgos. Con duda una sobre el Arlanzón.

17-V-49 - Un solitario en el Pisuerga, muy gris, indudable Chlidonias sp.