

Larus ridibundus, Larus. L.

- 14-XI-42 - Vemos gaviotas. El día anterior había 4 en el Puente Colgante.
20-XI-42 - Un bando de 90 individuos sobre la alcantarilla.
12-III-43 - Se ven en bandos hacia el N, Creo que ya se marchan todos.

Hydrocoleus iridibundus aparece en gran número en el río Pisuer ga todos los inviernos. Se sitúan en bando a la desembocadura de la alcantarilla principal, revoloteando incansables sin hacer el menor caso a M. migrans. En el bando, especialmente durante las nevadas suele verse algún individuo del género Larus.

La proporción entre machos y hembras parece estar muy igualada, pero no la de individuos adultos con jóvenes. Estos últimos son 10 veces más numerosos. Entre los jóvenes hay algunos con la faja parda terminal de las restices muy ancha, que parecen peor desarrollados. Suelen ser los que mueren de hambre durante las nevadas.

Las nevadas obligan a dispersarse los bandos que recorren incansables el río. Se observa un aumento en el número de individuos estacionados ante las alcantarillas. Algunos, especialmente los jóvenes, recorren las orillas, extenuados por el hambre y acaban por perecer. Así hemos cogido bastantes, en Diciembre.

Mientras el tiempo se mantiene bueno, el bando de Larus se mantiene en las alcantarillas. Duerme en las piedras de la presa y durante el día desaparece a ratos. Después de comer, a medio día, suelen retirarse un Km. río abajo y posarse en el agua.

Se alimentan con restos de tripas, pelos y desperdicios animales de todas clases. Exhalan un olor desagradable. Durante las nevadas se reúnen alrededor de pequeños cadáveres. Se cogen muy bien con cebo, aún descubierto, a la carne, pescado y hasta lombrices.

- 5-I-46 - Sanatorio. Veo 2
66-II-46 - " . Veo 20.
21-XII-46 - Orillas del Pisuer ga. Individuo joven. Parece haber comido vegetales.
29-I-47 - A orillas del Pisuer ga, con nieve, hay una bandada de 50 a 60.
27-III-47 - Laguna de Duero. Aún hay gaviotas.
25-26-V-47 - Laguna de Duero. Quizá pertenecieran a esta especie tres o cuatro individuos que había. Parecían mayores que Larus.
29-II-48 - Laguna de Duero. Un bando de unos 100 individuos, nadando, posados y al vuelo.
4-III-48 - Laguna de Duero. Había algunos grupitos.
7-III-48 - Laguna de Duero. Hay bastantes.
17-III-48 - Laguna de Duero. Un bando de 50 a 60.

Larus ridibundus

23-XII-46 - Valladolid.

Alas y dorso más oscuro. Muerta de hambre.

Adulto. Ala, 312. Cola, 122. Pico, 36. Tarso, 46 ? Patas y pico rojizo naranja, vivos.

0 Ala, 278. Cola, 104. Pico, 29. Tarso, 41

Larus ridibundus (jóvenes). Las coberteras escapulares se van haciendo más claras en el orden siguiente:

- V - 1ª y 2ª primarias mostrando una larga faja negra en la barba interna, junto al raquis, que está manchado.
- I - 1ª primaria con una faja negra muy fina junto al raquis, que está muy manchado.
- II - 1ª primaria con el raquis ligeramente manchado de negro.
- III - 1ª primaria con una sombra tenue en el raquis.
- IV - 1ª primaria con el raquis completamente blanco (excepto en la punta)
- VII
- VIII 1ª primaria con una raya negra a lo largo de parte del raquis. Coberteras primarias.
- IX - 1ª y 2ª primarias casi completamente negras. Raquis y partes de las barbas internas blancas.
- XI - 1ª y 2ª primarias manchados de negro en las barbas internas, junto al raquis.

La punta del raquis es siempre negra.

10-III-48 - 4 individuos sobrevolando el Pisuerga. Son los únicos que he visto. Quizá Larus, quizá accipiter

Larus ridibundus.

- 18-III-48 - Herrera del Pisuerga (Palencia). Me traen la primera con cabeza negra. ♀, con ovarios algo desarrollados. El pico y patas de un rojo amoratado, todo el cuerpo parece impregnado de una substancia roja, que tinte las plumas, la cabeza y cuello, en muda, aún conservan plumas blancas.
Cont. est. -
- insectos, y una pata de animal de color morado, que probablemente influirá en el teñido del cuerpo.
- 28-X-48 - Burgos. Mata Tonono el único que ve, un joven,
Cont. est. -
- Dos bermejías y un cacho (Rutilus).
- 6-XI-48 - Un joven en Las Moreras.
- 7-XI-48 - Tres jóvenes y un adulto en el regato.
A fines de Noviembre hay centenares en el Pisuerga. Grandes bandos se arrojan a las tierras y siguen al arado. Muchos se establecen ante las alcantarillas.
Creo duermen en tierra o a lo menos pasan posados gran parte del día en las tierras, frente a la Rubia, formando manchones blancos. De vez en cuando un grupo o pequeño bando se remonta y explora el río en varios Kms. Milvus regalis no les hace caso ninguno.
Hay algún individuo "con la cabeza negra" según Hidalgo que les ha matado.
- 28-XI-48 - Un joven. Cont. est. -
- Saltamontes e insectos.
- 28-XI-48 - Laguna de Duero. Había un bando bastante grande.
- 5-XII-48 - Consigo tres jóvenes.
Conservo Cont. est. -
- restos irrecognoscibles y una alubia.
las tres tienen parásitos (conservados).

Hemos visto un adulto anillado en la pata izquierda y he soltado un joven con la anilla, ESPAÑA, 020.

Algunos adultos tienen en el pecho una media luna oscura, probablemente de suciedad.

En la salida de aguas se presenta un gran grupo de unos 60, -- procedente de las tierras de enfrente. Se posan primero los jóvenes, si bien la mayoría comen al vuelo, llevándose la presa para comerla, junto a otros posados.

Al acercarse la bandada desaparece en dirección a las tierras de labor, de donde se levanta a menudo para ver si está despejada la alcantarilla, a la que se tiran entonces, en planeo rápido. Grupos de unos 30 que recorren el río se suman al bando.

Milvus milvus es frecuente mezclado con ellos.

Hacia el 12 de Diciembre el río creció con las lluvias y desaparecieron las gaviotas de las aguas turbias.

El día 15 encontramos un bando numeroso en Laguna de Duero, -- donde no había ninguna el día 11, aunque el 15 ya estaba llena la laguna.

A primeros de Febrero matamos un adulto que ya tiene muy oscura la cabeza, creo era o.

Larus ridibundus. L.

- Durante todo el mes de Febrero empiezan a verse oscurecer las cabezas. A primeros de Marzo ya están todos los adultos, con las cabezas negras, rondando solitarios y en parejas y tríos a lo largo del Pisuerga. Quizá fueran jóvenes los que pasaron en un grupo de unos 25 ó 30. Indudablemente son movimientos preemigratorios.
- 27-II-49 - Magaz (Palencia). En las cascaderas del Duero bandos innumerables cabeza negra.
- 16-III-49 - Siguen sobre el río solitarios y errantes. No hemos visto bandos aquí, debido a la desaparición de la cloaca.
- 19-III-49 - Una ♀ con la cabeza completamente oscura y otra, también vieja o, con muda de la cabeza.
Ambas habían comido peces.
- 1-IV-49 - En La Flecha vemos bastantes, aunque su número ha disminuido mucho. Van en grupitos o solitarias, la mayor parte con capucha negra. Han marchado la mayoría al N. y solo quedan -- algunos que recorren el río.
No hay ninguno en La Rubia.
- 18-IX-49 - Probable de esta especie 2. Tres días más tarde otros 2
- 2-XI-49 - Un bando ya en el Puente Colgante. El día 7 veo unos 15 en Las Moreras. Pasean en bandos y sueltos, sobre el Pisuerga, toda esta semana.
- 18-XI-49 - Hay ya un bando en Las Moreras, todavía no han llegado todas las invernantes. No entran a "carabote".
- 14-XII-49 - Ha nevado. Se reúnen en bando grande en la orilla. Dos jóvenes capturadas conservan aún plumas pardas, en el manto, y escapulares (mechón).
- 17-XII-49 - Saco fotos. Todas malas.
Hasta fines de Febrero al menos las hemos visto.
- 8-9-III-50- Andan ahora en bandos de unos 30, que apenas se mueven de La Rubia. A veces vuelan altas y forman o rectices irregulares. Algún individuo solitario a lo largo del Pisuerga. No se tiran a los campos. Hay ya muchas menos que en Noviembre, la cabeza se nota oscura, pero en un joven que distinguí era clara. Errantes sobre la capital a gran altura.
- 10-III-50 - Posados en la presa unos 40 ó 50. Entre 12 que quedan 3 ó 4 adultos, cabeza negra; un solo joven cabeza blanca; dos o tres adultos cabeza blanca y restos de adultas con collar o manchas. Procedente de la cap. volando en V. E.N.E. O.S. de 20 a 30, se arremolinaron al llegar al río y ver los otros. A las 18'30 aparece.
- 30-III-50 - Pasan dos, frente al Sotillo. Seguramente quedan algunas.
- 27-X-50 - La Nava. ¿La primera del año?.

Larus ridibundus

10-13-XII-50 - Examinados tres ejemplares cobrados desde el 10 al 13-XII-50.

♀ juv. Salida de aguas de La Rubia.
Long. T. 368 mm. Ala, 263. Cola, 91 mm. Tarso, 50. Pico, 33. Dedo m. sin uña 34 mm.
Extraordinariamente pequeña 1ª y 2ª remiges línea parda junto al traquis. En todos, más pardas las partes negras. Tectrices blancas pequeñas más pardo rojizo. Ocultas espaldillas, plumas manchadas más numerosas. Banda apical cola 18 m parda. Tarso pardo. Pico pardusco.

Cont. est -

- piezas mandibulares de insectos (prob. orthopterus Gryllus?). A lo más 3.

1ªs. rectrices una banda blanca otra ligeramente manchada.

♂ juv. Sin localidad.
Long. T. 411. Ala, 308. Cola, 109. Tarso, 53. Pico, 35. Dedo medio, sin uña 38 mm.
Banda pical de la cola 24 mm. muy negra. Plumav juv. ocultas espaldillas. Tarso pardo-amarillento. Pico anaranjado mand. inf.
Cont. est. - No tiene.

13-XII-50 - ♀ ad. Confluencia del Pisuegra - Duero. Entre tierras.
Long. T. 331. Ala, 296. Cola, 101. Tarso, 52. Pico, 32. Dedo medio sin uña, 36-37.
Patas rojo ladrillo, pico id. Cabeza algo menos manchada que las ant.
Cont. est. -
- papilla amarillenta, arcillosa irrecognoscible, debida probablemente a lombrices de tierra.
- Restos de dos gusanos.
N. Abundaban en la conf. entre las tierras y hasta cerca del pinar. Un bando de unos 30 y otro de unos 120.

Excremento de Larus ridibundus.

Mancha blanca con un pequeño poso de color olive en el centro (tamaño natural, poso)

Otra casi redonda, 6 x 7. En Diciembre de 1950.

Larus ridibundus.

27-XI-50 - Ya hay mas de 30 en el Puente Colgante.

XI-50 - No ha aumentado el número, quizá haya disminuido.

I-51 - Ver notas de La Rubia.

14-II-51 - Laguna. Un bando. Ver nota.

27-II-51 - El Habanero. Ver notas. Se han ido muchas.

A mediados de Febrero pasan adultos por el Pisuerga, casi todos con la cabeza muy negra ya.

19-III-51 - Veo 5 juv. en el Cabildo inundado. Ninguno tiene la cabeza negra. No creo que las juv. la muden.

14-20-III-51- Burgos. Aún hay instalados en el Penal.

6-III-51 - Ya no hay una sola en el Habanero.

31-III-51 - Laguna. Andan 3, por lo menos 2 de ellos juvs. volando por la charca y acercándose a los ribazos.

15-IV-51 - Laguna. Ve Carlos 4.

1951-52 - No noto clara llegada. Señalados últimos días de Octubre (ver nota, si las hay). Comunes a fin de Noviembre y Diciembre en El Habanero.

Este año no han venido al regato de las Moreras. (algún solitario solo).

Notas de Diciembre y Enero en Laguna.

20-22-II-52 - Laguna. Notas.

4-III-52 - Notas y otro del Habanero, a primeros de Marzo.

25-III-52 - Laguna, solo 12 jóvenes, a medio día, algunos con señales - capucha. Tonono no ve ni una el 24 y 25, en Burgos.

Larus ridibundus.

Hemos de dedicar unas líneas a la descripción de los terrenos en que invernan Larus ridibundus. Aguas abajo de la ciudad el río se estrecha contra la ladera derecha del valle, dejando entre -- ambas una serie de fincas todas de regadío y sembrados de alfalfa, remolacha, etc. Dentro de la población en el salto de la presa del Puente Colgante desagua el mayor colector de aguas de la ciudad, que lleva sus detritus aguas abajo a sumarse con los del desagüe del matadero. Todo este tramo del río, abundante en pesca es frecuentadísimo por las gaviotas que se reúnen en bandos de -- unas 60 a 100 individuos ante los desagües. Algunos se posan en el agua entre la viva corriente de la alcantarilla, y manteniéndose se inmóviles con remazos oportunos picotean los despojos que pasan a su alcance, la mayoría vuelan contra el viento lentamente dejándose caer a ras de agua o revolotean unos segundos con las palmeadas patas abiertas y tendidas. Cuando consiguen una presa grande se alejan con ella burlando algún ataque y amaran un poco apartadas para devorarla a gusto. En días de viento fuerte toda la bandada vuela a ras de agua en línea alargada que pasa ante el manantial, las que van en cabeza rebasan la salida y con un par -- de aletazos se retiran río adentro dejándose llevar por el viento a la cola de la formación, como un carousel vivo.

De vez en cuando el bando auyentado por los paseantes se dirige a las tierras de la orilla donde se posa. Otros bandos que recorren el río volando altos llegan antes al desagüe y descienden con las alas medio cerradas. Casi siempre son jóvenes los primeros en -- acercarse al desagüe y posarse en tierra junto a él, a lo que son muy aficionados. Ante las bocas de los colectores se amontonan -- los detritus formando bancos malolientes que detienen los restos de pescado y carne. En ellos se posan las gaviotas a veces tan juntas que no se distinguen. Unas metidas en el agua a medio -- tarso picotean con las alas levantadas para conservar el equilibrio, otras chillan y se persiguen por el lodo.

He visto desde muy corta distancia los manejos de un individuo -- que buscaba comida con los pies metidos en el agua. Doblando -- apenas la articulación tibio-tarsiana pateaba alternativamente levantando nubecillas de cieno que seleccionaba con el pico. Distaba de mí unos dos m. y pude seguir perfectamente la operación.

- ♂ I Ala - 305 Cola 114. Pico 31 Pálido. Patas amarillo quareas?
- ♂ II ala - 298 Cola 109. Pico 39 Pálido " " amarillo gris pálido. Cabeza muy oscura. Muerte de hambre??
- ♀ III ala - 278 Cola 100 Pico 32. Tarsos 41. Pico grisáceo. Patas amarillos grisáceas.
- ♀ IV ala - 286 Cola 98. Pico 33 Tarsos 40. Pico pálido. Patas amarillas.
- ♀ V Ala - 284 Cola 106. Pico 31 Tarsos 41 Pico pálido. Patas amarillos.
- ♂ VI Ala - 306 Cola 112. Pico 34 Tarsos 44 Patas cobrizas. Pico carne-rojo algo violeta.
- ♀ VII. Ala - 276 Cola 98. Pico 30 Tarsos 40 Patas amarillo-amarillosos? Pico carne. (Verse dibujo).
- ♂ VIII ala 310 Cola 110 Pico 33 Tarsos 42 Amarillo gris pálido. Pico amarillento
- ♀ IX ala 298 Cola 101 Pico 32 Tarsos 40 Amarillo algo gris Pico amarillento.
- ♂ X Ala 290 Cola 112 Pico 39 Pico y patas amarillo amarillado. Tarsos 44 mm. Ala y dorso más oscuro. Muerte de hambre.
- Adulto. Ala. 312 Cola. 122 Pico 36 Tarsos 45? Patas y pico rojo naranjo. vivos.
- ♀ Ala. 278. Cola 104. Pico 29. Tarsos 41

JAV

(1) Mide 142 la pluma caudal aliger. los otros miden 138



~~...~~
~~...~~
~~...~~
el Finisge de 10-III-48. ~~...~~
4 medicinas subvencionadas



###


luz med. Anduj.

10-13-XII-50.

#

Canis ridibundus. L.

Examinados tres ejemplares, capturados desde el 10 al 13-XII-50.




♀ juv. Valde de aguas de la Ribera.

Long. T. 368 mm. Ala. 283

Cole. 91 mm. Tarsus. 50. Pico. 33. Dedo. m. sin uña. 34 mm.

Extraordinariamente pequeña. 1ª y 2ª remiges línea parda justo al trapero. En todas, más pardas los partes superiores. Testículos blancos pequeños más pardo pálido. Ocullos, espaldillas, plumas manchadas más numerosas. Banda apical ala. 18 mm parda. Tarsus pardo, Pico pardo.

Cut. ext. picas mandibulares de insectos marticolores. (prob. *Orthoptera* *Pylus*?), al menos 3.



♂ juv. Sin localidad.

Long. T. 411 Ala 308 Cole 109. Tarsus 53 Pico 35, Dedo medio, sin uña. 38 mm. Banda apical cola. 24 mm. muy negra. Plumas juv. ocullos espaldillas. Tarsus pardo-auriculento. Pico auriculento mand. inf. Cut. ext. No tiene.


♀ ad. confluencia Pinerque - Duero. En las tierras. 13-XII-50.

Long. T. 391 Ala 396 Cole 101 Tarsus 52 Pico 32 Dedo medio, sin uña. 36-37. Patas rojo lodulillo, pico id. Calera algo menos manchada que las cut.

Cut. ext. papilla auriculento, acillera irreconocible, debido prob. a lombrices de tierra. Restos de dos ~~de~~ gusanos. N. Abundaban en la conf. entre las tierras y hasta cerca del picas. Un bandedo de uña 30 y otro de uña 120.

JAV

Excremento *larva ridibundus*. X



mancha blanca con un pequeño poro color oliváceo en el centro (tomado nat. poro → ○)

Otra cari redonda. 6x7. Diciembre 1950.