

6-Dic. Están continuamente riñendo. Un (1) arrojó a un (2). Otros hacían huir a pinzones, anthus y gorriones.

• Saxicola torquata. Una ♀ muy confiada, en las piedras del regato y pradera.


• Fringilla coelebs. Es el pájaro más afectado por la nieve. Mientras iba, 1 ♂ y 1 ♀ se me han dejado acercarse extraordinariamente. En el prado había un montón de ellos, mezclados con Passer domesticus, Anthus etc. Dos se pelearon con violencia y uno fue derribado. Alguno oteaba desde las piedras del regato.

• Passer domesticus. Menos que pinzones y como ellos.

• Larus ridibundus. Un juv. se tiraba al charco y subía a la corriente, donde se ponía a picotear. Para buscar comida en el agua de poco fondo pateaba alternativamente con ambas patas y removía la pequeña capa de cieno, picoteando partículas. Hacia las 12 desapareció.

• Podiceps ruficollis. Plumaje invierno, mejillas algo erizadas, solo un individuo que penetraba en el charco. Cazaba buceando entre las yerbas acuáticas, muy abundantes en pececillos, que se refugian en ellas, y en quisquillas abundantísimas, que constituyen probablemente su alimento base. En el río casi fue derribado por el viento desde la cúspide de una ola.

• Actynioides hipoleucus. El mismo individuo de ayer, casi todo el tiempo entre las yerbas.



• Capella gallinago. Hoy hay dos, ambas por esquinas. Picotean entre las yerbas acuáticas, y en los matos de la orilla. Uno de ellos se pasó casi toda la mañana picoteando en el regato, muy agachado, y a veces al lado de L. ridibundus. Ambas se desentendían una de otra y de los demás pájaros. Por dos veces sorprendí en descubrimiento una que instintivamente se encogía, pegando la cola al suelo, aun estando en el cemento liso. Picoteaban continuamente. Espantadas, vuelven enseguida. A veces estaban -- junto al Actynioides a un uno de ellos se apartó para dejarle pasar. Solo dormitaron un poco, y eran muy activas.

• Sturnus unicolor. Unos 15 se tiraban al prado, juntos. Uno permaneció con Capella mucho tiempo entre las yerbas acuáticas. Conclusiones: la nieve ha aumentado enormemente el número de pasereves

Probablemente M. alba y M. cinerea se han concentrado aquí, procedentes de la orilla nevada. Erithacus Phy.-Sax. y Fringilidae acuden al reclamo.

No he visto rapaces. Solo un Colocephalus volvió a la ciudad a la 1'30. Por la tarde un ratón que corría entre la nieve, donde encontré -- ayer el muerto, fue cogido. Vi de mañana un moscón azul arrastrado por el viento sobre la nieve, los mosquitos siguen tan abundantes.

7-Dic. Regato moreras.

La nieve derritiendo. Esta noche fuerte helada. Hay sol. Carlos va a tirar un tiro. El me da las noticias. Según él.

• Phyll. collybita. 2 como ayer.

• Erithacus. Como ayer o menos.

• Motacilla. Hay menos que ayer.

• Anthus. Más que ayer, quizá unos 12. Cobramos uno.

Valv. 1950

7-Dic. Capella gallinago. Se cobra una, la vemos desconfiada. Estaba herida anteriormente, habiendo perdido el ojo izquierdo, ya cicatrizado. En varias partes mechones de cañones. Siguió la otra.

Actynioides hypoleucus. Sigue viviendo.

Alcejo athis. Tres veces acude a revolotear sobre el charco, pescando cerniéndose.

Larus ridibundus. Uno levantado de junto a un feto humano, picoteado. Alrededor de él numerosas pisadas de gaviota. El feto tendría unos 25 cms. y había sido extraído de una cazuela de barro, semihundida en el agua.

13-Dic. Gaviotas. 2 bandos de 30-40 - 120, tierras orilla río en Pesqueruela y borde pinar muchos sueltos (cobrados en pinos).

Phalacrocorax carbo Uno entre Simancas y la confluencia.

Ardea cinerea.-- Tres entre Simancas y la confluencia

Vanellus. Un bando de 7 en rastros posados. Había gaviotas por allí.

Circus. Duero y Pisuerga 2.

Milvus. Duero, uno o dos, En la Rubia 10.

Jilgueros. Un bando 15 y otro 20, ambos solo jilgueros, orilla -- carretera.

Pinzones. Bandos de hasta 30 por la carretera.

Cernícalo. 1 pinar.

Buteo. 1 Duero.

Serinus. Con P. montanus, unos 15

Lechuza. Una en matorral (cobrada).

Gansos. Islas Simancas. Hace días bando de mar al lado. parado y otro posado de 31.

Chapuquines (Podiceps) anidan en las islas y también azulones.

Gallinula. (notas de Salix.) Vieron 6 y 4 Pesqueruela Simancas.

Erithacus. Matan 4-5

C. frugilegus. Bandos 10-30

C. corone. Bastantes. (2-5)

Cyanopica. 25 con 7. Sturnus unicolor (había un bando al lado de 50, ms. y 4 maricas).

Columba oenas. Un bando 25, descendiendo río abajo.

(Hace tres días en la plaza).

