

Valv. 1951.

31 Mayo. Corcos - Aguilarejo. (Valladolid)


7'30 a 19'30 h.

Recorrido. Estación- Finca de Jado - Soto del rio hasta el cortado y vuelta a la finca. Hasta las 11 h.

11'30 h. En barca hasta el cortado, subida a Peñe Caída y al Cueto, descenso y vuelta en barca a B.

16 h. Vuelta al cortado, examen de los nidos de M. migrans por B. a A. y estación.

El día bastante frio, cubierto a ratos, apareció el sol por la tarde y a media día. Viento molesto del S.



- ↪ - Nido *F. peregrinus*
- ↗ - .. *Neophron*
- +++ - .. *Coloeus*

- ooo - Nidos *Petronia*
- - .. *C. corax*
- ⊙ - .. *Columba livia*

JAV

## 31-Mayo. El cortado de Peña Caida. (Corcos)

Lamido en los pies por un ara del Pisuerga con una ligera pendiente de derrubio y agrietado ampliamente en grandes desplomes verticales acuchillados. El corte es aspero de un color muy claro que destaca esplendorosamente sobre el soto muy verde y arbolado. El pie del tajo desnudo de vegetación excepto un par de raquíticos *Salix* en el borde del agua y dos olmos que han ascendido en un desmoronamiento.

Se distinguen tres capas.

- 1ª. Una inferior, gredosa y dura que se agrieta en largos bloques rectangulares verticales. Entre estas grietas anidan las *Petronia*, a alturas que oscilaban al parecer entre 2 y 6 m. La parte alta de la marga más blanda y compacta, cortada ya en cuchillos donde anidan abundantes *Coloeus* y *C. livia*.
- 2ª. Hay después y separada de la anterior por un resalte en horizonte de arcilla roja profundamente erosionada en capas o trozos que deben ser arenosos. En uno de estos huecos debe anidar el *alimoche*. Los agrietamientos de la cuesta llegan hasta las arcillas.
- 3ª. Nueva capa de margas grises, coronada por unos bancos calizos que son de resalte más destacado del corte. Las capas de yeso cristalizado sobrevolan también. Anidan allí *F. peregrinus* y *C. corax*?

Al pie del cortado la vega del Pisuerga se ensancha en Km. de llano paisaje, tras él los matos, enseñan las grises margas entre la vegetación xerofila y brillan con espejuelos proyectando hacia el valle sus morros romos.

El soto.

Muy ancho, de varios cientos de metros en algunos sitios, abierto en claros donde abundaban las *torcaces* y *maricas* en tupido bosque de olmos gigantescos. Atacaban a estos últimos orugas de ..... que habían casi limpiado las ramas. Indudablemente se secaron algunos este año.

Por la mañana cuando aún flotaba una especie de neblina sobre el bos que los claros de yerba verde y los azulados olmos sembrados aquí y allá parecían las acuarelas inglesas de parques señoriales, y se esperaba ver saltar un ciervo entre los troncos. Había una delicadeza especial en los tonos suaves de los verdes y grises que contrastaba violentamente con la desnudez rojiza de las aguas turbias del Pisuerga y el crudo resplandor de la amarillenta cortadura.

A lo largo del río se mecían al viento tenues de typha y juncos. Matos ralos de *Salix* agrisaban la orilla roída de patas de agua y en la curva del río frente al cortado, troncos vencidos de viejos chopos que tienden sobre el agua el bosque sombrío y sostienen los nidos de *M. migrans*.

Olmos, algún raro fresno y cerca del río chopos y matos de *Salix* en la orilla. Poco zarzal, y algún matorral de *Rosa canina* y *Oxicantes*.

Lista de especies. Comparan su abundancia con la pobreza del monte de valle de Zaratan.

*C. corax. hispanus*. Por la mañana veo (cierta duda) 4 en el resalte calizo superior. Al atardecer les vuelvo a oír y pasa uno graznando al cortado.

*Coloeus monedula. spermologus*. Anidarían quizá unas 60-100 parejas, posiblemente más, en el cortado. Veo parejas y solitarios que entran continuamente al nido, sin duda cebando. Uno de ellos llevaba probablemente un huevo.

31-Mayo. Sobre el soto pasan continuamente en grupos solitarios, pero no les vi posarse en los árboles, lo hacían a menudo en la parte superior del corte. Al atardecer se reunió un grupo numeroso graznando. Los nidos se diseminaban por toda la altura, mas abundantes en la parte baja, y todos en la parte inferior de estrechas grietas o en agujeros pequeños.

Pica pica melanotus. Común en el soto pero no preponderante como en Zaratan.

Sturnus unicolor. En la estación vi varios. En Valladolid a las 6'30 h. recorrían los jardines de la Plaza de Zorrilla y la Academia y cantaban en los tejados. No anidan en el cortado.

Oriolus oriolus. Reclamaban mucho en la parte más espesa del soto a mi llegada. Frecuentaban los olmos agusanados. Era más escasa en el soto ralo.

Passer domesticus. En la granja. Oí crías.

P. montanus. Un ad. en nido en un olmo juv. a 2'5 m. sale con un trino largo y leve apenas audible. Después reclamaba Prio-prio, desde un árbol cercano mientras examinaba el nido.

P. petronia. Las encontré agrupados en los olmos más atacados del soto, cantando posadas en las ramas secas altas. Se desparramaban por un grupito de olmos esquilados; una cogio una oruga, todos debían estar a ellas.

Notación "in situ" A. Piri - piri

chirori rorirori rori



Canto, no  
Canto, no esta bien  
creo.

Reclamo

Cerca del cortado abundan aún en el soto adonde llegaban en bandos. Al atardecer vi una de unos 40 en las tierras, ladera cresta.

Anidando, en toda la parte inferior del cortado, bloques verticales, entre las grietas 2-6 m. Vi persecuciones. El griterio era continuo oyendose una sucesión de gritos de reclamo algo como, Pio - poii, comparar con A. característico.

Arriba de la cresta extraje de un viejo agujero de Perops un nido -- hecho con pelo de liebre y trozos de piel, pelos de animal doméstico, plumas de tórtola etc., seguramente de esta especie, no tenía nada o al menos no lo saqué.

No había ni un gorrión en las proximidades.

Galerida cristata. Admitiré esta especie mientras no encuentre tecklae. Común en la campiña.

Serinus canaria serinus. Muy común en el soto, sobre todo en los linderos, cantando mucho.

Acanthis annabina mediterranea. Entre las viñas, en unos matorrales de Oxicentus y Rosa, vi un par de parejas.

Parus major. Vi algunos.

Parus coeruleus. Solo vi una vez.

P. cristatus. En el soto, junto al río y en partes no muy densamente arbolados, vi dos veces. Uno entre unos Oxicentus, y otro en un chocho. Cantaban algo. Me parecieron más pardos que los del pinar. Los pinares más próximos deben estar al menos 10 Km.

Luscinia megarhyncha. Común en el soto denso y matorrales, cantaba mucho.

Hypolais poliglotta. No ví pero me pareció oírles. Debe ser raro.

31-Mayo. T. merulae. Cantaba alguno. Vi restos de lo que quizá fuera un juv. independiente perfectamente emplumado.

Miré con bastante atención en busca de A. scirpaceus, o arundinaceus en los caños reales, en vano.

Tampoco vi señales de Cettia ni Phy. bonelli. El último pudo ser - uno que cantaba.  
Prestar más atención a Muscicapidae.

Hirundo y Chelidon, escasos, la última con duda.

Riparia riparia. Volaban varios sobre el río cerca del cortado, pero no encontré colonia. Me han dicho que abundan muchísimo, (les llaman pica-abujeros) en un corte pequeño próximo a Valoria la Buena, en la orilla derecha, Pisuegra y en Pollos.

Hay que admitir dispersión general.

El pescador había cogido hasta doscientas, tapando anochecido las bocas y poniendo de mañana redes ante ellas. Se destapan y salen - enseguida. Probar para anillamiento.

Clamator glandarius. Vi un ♂ en el soto. Debe ser rarísimo.

Merops apiaster. Les oí en diversas partes del soto y examiné nidos empezados. Parecen estar dispersos, también se oían en el arido -- valle a espaldas del cortado. La colonización debe ser rara predominando dispersión en parajes o pequeños núcleos.

Upupa epops. En el soto.

Páridos. ver al final.

No vi tampoco aquí Caprimulgus, pero me hablan de ellos.

Otus scops. Ya a las 18 h. reclamaba alguno en el soto, debe ser común allí.

Me hablan de Lechuzas, en los árboles de la orilla del río y cortado, y Asio otus?, quizá carabo que canta allí por las noches. Del buho dijeron caza de espaldas, tirado en un sendero, a las liebres.

Falco peregrinus sbsp.? Por la mañana pronto vi dos sobre el cortado. Volvieron menos veces y se posaban en una cornisa con cueva, cerca del borde superior. Llamaban con un Cua - cua muy poco salvaje y volaban altos, sobre el cortado o rozando lo sumo. Encontré muchas plumas de Streptopelia, y en el soto un lugar donde habían devorado una. Probablemente es la presa favorita. Señalan la presencia de palomas.



F. subbuteo. Un par de ellos.

F. tinnunculus. Uno cerca del cortado y otro visto con duda. Posiblemente cria en el, ya que suelen verse por los de Cabezón.



Neophron penopterus. A primera hora, volaban dos sobre el acantilado. En un hueco me dijeron anidaba. Allí cerca había un manchón de excrementos sobre un saliente. Hay otros socavones donde podían -- anidar. No les vi volver.

Milvus migrans. Frente al corte, en unos 15-200 de soto 6 nidos. Dos de ellos casi juntos todos en chopos y a alturas de 5-8 m. aproximadamente.

31-Mayo.



Así, 4 nidos - los otros 2 sobre el río. (A)  
 Prob. uno de Pica excavados, sobre el  
 río, que estaba vacío.



Ext. - jales largos de 2-15 mm. de diámetro.  
 Int. - Palo más fino.

PROMEDIO DE 3 NIDOS.

Me dijeron que se había robado alguno ya, y efectivamente un chopo tenía señales de escalada. No le miré. Podían haberles quitado puestas anteriores. En otras tres.

- tesa. 172 A. 1 huevo, blanco, ovoide perfecto, muy fresco, pequeño.
- " B. 1 huevo, poco manchado, redondeado y de mucho mayor volumen. Muy fresco.
- " C. 2 huevos bastante manchados, sobre todo extremo grueso, ovoidales-redondeados, tamaño medio y bastante incubados.

Los milanos sobrevolaban los nidos y el cortado. A varios le faltaban remiges secundarios. Ya a las 7'30 levanté uno del tejado en el palomar de una finca, que se posa a parte, cercano, levanté un par de ellos en copa de árboles del soto. Volaban sobre Coloeus. Se posaban en la greña al pie del cortado. Gritaban bastante diferencia de M. milvus, más musicalmente. Les molestaban algo grajinas. Los restos de una tortola, atribuibles a ellos.

Me hablaron de un aguila "blanca" que anidó en un árbol de isla del Duero. Pollos a quien quitaban todos los días la caza. Después -- dijo un bulo, por lo que solo hay que aceptarlo en principio. (Domegó crías para cazar gallinas).

Streptopelia turtus. Salían en grandes bandos de bosquecillos algo claros. En grupitos. Arrullan poco. Aún no emparejados. Un bando quizá de unos 100, muy comunes. Muchas plumas por el cortado.

31-Mayo. Columba palumba. Común, arrullaban bastante. Un probable nido sobre el río, en olmo tejido, a unos 4 metros.

Creo que ví C. oenas entre ellas. Hay que distinguir arrullo.

C. livia. Dos parejas en el cortado, parte inferior posado en las aristas. Una paloma blanca-abigarrada, las otras típicas. Doy por sentado que no existen aquí colonias puras. Me dijeron que van muchas al este en los calores del verano (y se cazan bastantes a la espera) procedentes de un palomar vecino.

• Charadrius dubius. Oí uno en las cascaderas, bajo la presa.

También me dijeron anidaba Gallinula, (la busqué) y alabancos, señalan dome el lugar (trigal y soto) donde supieron nido. Al parecer se cazan bastantes en invierno en la isla de más arriba.

El pescador, 60 años de caza, ha visto muchísimas garzas, pero nunca un nido de ellos, aunque ha recorrido el Duero y Pisuerga por muchos sitios. Creía que darían los huevos a incubar a otros.



• Picus viridis sharpae. Por el borde de las tierras oí varios.

Dryobates major hispanus. Tres se tamborileaban y respondían en el soto. Pesqué a uno de ellos en plena faena, en las ramas secas en la punta de un álamo bajo. Daban unos 7 golpes seguidos. No distarían más de 50 m. unos de otros a juzgar por el sonido.

Grito de alarma al salir volando. Kio - koki - coki - kokii notación "in situ".



Encontré también en lo alto de Peña caída un yacimiento prehistórico, piedra pulimentada.



Quizá cantos rodados.

Loma, Peña Caída. Orientada al E. Desparramadas a lo largo parte media y superior de la cuesta, muchos utensilios, de cuarzo? rojo, solo un gris, la tierra es marga gerifera, con calizas, y no hay cuarzo en kilómetros y solo en aluviones en cauce. Restos abundantes de ladrillos ¿tejas? y alfarería. También encontré unos trozos de hueso, deleznable, y un trozo de hierro y una cadena, esta curiosamente doblada a cada eslabon y seguramente muy moderna.

Probablemente fué aquello un pueblo fortificado que dominaba la llanura, y el río ha ido erosionando la cuesta.

Preguntar por cuevas. Examinar monton de piedras cueto.