

Valv. 1951

15-Jun. Picus viridis sharpey. - Un nido habitado en un almendro, 2 m. entre tierras, Abundaba allí. Posiblemente hubiera salido ya la familia. Efectivamente, cuatro días más tarde familias independientes, cobra do uno.

Caprimulgus ruficollis - Hay una pareja en el soto claro, cerca de velador. Ayer cogimos puesta fresca en el Sotillo

Milvul migrans - Daba vueltas continuamente y se posó en un chopo. Hay por allí buenos chopos para que anide.

19-Jun. Santovenia.

6 h. - 13 h. of. - Típico valle cultivado con graduaciones.

Recorrido. Carretera del Carmen, prado de Santovenia desde corte de Tres Her manos, soto, permanencia en la cascajera y vigilancia de los cortados del S. Vuelta e ida hasta la cascajera y después atravesando campos.

Sol, viento rio abajo, bastante fresco, ayer hizo malo. Algunas nubes.

Dentro de una semana empieza la siega. Aquel terreno es de regadio totalmente. El Soto no es denso.

Distinguí tres formaciones :

1ª.- Huerta y regadio, con prado, no arbolado
Se caracterizaban.

Acanthis cannabina- Muy común, indudablemente el frángilido de dispersión más general y posiblemente más común de las aves. Hace 3 días, nido con 4 huevos bastante incubados. Probablemente están incubando 2ª puesta. Cantaban bastante.

Emb. calandra- Muy común en el prado. Busqué un nido al que llevaban cebo los padres, entre hierba densa y matos de cardos. Cantan bastante, pero ya menos.

Motacilla flava- Común y en ceba; ¿nido de pollos? No vi familias.

C. coturnix - Cantaban bastante, de mañana.

M. flava, E. calandra, Coturnix, Acanthis - la dirección tendencia que pasa insensiblemente a

Gal. cristata- Muy común, ver notas de nido. Casi todo en ceba.

Oenanthe - Solo en 3 puntos, ♂♂, cantando algo al vuelo y piando. Lugares pedregosos e incultos, pequeños cortados y áridos, lejos del soto.

2ª.- Arbolado caducifolio - En carretera,

Sturnus - que anida en cantidad por aquellas fincas. Serinus, muy común y cantando. Chloris, mucho más raro y Passer domesticus. Señalando transición poblado como ya he notado otras veces.

En Soto

Streptopelia, Oriolus y Pica, comunes. Mas raro Luscinia. Fringilla coelebs, le oí reclamar una vez en el soto bastante denso. Hay que admitir para él dispersión soto-pinar restringida.

3ª.- Ribera. Interesante por presentar las cuatro formas

19-Jun. - a - Arboleda. Como en el soto

b - Con lindes de Salix, achaparrados, en transición con prado u otro biotopo. Anidaban junto al río E. calandra y M. flava. En los Salix ribereños encontré común Hypoleis poliglotta, en ceba de pollos. Señalar la falta de Sylv. communis en estas últimas excursiones, en que no he mirado Rubus ni Ulmus bajos y densos.

c - Cortados - Oí Merops, no vi nidos. En los altos criaba a media altura Acanthis y me pareció ver Petronia que tiene que anidar.

Columba livia por domestica - Hay palomar en la iglesia. Desde ella, parejas a los cortados, se paraban. Me dicen crían algunas en huecos que me señalan, allí iban otras. Por lo menos dos parejas. Una colorido típico y otra abigarrada en negro, como en formas primitivas, uropigio oscuro aunque visible. A la cascajera bajan a beber parejas, blancas, abigarradas y típicas, las menos.

d - Cascajeras - Con barro en el extremo, externas, sembrados los charcos con cangrejos y peces y manchones de arbustos. Poco o nada de arena.

Charadrius dubius monicus - Dos parejas posiblemente una en incubación y otra con pollos grandes, puesto que he visto uno o dos juvs? , collar poco marcado, pico mas oscuro, cabeza mal emplumada, plumaje más gris, que andaban solitarios, picoteando entre el limo.

Chillan bastante. Se distingue bien el tamaño del ♂, la ♀ parece más esbelta y pequeña.

Sin duda equivocado, ambos sexos son iguales solo el ♂ anillo orbital amarillo y mancha pectoral negra mayores que la ♀.




Ixobrychus - Entre los Salix estropeados y junqueras levanté un ♂ que vino a un grupo de pinos y anduvo después de rama en rama con torpeza.

En estos días los hemos levantado en La Flecha, entre Phragmites, Cabildo (Salix) y aquí en (Salix-juncos). Puede suponersele muy común.



Indudablemente anidan allí Podiceps, Gallinulas (vi huellas) y probablemente Rallus en la pradera, entre los charcos cubiertos del cañaveral.

Acrocephalus aunque no vi tiene ya que andar por allí.



ch. dubius.

Sartrouvenia 19-VI-51