

Valv. 1951

Adaja.

1-Jul. Pinar. Albar, chopo, raro fresno, alamos. Cauce arena en bancos movibles. Islitas detras de Salix que han arraigado. Escasos typha, en cortas hileras ralas. Borde cortado y emmarcado. Igual al de Evesma y Cega por la parte del pinar.

Como característica destacada. Fondo arenoso inestable y escasa prof. con corriente rápida. Falta de Limo y por ende de almejas. No hay algas, ni juncos a penas. Abundancia cachos pequeños y Barbus (cobrado uno) y por ello abundancia de garzas. Había Yxobrichus, pero deben escasear en muchos tramos. No esta bien para Podiceps por las variaciones de nivel y lo inquieto del agua. Charadrius no encuentro sitios, es ideal para totaminos.

7-Jul. Recorrido. El Pinar, Laguna de Duero y visita a charcas, carretera - hasta el Puente de Laguna y soto del Duero, atravesando después pinar al punto de partida. H. 8'30-18 h. of. Dia caluroso amenazando tormenta que pasa a lo lejos por la tarde. Algunas nubes.

C. corone. Pinares de Laguna y soto. Veo parejas unicamente, aunque ya deben haber salido fam. hace tiempo. Una cobrada en la Fraila estaba en plena muda.

Cyanopica. Dos juntos soto.

Coloeus. En el soto encuentro bastantes, cerca de la finca grande, reunidos, Desde los últimos días de junio he visto crias que casi no volaban.

Sturnus unicolor. En el pinar de Laguna, reunión numerosa 50 individuos al menos, como siempre algún Pica entre ellos. Parte venian del pueblo, a 1 Km. a buscar cebo y volvian en vuelo recto. Otros eran jóvenes. Los ad. se reunen temporalmente con ellos. Bastantes dispersos soto.

En la parte de pinar solo vi Lullula que canta aún bastante desde lo alto de los pinos, Lanius senator que aún no ha sacado los jóvenes. (Estos 10 días vemos bastantes, muy ostensibles los padres, posándose en lugares destacados (ramas bajas peladas, postes, algún cables, etc.) y ningún juv. (La fecha de puesta es tardia como he visto otros años), algún Serinus, P. cristatus, en grupitos ya. Upupa, Streptopelia, Pica y C. corone. (Aun no hay crias de tórtola) y P. tinunculus y Picus ya sueltos, algo común, debe estar cebando aún crias.

Abundan extraordinariamente las chicharras de las que se encuentra una camisa larva en cada tomillo. Al atardecer se mueven mucho.

En el soto no vi Ch. dubius en los arenales, junto al P. de Hierro un Actinioides hypoleucus, la fecha es ya de paso, pero habrá que venir otro año.

Centaban aún, aunque poco, Luscinia y Ph. bonelli, tórtolas arrullan mucho aún. Ahora sé de 4 nidos con huevos. Oigo poco a Columba palumbus que sigue viniendo en la misma prop. más común soto que juncos, (aquí escasea). No vi crias Oriolus.



Las plumas no mudadas del dorso tienen un color pajizo o pardo amaraticado. Las pequeñas coberturas alares y subalares y escapulares, y el pterilo dorsal, son muy parduscas.

Algunas coberturas subalares ya mudadas (la 1ª línea del borde ant. del patagio). La cabeza, no mudada, es muy oscura.

Valv. 1951

7-Jul. Laguna de Duero.

Queda agua charcas, regatos y en el puente. No lo he visitado desde hace un mes y medio.

Emb. calandra. aún reclama.

Motacilla flava. Ayer cogió un pastor un nido con huevos ya muy incubados, les rompió. Ahora andan entre el ganado. Hay juv. independientes de la primera nidada y parejas en cria. No oí cantos.

Charadrius dubius. Una pareja en la charca del puente, donde el barro endurecido puede parecer un pedregal. No sería imposible que hubieran criada allí. Aunque he visto cáscara de huevo en otros sitios, no se hacen ostensibles los juv. aún.

Vanellus vanellus. Vi uno que se posó en el barrizal seco. Ayer por la tarde vió Luis 4. Es muy probable que hayan criado aquí este año. No chilló ni una vez.

H. himantopus. Una pareja que tenía indudablemente las crias entre las espadañas del canal central. Mientras las buscaba, se acercaban los padres dando pasadas, (no picados) alrededor de mí y chillando de continuo. Les hice dibujos. Uno de ellos empezó a gritarme apenas me acerqué a 200 m. del sitio en que supongo tenían los juv.; el otro permanecía posado en la desnuda superficie de barro, aunque de vez en cuando seguía a su compañero en las evoluciones, siempre más lejos. Creo que el osado era la ♀ (no le ví occipucio oscuro)

Me senté a observarles una h. desde unos 100 pasos, en el sitio en que estaban juv. La ♀ se levantaba a ratos a chillarme y se posaba a 50 pasos de mí, picoteando nerviosa. Gritó casi continuamente.

Ahora hace un año tenían crias grandes en Medina y ya había partido alguna pareja.

Podiceps ruficollis. Se sumergían bastantes en el regato central.

Rallus aquaticus. Le oí chillar en un punto y les ví en tres más, levantando uno entre los scirpus, el resto en typha. Uno de ellos recorría un pequeño sp. en la charca pescando sin interrupción, y rebuscando impaciente. Debía yo estar sentado junto a los juv. de los que no ví rastro. ¿Es muy tarde?, por otra parte, pasa juv. no independientes. Sospecho que el primero que oí fuere cria, no pude levantarlo de un pequeño mato. El colorido era muy brillante en los ad. que ví.

No ví Gallinula. Debe haber pocos este año. Ahora estaban segando las espadañas los cesteros, no dejando ni una brizna.

Anas platyrhynchos. Vi 4 y les hice dibujo, al vuelo y posados. Les observe un rato a 40 pasos, reunidos y hozando la charca, todos deben ser los juv. de la pareja que crió allí este año. Vuelan perfectamente pero no son confiados y no salen del ámbito de la laguna. Ahora me entero que el año pasado cogió la pastora el nido, con 16 huevos, (blancos, como los de gallina, me dijo) en la charca del rascón. Estos pastores destruyen cada nido que encuentran (no se ni lo llaman ronchar, o roncar los huevos, al romperles).

Ya no hay cigüeñas en la laguna. Quitaron los nidos. Ayer vió Luis dos en Viana (torres).

En la laguna ví un Arvicola, tres Tropidonotus viperinus (cogí una) y bastantes ranas, los renacuajos? están gordísimos, asomando patos port. con líneas amarillo dorados en los lados dorso. Hace 15 días aún ví huevos en montón ya muy desarrollados.



7-Jul. En los campos del recorrido vi Coracias garrulus, posado cables y cerca pinos, Merops, Galerida, P. tinunculus que a cazar a ellos - desde el pinar y A. cannabina entre otros.

Me extrañó escasez rapaces recorrido. No sé si oí a M. migrans.

19-Jul. Visita al Sotillo. Una hora escasa, a las 11 y sin gran cuidado. Oigo jilgueros y verdeillos, aún sin comer y en fam. Un verdoron reclama. Los gorriones casi todos juv. y muchos colicortos, (habrá algún ad. en muda) ocupan en bandos las huertas. Urracas colicortas, cropendolas llamando y estorninos en bandos, reclamando mucho,

Luscinia. Canta uno en lo más espeso del ranol. Ahora, en plena muda los ad. deben haberse refugiado todos allí. Al menos no veo en otros sitios, los juv. independientes reclaman sordamente. Uno no se si intentaba cantar algo.

Hypolais. Veo tres o cuatro juv. independientes, ayer se cobró uno perfectamente emplumado, formula poliglotta, partes sin el azulado plumizo de los X, (tiran más a pardo caramelo). Uno cazaba de ramita en ramita, en sitio pelado, cogiendo insectos al vuelo. No pasaba de medio m. altura. Oigo un cheeva.

Sylvia borin. Ayer se capturó un juv. que empezaba a mudar. Deben haberlo de golpe puesto que tenía numerosos cañones en todo el cuerpo, y 1º remiges secundarios, pero el colorido era aún juv. Hay ya 3 puestas cría Sylv. borin, juv.-nido- y juv.

Ph. ochurus. Dispersos por el soto, debía haber una agrupación -- familiar. Oigo posiblemente un nosquitero. En esta semana debe -- empezar el paso de trochilus.

En la iglesia de la Victoria, multitud de vencejos (entran y salen algunos de los huecos). Les observo sobre el río con los prismáticos sin poder ver diferencia de juv. a ad.

Las golondrinas ya se posan en las ramas, en familias. Estos días se han cobrado dos juv. independientes, con las rectices ext. cortas. Algunos se bañan al vuelo. Volando a poca altura se acercan a una cuarta del agua disminuyendo la velocidad con un aleteo particular, y se dejan caer con las alas un poco levantadas y abiertas, chocan de pecho y da la impresión de que rebotan, emprendiendo entonces un vuelo titubeante para elevarse. Se bañan varias -- veces seguidas.

Acrocephalus scirpaeus?. La razón de mi visita la descuidé una vez allí. Oí uno con duda y vi otro silencioso, recorriendo las Typhas casi saltando de tallo en tallo, es decir sin hacer vuelos largos, y a ras de agua. No llevando cebo, ahora deben tener juv.

No se si era scirpaeus porque dorso y quizá cabeza me parecieron manchados, prob. por la muda, desde luego no hacia oscuro ni se veían rayas oscuras en el plv. A señalar sin embargo en las -- observaciones de campo. No hay duda de que son scirpaeus, después de las observaciones de los días 21-22-VII, en Arroyo Simancas.

21-22-Jul. Soto Pisuerga de Valladolid a Simancas. 21-22
Día 20. 9-15 h. of. en barca hasta las colinas de Arroyo, con -- calma, día muy caluroso y sin viento.

Día 21. 9-21 h. El sol se cubrió un poco a medio día. Viento no constante, que rizaba el agua del S o S.S.W. No hacia tanto calor.

A partir de Valladolid, el río corre en curvas grandes, con rectas de gran longitud entre tierras de regadío que ocupan la orilla -- baja. El soto denso y bien arbolado a ratos, en donde predominan a trechos olmos, chopos y álamos, muchos de estos altos y fuertes.