

Valv. 1951

23-Agos. Excursión a Simancas y confluencia.

10'30 h. hasta que se puso el sol. Día bueno y caluroso, apenas viento con alguna nubecilla por la tarde.

Simancas, puente, orilla hasta el pinar, estancia en este, presa de Pesqueruela y confluencia. A las 4'30 regreso por la orilla izquierda, bordeando el río hasta el pueblo.

En las laderas ya se ha cogido el trigo. Los pocos que encontré con la mies en el suelo. El terreno es casi todo de regadío, con remolacha que riegan ahora y escasos huertos de frutales.

Se hizo foto del pinar, confluencia y habitat *Nycticorax*. Ver en esta crítica del terreno.

Listas de especies.

- \* C. corone. Muy común. A las 10'30 h. y al anochecer. **Valvían** en parejas, tríos y 4 hacia los pinares. Gritan bastante. El plumaje me pareció bastante bueno, probablemente por tratar se de juv. en muchos casos. En una faltaban los primeros secundarios (**iniciando muda**)
- \* Pica pica. Común y dispersos, solitarios o en parejas. Yo no vi familias. En alguna cola corta. Van observados con cuidado, cabeza completamente pelada y feísimos. Plena muda.
- \* Coloeus. Iglesia y archivo de Simancas.
- \* Cyanopica. Tiene un magnífico habitat; verle en el soto - pinar, donde le señalamos hace tiempo. No vi. Probablemente están ya en los pinares, donde no penetré.
- \* Sturnus vulgaris?. Creo que eran de esta especie 3 juv. que empezaban a **mudar**, examinados en mano, a juzgar por las plumas **nuevas** con clarísimas puntas blancas del pecho y abdomen. El resto del plumaje era corto. Al cobrarles se vieron grandes bandos. Yo encontré uno de unos 200 junto al río y otros pequeños que quizás fueran de unicolor. Sigue la duda sobre los juv. y primer plumaje de ambas especies.
- \* Oriolus. Escasea. Vi un ♂ y un juv. juntos. No se le oía. Probablemente habrán partido ya bastantes.
- \* Carduelis. Familias **en** almorrones y setos, campo raso. Alguno en los chopos del soto. Es bastante común.
- \* Serinus. Vi dos juntos y oí en varios sitios. Limitándose al soto como siempre.
- \* Petronia. Un bando de 50 en el soto, punto más próximo al pinar, a las 11'30 h. Al anochecer los oí y ví en el mismo sitio. Estaban agrupados en árboles dispersos y achaparrados. Dormían en los olmos y otras matas del talud.
- \* Parus major. Juv. independientes, alguno suelto.
- \* Galerida cristata. El único alaudido que ví en esas tierras bajas, con predominio de regadío. No muy común.
- \* Motacilla alba. Unos 50 en la presa de Pesqueruela, casi todos juv. de colorido muy gris y alguno ad. Salían en grupitos a los Salix de las orillas e islitas, donde supongo dormirán.


1v. 1951

23-Agos. Los individuos examinados con atención estaban en plena muda, con la cabeza pelada y fea y el plumaje tan corto y raído que que parecen mucho más esbeltas y altarcionas que de costumbre.

Ahora deben haberse reunido para mudar juntas o quizá ya en agrupaciones ¿preemigratorias? en los puntos favorables.

Muscicapa hypoleuca. Muy común o comunísimo. El ave más abundante. Su grito se oye por doquier aunque muchos están silenciosos. Todos los individuos observados con atención (210) con librea invernal. Pleno paso.

M. striata. Solo ví con certeza unos pocos. Estuve observando (14 - 15 h.) un rato a un individuo que cazaba desde un chopo viejo desnudo sobre el agua. Se levantaba a coger insectos distantes 6 ms. Su "territorio" estaba a un nivel superior a él.



Phylloscopus trochilus. Vi uno sin duda. No sé oía su grito mucho.

Luscinia megarhynchos. Aún hay bastantes me parece, reclaman con el chorr. sordo.

Sylvia borin. Creo que de esta especie, una pareja reclamando con extrañeza y muy localizados entre unas yerbas. Si alguna vez comprendo que hay crias aún en esta fecha. Atención a esta nota.

Acrocephalus scirpaceus. Vi perfectamente a un par de metros dos individuos, no dispersos, por carrizo, espadaña y chopos ribereños, a poca altura, cazando insectos. Son muy curiosos, como M. hypoleuca o más.

También me pareció oír arundinaceus.

Me extraña no ver Hypolas. Deben ya haber partido.

Oenanthe sp. Solo ví una ♀ o juv. en el trigal, en cables

Hirundo rustica. Pocos, sobre el río. No hay ya familias, deben haber partido muchos.

Chelidon. Igual.

Apus. No ví, terminó el paso.

Alcedo

Upupa. Dispersos y solitarios, comunes y seguramente ya en paso. No creo sin embargo que haya ninguno sup. al menos. Vi bien una, bien emplumada.

Coracias garrulus. Falta totalmente. Hace un mes que le vi la última vez. (el día 1º) y en este intervalo han debido partir. No es aquella parte muy adecuada por falta de grandes álamos, por proximidad pinar y terreno bueno, debía haber muchos. He mirado desde el Puente ¡y del Arroyo a allí vi otra vez 4 - 5 parejas!

Yalv. 1951

23-Agos. Merops apiaster. Les oí al pasar en familias pequeñas, por unos 4 sitios, y les ví en dos de ellos. Uno, familia en árbol seco junto a nido. Otra familia en cebó que observé un rato.

Había un juv. en un cable. Uno de los padres se posaba junto a él unas veces con cebo, y se lo alargaba después de sacudir a un lado y otro la cabeza un par de veces. Estaba unos 15 segundos posado y partía, dejándose caer, pero regresando en breves instantes con una nueva presa.

Otras veces el padre se posaba en el cable a unos 3 m. de la cría, obligando así a esta a dar un vuelcito para alcanzarle. Ambos, posados contra el viento, se ponían hombro con hombro. El juv. cogía la comida, que alguna vez retiraba el padre con una sacudida de cabeza, de pico a pico.

Merops. Un poco más allá, otro padre hacía igual con otro juv. A veces quedaban estos solos y se les oía su continuo tui, -- debil y poco espaciado.

Supongo que los padres alimentaban a los juv. más retrasados, mientras algunos que veía de vez en cuando volaban ya por su cuenta.

Parece por tanto que este año tardio, hay familias en ceba -- hasta fines de mes, mientras que otros se han agrupado ya y partido hace una semana por estas fechas.

Picus viridis. Dispersos, solitarios. Levanto uno al atardecer de unas remolachas.

2 ♀ ad. cobradas desde el 19 iniciando muda, con estropeadísimo plumaje en que empezaban a nacer remiges y coberteras alares. El color de este plumaje viejo es un pajizo, con partes amoratadas bajo las alas, y de un conjunto ancho mas claro. Estan -- bastante silenciosos. Abundan allí. Ya no hay grupos familiares seguramente.

F. tinunculus. Vi en dos ocasiones cerca del pinar y dirigiéndose a él al atardecer, uno chillaba.

F. subbuteo. Vi al menos cinco. Uno al acecho en un chopo -- destruido en la orilla del río, salió de media altura con rápidos quiebros. Otro volando raso entre el pinar se posa y esus tado volví a verle trasladarse dos veces más en vuelos cortos de alrededor de 60 ms. la trayectoria es:

Se posaban en las gruesas ramas que se bifurcan en la parte baja de la copa.

Un M. hypoleuca le chilló un rato sin dejarse ver. El alcotán le buscaba inclinando la cabeza.



Buteo buteo. Uno sobre las tierras cultivadas, junto al pinar. Volaba en plan de caza alrededor de las 18 h. Le perseguían golondrinas.

Xyobrichus minutus. Me extrañó no ver una sola sobre el río en todo el día, a pesar de lo que miré. Al intentar levantar un pato salió lo que me pareció una ♀ ad, junto con un Nycticorax juv. de un mato ribereño.

N. nycticorax. Ver hoja aparte. 4 juv. (probablemente solo 3-2) y un adulto en Mazariegos.

C. ciconia. Vi un nido en Simancas y otro en la torre de una iglesia, cerca de la confluencia, ambos en la espadaña y abandonados.

Valv. 1951

23-Agos. Charadrius dubius. Un ad. y un juv. con plumaje feo y que parecía más pequeño que aquel, en las cascajerillas y presa de Pesqueruela, junto a Actynioides y M. alba. Abundaban en Simancas playas pedregosas pero pequeñas y de guijo fino.

Actynioides hypoleucus. En al presa de Pesqueruela una media docena de individuos y alguno suelto en el río. Vi persecuciones y ataques intempestivos. Rebuscaban entre la ova de la pesquera con las aguanieves.

Tringa ochopus. Levanté tres en un rincón pantanoso lleno de hierba y espadañas, al parecer con buen plumaje. Cerca había Actynioides y tórtolas. Las dos últimas andarrios parece diverentes por la preferencia de Actynioides por sitios más desnudos, abiertos mientras que ochopus quiere hierba. Esto no concuerda con lo observado en la Laguna del Duero otros años.

Anas platyrhynchos. Alrededor de las 13 h. uno vino a echarse con gran ruido a la sombra de unos chopitos, junto al talud, carrizos ralos. Igual vi a las 18 h. Ambos eran juv. bien emplumados. El segundo no se si se quedó escondido aunque tiré piedras.

Probablemente era azulón también otro que levantó un cazador y vino con un vuelo corto y a ras de agua a esconderse a unos rai ces donde siguió nadando con el cuello tendido. La cabeza me pareció de un pardo verdoso uniforme. Me informaron que se veían por las islas una familia de patos por las mañanas.

Gallinula chloropus. Levanté un ad. del suelo, torpe y al parecer mudando, bastante. Vi otros dos, uno junto a un Nycticorax. Debe abundar allí.

Podiceps ruficollis. Vi un ad. cabeza muy roja aún, en un canalillo bien poblado de plantas acuáticas.

Mariano, su hermano y tío vieron ayer dos aves cuya descripción tomada por separado, hace pensar en Nycticorax. Tamaño ganso casi, cuerpo rechonco y fuerte, pico fuerte y corto recto y muy visible, cuello largo. Se posaban en tocones a ras de agua y se levantaron volando con lentitud con sus alas redondeadas? sobre el río. Se les hicieron disparos; me fué imposible encontrarles a pesar de que dediqué el día a su búsqueda.

Streptopelia. Aquí levanté a una de un nido con huevos o pollos recién nacidos. Se veían todos por parejas y casi todos ad. los que he visto ultimamente muertos eran también casi todos adultos. Creo que la veña o las lluvias han impedido la cría, a pesar de que este verano la llegada de las tórtolas fué extraordinaria.

Columba palumba. Vi únicamente 3. Solitarios.

Coturnix. Se levantaron chillando de una linde y vi smontonadas en un triguil una media docena.

Perdiz. Canto una.

En conjunto es de señalar la partida de Hypolais y Coracias garrulus, entre los últimos. Desaparición? de puntos de cría de Cyanopica.

Partida parcial de Oriolus, Luscinia, etc.