

6-Sep. Athene noctua. Uno en el corral.

F. subbuteo. Con duda, una pareja.

F. tinunculus. Dos gritando al atardecer.

Streptopelia. Bandos de hasta una docena, algunos dispersos, cobrados un juv. y un ad.

Codornices. Un bando de 4-5, con 2 pollos, tamaño gorrión, cobrado uno, y otros 3-4 sueltos.

Pelobates. 2 sueltos.

14-Sep. Valladolid - Villa Ester.

Buen día, con sol. h. of. 14, atardecer, llegada a las 15 h. y caza en bosquecillo caducifolio.

Carretera. Estribaciones raras, llanos, extensas de los Torozos, algún arbolado, (caducifolio y pinarcillos) aquí y allá. Cereales y viñas en grandes extensiones.

C. corone. Común en parejas.

Coloeus. En Simancas, Tordecillas y Villa Ester.

Pica. Rara. Bandos numerosísimos de tordillos, cerca de Tordesillas.

Muscicopa hypoleuca. El ave más común, dispersa por doquier, sobre todo en la línea de arbolado. Hace dos días les había incluso en las cuestas de la Maruquera y Fuensaldaña. Paso máximo.

Oenanthe hispanica. Vi perfectamente un ♂, garganta negra, con una ♀ o juv. Ya no hay casi Oenanthe.

Vi Galerida.

Falco naumanni. Unos 80-120, en los postes, cobrado uno, Ver nota.

Pernis apivorus? Uno solitario sobre descampado extenso, Tordesillas.

Otis tetrax. Común o muy común en esas llanuras. Bandos de 12 - 13 - 9 y solitario. Parecen abundar mucho allí. Perdidos con alguna mata y cereales. Se mata también alguna avutarda, que es común desde Tordesillas o antes.



Punta alas
asi, quizá
por muda.

Alectoris rufa. Una familia de unos 8, cruzó la carretera.

Coturnix. Parece haberse ido ya. En Villa Ester hubo muchas este año, cerca del prado.

Tórtolas. En los postes, 2 bandos de 20-40, hacia las 16 h. Al dormitorio acudían bastantes. (nota)

Torcaz. 3-4 posadas en un trigo segado, otras 8-9 bando en un pinar.

Otus scops. Cobramos un juv. plumaje bueno en Villa Ester.

Mochuelo. Gritó uno.

Las golondrinas me dicen se han ido. Aún veo bastantes aviones (Chelidon) estos días.

14-Sep. Caprimulgus ruficollis. Un juv. en un bosquecillo de olmos.

Upupa. Unos 4, solitarios, dispersos.

Pterocles alchata. Una, por donde los sisones. Cierta duda.

Petronia. bando en un puesto.

Alcoytán, uno.

Luscinia luscinia. Con los Acrocephalus, en el regato, varios casi con seguridad de esta sp. Paso.

Alcaravan. Un solitario.

Abundan allí Coracias, pero no quedaba ninguno.

Picus. Bando de unos 5, cobrado un juv. casi mudado a ad. en un bosquecillo de olmos. No debe escasear en las arboledas.

En conjunto, vi un habitat de transición de páramo campaña, muy desforestado y extenso, más bajo que el páramo y superior al valle.

La fauna típica de Otis tetrax, Pterocles, O. tarda, Alectoris y seguramente Alcaravan y varios Alaudidos y A. campestris. Geográficamente es una parte de la llanura de la tierra de Campos, con el Sequillo de enlace, y límite de depresión entre la fauna xerófila del N. y las Coracias y Clamator del arbolado denso del Duero. Todo el valle es propio para el establecimiento de Cyanopica, que sin duda cruza el río por algunos sitios allí.

La mancha de encinar, carrascal y soto debe ser sin duda uno de los rincones más salvajes y propicios a la cría de Aguilas y rapaces de toda la provincial. Abunda la caza.

26-29-30-Sep. Castillo de Tuensaldaña y Cuestas.

Recorrí las cuestas por la tarde dos veces.

Streptopelia, Un bando de 8 y otros 2-3 sueltos (el día 26)

Son comunes por las laderas, rastrosos y campos desforestados Galerida y Oenanthe, probablemente O. oenanthe. Ambos van dispersos o en parejas y tríos. Galerida se ve casi siempre emparejada.

Vi Anthus sp. pocos y muy dispersos

En los huecos de matos y almendros abundaban en corrillos los Muscipidos. No hay bandos claros sino agrupaciones en corto espacio -- donde se veían con Emberiza calandra, común en banditos y dispersa (ahora solo se oye su grito de alarma al huir, un tec-tec espaciado) por toda la cuesta, algunos Phylloscopus sp., Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra, M. hypoleuca y me pareció que alguna Sylv. borin (con mucha duda).

M. hypoleuca. Es común por doquier, no solo aquí, su densidad relativa es menor que en el soto y partes más arboladas. En el fuente del Sol, en la chopera, había varios con su distrito claro.

Saxicola rubetra. Es también común. Lo he visto en sitios rasos y no demasiado aridos, sola o a veces dos o tres próximos. Se posan en los juncos, cables, alambres de setos y reclamaban poco, un grito melancólico al final en 2 periodos. He encontrado una probable en un estómago de Cernicelo el día 2.