


3-Ene. Cortas de Blas. Villalba.

En coche hasta la finca. alrededor de las 10 h. Todo el día recorriéndola, por lindes sobre todo. Cazando.

Buen sol, sin aire, día magnífico.

Se hace taxiado, incorrecto, pero las cifras re flejan bastante.

Corvus corone. Por parejas, había unas 3, en en cinar y tierras. Una se puso a 4 ms. en encina seca, a rascarse, alrededor de las 16'30 h.



C. frugilegus. En el viaje solo los veo ya en el páramo alto, donde alternan en encinar y campos. Conte 2 bandos de 6 (encinar) y 20 en (campo).

Dispersos por la finca en los otros bandos. Uno de unos 30, separado probable de otros más grandes, otro, parte del anterior de unos 100 que se levantaba de los campos. Hacia las 13 h. éste? y otro -- de más de 250 se levantaron para hacer la rueda, muy largos. Por todo el terreno hay grandes bandos que ocupan sobre todo las -- tierras. Es posible que en el grande se interpusieran Coloeus (no señales!) pero creo que más bien son chovas.

Al caer la tarde (de 17 a 17'30 h.) pasaron en dirección W. o NW. primero un bando que mas o menos de 50 contaría con unos 350 pájaros. Pero después, en la misma dirección un bando de 150. Se dirigen a -- un dormitorio que es preciso localizar. (Ver mapa)

En 17-XII, traspinedo, 2 bandos enormes de más de 3.000? individuos cada uno al atardecer. Se hicieron 4 disparos cobrándose 2 C. frugilegus, juv. narices emplumadas y viejo, y 2 Coloeus, uno de ellos muerto, que pasaron por mis manos. Averiguar emplazamiento dormitorio Torozos.

Pica pica. Anote hasta la una III-1-1-1-III por la huerta y campos. Son comunes en el encinar donde vi varios nidos.

En el camino vi un buen bando-asociación de Fringilla, Carduelis y Serinus en los árboles caducifolios de la carretera, orilla de un -- campo.

En el monte vi.

Passer domesticus. Muy abundante en la casa y dependencias.

Fringilla coelbs. No excesivamente común, disperso en grupitos por linderos, cerca de la finca, alguno en el encinar. Formaba un bando grande de

Emberiza cirrus. Partieron de los pinos en oleadas y mezclados con Fringilla, (alguno) en conjunto unos 150. Posiblemente hubiera más. ¿Su? grito con chrurú o piú (in situ). Un bando de unos 15 se puso en cables, distinguí en el uno o dos ♂♂. Se cobró una ♀. Más tarde encontré un bando 30-50 en la linde de mato de encina, (donde pollos-perdices Agosto-51). Gorrjeaban y hacían bulla. Abundantes ♂♂

Ultimamente un bando de 12 en el Cabildo, matorrales, y otro mayor en la Maruquesa. 4 bandos, todos en arbolado caducifolio o matorral disperso entre los campos, poco asociados. Hay que observar que es -- ahora ave muy común, como se notó otros años.

Emberiza cia. En pleno encinar se veían algunos grupitos dispersos, que se posan sobre todo en algún roble ahora deshojado, al menos al levantarlas. Cobré 3 ♀♀, una en piel. No vi claramente ♂. En el encinar es la especie más característica.

Valv. 1952.

3-Ene. Anthus pratensis. Cobrado uno de un grupito de 5 que se tiró cerca de Emberiza cia y Sylv. undata. Vi otro bando de 12 o alguno más con -- seguridad. Andaban en pleno encinar, por el suelo, y en alguna tierra verde. Cobrado uno.

Alauda arvensis. Abundantísima en el viaje y allí, en bandos desde media docena (pocos) a 100. Me cansé de anotar porque se levanta un bando y se reúne con otro mayor en el suelo, contándosele 2 veces; -- algunos se quedan en tierra y no se levantan hasta muy cerca. Es imposible hacer un recuento y hay que añadir confusiones con Calandrias.

Habitat, tierras desnudas, y plantadas, rastrojos, arados, campo -- abierto. Distancia crítica, variable de unos 16 pasos en algún rezagado a 20 en otros y mayor en los bandos. Hay que fijar bien la atención, esto señalado por cada especie.

Individuos solitarios, parejas, grupos, bandos rezagados. Mención si se caza.

En conjunto, el ave más común, ¿mezclándose con Calandria? y no con cogujada. ¿chillan y ¿cantan? (confusión con Calandria).

Melanocorypha calandra. Acercándome a bando que creí alondras, oí chirrido más fuerte y aspero y centos. Individuos volando a gran altura alrededor de 13 h. unos 5 minutos cantando. Contraste blanquinegro en las alas, ¿ribetes blanco punta secundaria? Puede ser muy común.

Galerida cristata? Cerca de la casa, bastantes. Paso en tierras, con concentración caserío, pueblos y carreteras.

Lanius excubitor. 3 solitarios, en encinar, posándose junto a ramas 2 veces en un cable, tirándose mucho al suelo. Abundancia relativamente notable en este habitat.

Falco tinunculus. Vi un en Espiritu Santo, se posó en roble alto. Ultimamente 2 en Valdestillas, otro cogido (Nota) en Valladolid. ¿Aumento correspondiente a mediados de diciembre y primeros de Enero, llegada de invernantes arrojadas por el mal tiempo? Probable.

M. milvus. Vi 3 veces. Una vez unos 5 grandes rapaces. Hay allí en verano. Densidad elevada, maximo en rapaces. El 27 vi un halcón peregrino en la Maruquesa. Aquí, en las Cortas, abundan palomas, pero ni rastro de halcones.

Burhinus oenedicnemus. Oí uno, creo.

Picus viridis. Vi dos veces.

Alectoris rufa. Un bando de unos 14, en las tierras, linde del verano

Sylvia undata. Al menos en 3 sitios, solitarios, en mata baja, no pude cobrar.

Comentario general.

No he anotado Emberiza calandra, por falta de observación. A señalar la falta de Saxicola torquata, nidificante habitual. ¿Hay emigración parcial, descienden a los valles (juncos) quedando solo (o predominantes) los ♂♂?

Falta de Lullula arborea, no oída ni vista. ¿Falta observación? migración???

Encinar.

Emberiza cia. Dispersa en grupos. Sylv. undata, solitaria, paso común y también en la pinpollada. Emb. cirrus, en grandes bandos.

Tierras.

Gran abundancia de Alauda y C. frugilegus; Melanocorypha en algún sitio.