

Valv. 1952.

Abril.

Alites obstetricaus boscae - Lat.

Un Alites o dos examinados eran de esta sp., pero jóvenes. Como obstetricinaus y cisternarii, conviven en el Centro (Madrid), hay que buscar los parteros de regiones arenosas, propios para cisternarii.

Pelobates cultripes - Hallado en la Laguna, unicamente.

Bufo calamita - En Laguna y La Flecha.

Bufo vulgaris - Informes vagos y recuerdos vagos. Uno muerto y muy podrido en Santovenia.?

Quedan por identificar las Ranas?? de la orilla del Canal. Por su aspecto se parecen a Bufo viridis, pero este no vive en España. (Con respecto a eso, ver en Iberica una nota, pocos datos ecológicos, sobre B. viridis en Baleares. Perdí la copia, pero recuerdo hablaba de Mallorca o Menorca, creo que de la última).

Hila arborea - No examinados. Hay que determinar si es de esta sp. o H. perezi. En el primer caso, si es típica o meridionalis, localidades conocidas, el pinarillo, Laguna. Entre Scirpus ambas.

Rana sculenta ridibunda - Pall. Por doquier, pero su diferenciación de iberica dudosa.

Rana sp. parda. No determinada en mano. Señalada con probabilidad en Corcos, Laguna, etc. En la orilla del Pisuegra quizá más común que sculenta; en charcos mucho menos.

Blanus cinereus - Diversos habitats; Pinarillo; Puente Duero, Huerta del Rey; Pinar de la Laguna, comun.

Lacerta lepida - Común. Buscar habitats y fenología y alimentación.

L. mivalis - Desconocida subespecie. Buen lio. Fenología.

Acanthodactylus vulgaris - No determinado en mano. La Fraila, Puente Duero, encinar, y Torozos, prob.

Psammodromus sp. - No determinado en mano. Laguna de Duero. Villamena de Duero.

Chalcides lineatus - Examinado un ejemplar, hay que mirar más.

Asas Reales (fecha de parir) y Laguna, prado.

Natrix maura - Común. Fenología.

N. natrix - No examinada en mano ultimamente.

Elaphe scalaris - Orilla canal. El Cabildo, El Pinarillo del Cega. Poco comun.

Coelopeltis mouspessulanus - Las culebras grandes de La Fraila y Medina.

Escapó sin identificar al parecer una culebra de hace años. Si, mal no recuerdo, estas 3 sps. son las únicas citadas por Alvarez Lopez de la meseta N.



Abril.

Pleurodeles walti - Hallado en la Laguna y Valladolid. Es el límite Norte en España Central, significativo.

Molge marmorata - No concuerda con ninguno de los descritos. Enviar a examen y preparar este año.

---

Tarentola mauritanica - Llega hasta Las Hurdes y probablemente a - Salamanca. Investigar si posible. Examinada de Moron, Sevilla. *(uno, enviada del copero, capturada el 15-III-52. Col. Vall.*

Traen Chamaleonetes de Cadiz, campamento milicia, Juan no ha visto en Larache en 7 años, pero es un topo para eso.

Salamandra salamandra - Cogida por Carlos cerca del Escorial.

Averiguar que eran los lagartos (o culebras) que se movian tan rápidamente en la arena de Marbella. No hay escincos en España, pero no sé de otros con esas costumbres.

---

Comparar esta lista con la que dieron de Valladolid.