

Valv. 1953.

7-Ene. Palomas. Muy numerosas. Cobradas 3, Livia y 1 casera. Probablemente los bandos de livia eran invernantes.

Pterocles sp. probablemente alchata (2) (5) en tierras de labor.

Alectoris. muy comunes.

Liebres 5; Conejos.

Picus. Muchísimos.

A. cinerea. 1.

Se recorrieron 12 kms. de río.

9-13'15h. Ladera, páramo y valle.

Zaratan. 9-13'30h. Ladera, páramo y valle.

Pica. (10) tras el arado y raros dispersos.

C. corone. 1 en la ladera.

Frugilegus. Ninguna.

Sturnus. En el pueblo unos (50) en la era y unos (30) (5).

E. cirrus. (5) robledo.

Verderon (5) en la carretera, cardos.

Pardillos. 1 y bando de unos (50).

Verdecillos. Mezclados con F. montiprigilla (solo unos 10), un bando total de (40).

Carduelis. (2) (5) - solitarios y banditos de unos 6 en As con :-

:- Pinzón. Bando (2500) y otros específicos de unos (100) (unos 10) y pequeños de 30 y 40. Innumerables.

:- F. montiprigilla. Con bando de verdecillos (cobrado un ♂ ad. precioso) y en otros varios. Probablemente uno grande, solo de estos pinzones.

Mochuelo. Ladera (2) y 1.

F. tinunculus. 1 en las tierras del valle.

Buteo. 1 en la ladera.

Alondras. Bandos más o menos de (30) y menores, común.

Melanocorypha. más o menos (25)

M. alba. Por tierras y carretera 5-6.

Cogujadas. (3) y sueltas y parejas.

Vanellus. No.

Perdices. (9) en la ladera: (2), 1, (15) - (7) - (2) y páramo.

Palomas domesticas. (3)

Liebres. 1

Colirrojo ochrurus. 1 ♀.