

25-Mayo. Pinar - Puente Duero - Confluencia - Simancas - Valladolid.  
8'37- 17'30 h.

Lista de sps. Ver taxiaados.

C. corone. Pinar, menos común que en invierno creo. Molesta a Milano negro,

Coloeus. Dispersos. Un bando de (40) y otro de unos (20) casi juntos. ¿no hay nidificación?

Pica. Criolus.

St. unicolor. 2 crias casi volanderas caídas de la capilla de Simancas, los llevan chicos. Colonia límite pinar - tierras, los pájaros no gritan, (solo un grito corto y dulce) y pasan fácilmente desapercibidos. Se dejan acercar mucho. Ahora difícil de localizar.

Cyanopica cyanea. Colonia en el límite del pinar - tierras, los pájaros no gritan, (solo un grito corto y dulce) y pasan fácilmente desapercibidos. Se dejan acercar mucho. Ahora difícil de localizar.

Petronia. Adaptada aquí a pinar y nidos de Merops.

L. senator. Canta muchísimo. Imita a pinzón, Lullula, Alcaravan y Coloeus. Al atacar a Pica, hacen "che che cheche" precipitado como un aleteo o el bamboleo de una rama seca.

Coracias. En 3 pt; 2 límite pinar, otro no lejos par Alcotenes y en corro con ellos, Pica, Upupa.

Merops. Casi a todo lo largo del río, colonias de hasta 15. Ver - nota del 27.

Clamator. En todo el día oigo y veo 5. Una ♀ me sale de encima sin gritar, observaba a 2 Pica. Un ♂? grita "cáu - cáu - cáu" en un almendro solitario.

Aún no ha empezado la partida. Estos días se observa ya la dispersión fuera del pinar (agotadas orugas y puesta obligando) señalándose en Sotillo etc. (En Corcos el día 30).

Upupa. Lleva cebo en 1 pt. al menos.

F. subbuteo. Pareja en el pinar cazando insectos, vuelo círculos - concentricos desplazados, a altura dif. Apenas aletean, sólo se les ve llevar la pata a la boca, quizá una vez cada 10 segundos. En ocasiones la presa (no creo hormigas) está un poco más alta y ellos inician un aletazo de Espíritu Santo y la cogen. Era a las 9'30 h. Muy localizados, ya deben tener territorio.

Cernícalos. Alguno. Uno sale del nido, pino alto en el límite.

M. migrans. No en el Duero. En al desembocadura, continuamente, -- llegan hasta Simancas, unos 5 Ems. Se persiguen y ostigan al vuelo.

Buteo. Uno con duda en el pinar.

Nycticorax. Han destrozado el buen sitio. No miro desembocadura - Simancas. Levanto un ad. en un grupo de álamos ribereños, pero no veo el nido.

Gallinula. Familia con 7 pollos tamaño calandria, desfilan ocupando unos 20 ms. en fila india, lugar despejado.

Veo en otras 2 pt. entre Typha latifolia



Valv. 1953.

25-Mayo. Alcaravan. En el pinar, terreno ondulado algo pedregoso.

Ch. dubius. Ver taxiado.

Perdiz. Pareja, a 12 ms. El ♂ canta tres un pimpollo, la ♀ se rasca en un montículo y - tarda en verme. Pinar - pimpollos.



Duero.

Taxiada orilla. Unos 2 - 2'5 kms. con arboleda (chopos, mucho Salix olmos, fresnos) ~~vaya~~ contra el pinar. Biotopos variados, junto a límite pinar y tierras.

Ruiseñor. |||| ... ||| / 1 predominar Salix, casi anula al ruiseñor.

Hypolaïs. |||| ||| →

Cettia. †

Sylv. communis. Solo 1 o 2

Ac. arundinaceus. ||

Mirlo. †

Saxicola torquata. † ..... en los mimbres del soto.

P. major. |||| ||

P. coeruleus. varios.

Serinus. ||

Carduelis. (3) (2) 1 .... cerca del pinar, varios de ellos.

P. montanus. GGGG, , , , = colonias o grupos. Uno en un edificio caseta bomba, con bastantes pares. Resto, arbolado.

Petronia. - (agujeros Merops)

L. senator. †. .... borde del pinar.

Emb. cirrus. †.

E. calandra |||| ..... tierras proximas.

Pica. ||||

Corone. †

Coloeus. ||

Oriolus. ||

Merops. - 1 - 1 - unos 15 pares.

Hirundo. Sobre el rio.

Tortolas. |||| ||||

Clamator. ||

Coracias. † ..... en el pinar.

Valv. 1953.

25-Mayo. Sumando 0'75 a estas cifras resulta un número aproximado de la población de 4 km. de río, con las siguientes sps. además.

Ch. dubius. 3 pares.

Actinyoides. 1 par

A. platyrrhyncha. 1 par.

} De 2 días después.