

Valv. 1953.

Nerops apiaster

2-Jun. Notas de la colonia Puente Duero, laceando entre las 11- 15 h.

la col. contra de unos 10 - 12 nidos ocupados. A 50 ms. hay otros 2, separados, y a unos 150, otro más.

Terraplen arcilloso, bastante denso, erizado de raíces (del pinar que hay encima), que sirven de aposaderos. Los nidos a 30 - 60 cms. del borde. Mido 3, entre 1'10 y 1'55 ms. de profundidad.

En las pasaderas se suele ver la pareja, distantes unos 0'50 - 2 ms. de la boca del nido. Se posan en los intervalos de caza.

Veo 3 veces como uno llega con presa y se le ofrece al compañero.

¿Ceremonia nupcial?

Bajo las pasaderas, egagropilas y muchos excrementos.

El área de caza es el río, enfrente de los nidos, de donde soplabá hoy el viento. Con viento fuerte el pájaro se estabiliza en el aire, -- alas abiertas sin aletear y apenas oscila. De vez en cuando un bandazo y otro posición "aerea" proxima. Aún dominan un "cilindro de viento porta insectos". A veces les perseguían al vuelo. Presencia fallos. Otras partes de espera favoritas, las ramas cimeras de álamos sobre el río.

Victimas. Recojo algunos al pie del nido y "junto a compañeros cogidos en el lazo". Gruesos, dipteros e himenopteros, la única selección es el tamaño. Son todos insectos mediano - grandes y buenos voladores (más arrastrados por el viento y que se remontan más).

(1)	Peso	Ala	Cola	Pico: Nariz - Base	Dif. mandíbulas.	mandíbulas
♂	59 gr.	155'5	118'94	23 - 31	15	Testículos- ovarios I
♂	65'70 gr.	151'5	111-91'5	27'5 - 35'5	0'75	85x4 y 7x4 Blancos
♀	67'70 "	148'5	107-90'5	23'5 - 31	2'5	→ 1 h. con cáscara más algunos pequeñitos (3 - 4) de sustitución.
♀	63'30 "	148	114'5-97'5	22 - 29	1	→ 1 h. con cáscara y 3 yemas para poner más alguna pequeñita de sustitución.

(1) Las rectices largas y pico gran usura. Ha excavado nido.

## Conclusiones.

- 1ª Sigue puesta.
- 2ª En una misma colonia, unos excarban y otros no.
- 3ª Se degasta más pico inferior.