


16-17-Oct.



Sturnus - Caza de hormigas rubias. ♀ gordas, en vuelo nupcial, el 16-X, a las 17-18 h. y el 17-X a las 13-14 h. Las hormigas en vuelo nupcial. ♂ en cópula, a todas las alturas abundan, junto a chopos, álamos y olmos, a < 300 m. del río.

El 17-X, el vuelo es más alto en Sturnus (~ 30 m.) y Coloeus (~ 50 m.)

Radio desde el posadero 150 m. (el 16) o al menos 3-400 (el 17). Vuelo sostenido en círculos a veces pero muy irregular siempre. Planeos y golpes de ala, descenso patas colgantes, en capturas, subida. etc.

Caprimulgus ruficollis - El mismo del día 2, posado uno en cagada de vaca, no se mueve al pasarle perro encima. Parecia aún algo alicorto.

Coloeus - Radio larguísimo, quizá 500-1.000 ms., o caza al pasar. No es sistemática como en Sturnus. Recorrido largo a remo y vela, - captura con aletazos y quiebros a más altura que Sturnus.

Cazan hormigas también M. hypoleuca, (ya escaso) y Phy. collybita (pocas veces) como de costumbre. Pica, no (cola larga, mal evolucionista.) Hace poco, ver estómago de F. subbuteo, con las mismas hormigas.

Son días sin nada de aire y estupendo sol. Las hormigas abundantísimas.