

Valv. 1942

Alceda. Obregón. Sel de la Carrera.

Lista de especies.

C. corax - Alceda, común en el valle, generalmente en grupitos y con querencia por el arbolado de las laderas, en montes poco espesos. Se ha adaptado al eucalipto y suele vigilar desde él.

Obregón - Vi 3 en un prado y por la tarde un bando de 12 volando desde la misma a bosques altos de la otra ladera. Vi parejas. Graznaron - todo el día. Suances. Acantilado. ver notas.

Pica pica - Alceda. En 1942, no tuve noticias de ella. En 1950, me dijeron que se habían instalado en hace 3 años (una pareja) y este año había ya 3 parejas, anidando en eucaliptos, y localizada en sitios despejados.

En Obregón. Vi 5 en el centro del valle, en lugares despejados entre maizales, y huertos y prados. Me dijo ~~en la~~ Cuesta anidan en cantidad, en eucaliptos, y si mal no recuerdo, que habían llegado hacía poco.

En un prado vi 3 cuervos a los que se sumaron 5 maricas. Dos de ellas se marcharon y otros 3 se emparejaron con los cuervos, de 2 en 2, aprovechando cualquier oportunidad, cuando el cuervo picoteaba.

para tirarles de la cola y apartarse a tiempo para evitar el contraataque, dando un salto y vuelo corto. Lo hicieron muchas veces. Parece que en esta ocupación pasan un buen rato cada día. Yo les vi un cuarto de hora. Es de señalar que no he visto hacerlo con C. corone.

Los cuervos solo se molestaban en perseguirlos unos pasos. Vi en Obregón, un nido en la punta de un eucalipto, inaccesible completamente.

Garrulus glandarius - Alceda. Sólo les vi en el monte de Barcena, -- donde matamos 2, en 1942. Unas veces solitarios, sobre todo en bandos pequeños. En tiempo de cerezos les vi ir a ellos, con mirlos. --

Me dicen anidan en robles, donde descubrí un probable nido, a gran altura, ramas de la cuspide en un bosquecillo.

En Sel de la Carrera y Sel del Tajo les vi en la canal, aún en 1950. En 1942, en la canal Puente Escalera.

En 1942 maté uno el 25 de Julio que creo era una cría grande independiente. La utilizamos de reclamo días después y audían bien al oír la chillar.

En general, se localizan en bosques densos, de roble y castaño, laurel, en los canales que desembocan en el valle.

Obregón. Vi un ala. Parece que abundan en los manchones de encina, - en sitios bien arbolados. Desigual repartición que Pica.

Carduelis carduelis - Los que vi me parecieron sobre todo los jóvenes, más grisáceos que los de aquí (Vall.) Cobre en Obregón, 1950. juv.

En Alceda les vi en huertos y fondo del valle, en lugares alternados con prados, huertas etc., bastante comunes, quizá más que en Valladolid. Un nido en castaños, a gran altura, con pollitos, otro en la cuspide de un laurel, a unos 5 ms. Otros, probablemente de ellos, en castaños y laureles, más bajos, hasta unos 2 m. de altura.

Creo que es más común que el verdecillo.

Una familia en ceba el día 17 de Agosto de 1942. Familias en ceba aún a fines de Agosto, en un manzanal en 1950.

Valv.

Alcedo. Obregón.

Entonces vi bandos de unos 30-40, abundantes, en las laderas, prados tirados entre la yerba.

Obregón. Vi grupitos en las huertas y bandos, muy común.

Serinus canarius - En 1950, vi algunos en la Alera entre mimbres - (Salix), en ceba, esperando los pollos posados en hilera en una rama. Vi 2 - 3 familias de estas entre el 20-22 de Agosto. Creo que es menos común que Carduelis y prefiere sitios más salvajes, aunque hay en huertas.

P. major - Algo común en arbolado de las huertas y creo que en roble dal y castañar, en 1942 cobré. Sel de la Carrera.

P. coeruleus - Menos común que P. major.

Aegithalus candatus irby - En 1942, les vi en la ermita y huerta de Pepin al menos y cobré uno, pero creo que con aparentes hombreras rojizas. En grupitos como siempre. Creo que es escaso y difundido. Un bando en el monte de Bárcena el 26 de Agosto de 1951, ver bando.

Musciacpa hypoleuca - 1950. Mientras estuve hubo paso bastante intenso en Alcedo, aunque por la abundancia de arbolado son menos comunes que aquí (Val); todos con librea de invierno.

M. striata - Menos común que el anterior.

Ambos en nogales y huertas más que en castaños o robles.

Phylloscopus sp - Las notas de Alcedo de hace años se refieren más bien a Sylv. borin (al menos la del nido).

En 1950, les vi ya comunes a mi llegada. No pude cobrar ninguno.

En matorral pero muy dispersos. En 1942, cobré uno el 17 de julio.

---

El 26 de Agosto de 1951, vi una asociación numerosa de Phylloscopus, Aegithalus y otras sps. pardas, no determinados, en el monte de Barcena. Desde los altos robles se tiraron a un zarzal del fondo y siguieron por el bosque. Casi en el mismo sitio vi otra en 1942, en la que estaban Sitta, Certhia, etc. De Phylloscopus y P. coeruleus al menos en otra ocasión al menos

---

Turdus merulae - Muy común en los matorrales del valle, asciende poco en la montaña. Cobré jóvenes independientes en 1942, desde el 3 de julio, y otro colicorto en ceba el día 20 de Julio. Sobre todo en zarzales, laureles, saucos etc., y en los maizales.

Alcedo (Santander).

Fringilla coelebs - En Alcedo y Obregón algo común. En 1942, tengo apuntados un huevo el 24 de junio.

Acanthis cannabina - En obregón vi bastantes y cobré un ♂ de un pareja el 22-VIII-1951, tengo anotados menos numerosos que Carduelis en Alcedo, pero no recuerdo el verles.

Pyrrhula pyrrhula - Pato loro? No sé si llaman así al

Valv.

Alceda. Obregón.

En la Alera del Pas, vi una familia en ceba, con sólo 2 - 3 pollos el día 31 de julio de 1942. Se posaban los juv. que ya volaban - bastante, en ramitas destacadas de Alnus, Rubussy Salix y los padres les traían comida abundante, los juv. muy confiados, los seguímos al cazarles, de mato en mato y de árbol en árbol, en un distrito de unos 200 ms. de Ø

Sólo los vistos era familia. Debe ser raro allí.

P. domesticus - En todos los sitios, casas y pueblos. Vi a los pinzones con ellos en un canal. Es menos numeroso que en Valladolid.

Emb. cirrus - En Sel de la Carrera, vi muchos, en parejas y grupitos, donde alternan prados, huerta y grupos de roble y castaños, terreno en general despejado. Cobramos uno. Es probable que hubiera allí también Emb. cia.

Anthus campestris - Cobramos uno en Alceda y otro en Suances. En prados, cerca de huertas, vi pocos.

---

En 1942 vi con frecuencia en el monte entre los brezos, probables -- ¿Lullula? que se movían sobre todos los caminos con Saxicola torquata era la ave más característica.

Motacilla alba - Alceda. Algo común, carreteras, posado y montones de abono.

Alceda.

Turdus ericetorum - Un nido vacío el 20 de junio, tenía 4 huevos fríos el 2 de julio, uno que cogí (ooteca, nº 16) muy fresco. Puso por los tanto en estos 10 días. El 20 ya estaba el nido terminado. (1942).

Era voluminoso, muy visible a unos 2 ms. de altura en un liso arbolillo (Salix) en medio de uno mimbrea. Exteriormente musgo, interiormente raicillas. Cerca del río. Huevo 19 x 22.

Pocas veces los he visto allí. En 1942 no recuerdo más de 2 ó 3 veces y en el año 1950 ni una. Debe escasear mucho. Acostumbran a enjaularles, he visto bastantes vivos.

Sylvia atricapilla - En 1942 maté un ♂ el 6 de julio de una familia con pollos grandes, estos estaban en el suelo, entre yerbas y junto a unos Olmos, en Alceda, junto al Pas. En 1950, no vi ni una.

Sylv. borin - En 1942, les confundía con Phylloscopus, sin embargo, un huevo colectado es de ella.

El nido, con 4 huevos frescos, el día 2 de julio estaba a una altura de medio metro (en el libro tengo 200 cms!)

En las ramas de un Salix mimbrea y protegido por una zarza, cerca del río, en la Alera. Siguieron incubando después de robar un huevo (nº 18 ooteca).

¿Prunella modularis? - Un huevo cogido el 25 de junio fué clasificado por Bernis de esta sp., con la que concuerda la descripción grosera de entonces.

El nido en zarzal y arbusto, muro a 75 cms. del terreno, en un matito muy pequeño tenía 2 huevos, fué retirado uno y siguieron empollando el otro, sin poner más hasta que le retiré también. El nido con musgo y raíces (Descripción nidos algo mejor en ooteca).

Valv.

Alceda . Obregón.

Erithacus rubecula - El 1942, les vi varias veces en los helechos del monte, bajo el robledal, no se fecha y caeé uno en una huerta el 25 de agosto. Anidan allí, en el suelo. Vi un nido entre la hierba abandonado.

En 1950, les vi comunes y solitarios, no familias, por los matorrales de las laderas sobre todo. Zarzas y espinos.

Saxicola rubetra - En el año 1950, maté el 2 de Agosto una, en un cable, prados y maizales. Era juv. bien emplumado, de paso claro.

Saxicola torquata - Chachapines. El año 1942 vi bastantes en el brezal creo que todos de esta sp. aunque hay la posibilidad de que hubiera -- rubetras. Vi machos inconfundibles.

Dos nidos, uno con 4 huevos y otro creo que con los mismos - los días 3 y 4 de julio, ambos al pie de brezos y entre el musgo, en un pequeño hueco y muy bien disimulados.

Entre los brezos era común, ladera arriba de los bosques y donde las ¿Lullulas?

En 1951, cobré un ♂ en Obregón el día 22 de Agosto y vi bastantes en Alceda, en el valle, cobrando 2 juv. en un maizal. Es común también en el valle, aunque menos que en el brezal.

Cinclus cinclus - En el año 1942 les vi en Barcena en varios puntos, el 17 de Agosto algunas parejas o grupos, pero muy poco para lo mucho que corrí el río. En 1950, vi uno el 26 que pasaba sobre el río volando haciendo Trait trait trait troit débil y en 2 notas o quizá una sola. (notación "in situ")

Aletea poco y pesadamente. Es de aspecto gordo y pesadote, con alas muy redondeadas. Anda entre las peñas del río, únicamente y en algún regatillo más barroso rara vez.

Troglodytes troglodytes - Común en ambos años, en zarzas y tapias.

Lanius collurio - En Alceda no he visto ni uno. En Obregón vi bastantes. Una familia en ceba el día 22, con 3 jóvenes que volaban bien - ya y se dispersaban. Andaban entre breñas de avellanos y maizales y posados en tierras muy abiertas, paraje de suaves lomas. Un padre - cogió un Atridido verde de gran tamaño, Cobré 2 juv. También el ví en Suances el día 28, entre matorrales en hondonadas prados. Quizá se limite a la zona baja costera.

Certhia brachydactyla - En Alceda vistos y cobrados pero no clasificados, en robles y parques. Poco común.

Sitta europaeus - Sólo una vez en Alceda en el monte de Barcena el 15 de Agosto de 1942, en los robles y asociaciones claras. No les pude descubrir allí en 1950. Debe escasear bastante.

Chelidón urbica - Muy común en los caserios, más que en Valladolid. En 1951 había un bando de unos 200 en los cables el 3 de Septiembre, en día de lluvia y cobré una, con ellas solo unas 12 Hirundo. Ese día aún no había partido, y tampoco creo lo hicieran antes de - mi partida. En Obregón algunos.

Hirundo rustica - Menos común que Chelidón. En Obregón más común. Vi bastantes. Un nido en ceba aquí el día 22 de Agosto. Respecto a su partida, como Chelidon.

Valv.

Alceda. Obregón.

A. apus - Algo común, quizá menos que en Valladolid. En 1942, me trajeron 2 crias nuevas que aún no volaban bien aunque perfectamente emplumadas los días 25 y 28 de julio. Quizá ineptos para el vuelo. Ruinas del Balneario, Iglesia.

En 1951, ya habían partido cuando llegué, pero aún vi 2 sobre el valle en Obregón el día 22 de Agosto, de paso claro.

Caprimulgus sp - Sólo vi en Obregón uno o dos junto a la estación el día 22 de Agosto, posándose en tierra, la fecha es de paso claro ya.

Alcedo athis - Común en Alceda, donde vi varios nidos vacíos en 1942. En cortados arcillosos de la margen de Pas. No remonté los arroyos de los Canales. El 26 de junio cobramos un ad. bien emplumado.

El nido mirado el 9 de Agosto tenía 6 pollos grandes en cañones y -- pluma y un huevo huero el día 9 de agosto, fecha muy tardía, los que dejé en el nido excavado fueron abandonados, los otros los crié y ya estaban completamente emplumados el día 12 y volando algo el día 14. Me dió la impresión de ser común allí.

Picus viridis - Alceda, común y muy localizado en los mismos sitios que Garrulus. Quizá abunde menos que en Valladolid sin embargo.

Merops? - Alguien me describió en 1950 unos pájaros que anidaron en un corte y podrían haber sido abejarrucos. A investigar cuidadosamente, ya que es muy improbable.

Tyto alba - En 1942 me trajeron un pollo con mucho plumón y cañones, ya grande y muy agil, el 28 de junio. En 1950, vi una familia con jóvenes que salían ya de caza en el tejado del matadero y disparé -- sobre ellos. Hay otro nido en la casa del médico, bajo el alero y -- seguramente otro en una cabaña del monte. Es común en general y bien conocida. En el matadero se oía su chehg chehg como un estertor, en cuanto empezaba a oscurecer.

Obregón. Vi restos de uno junto a la Iglesia y me dijeron que se había matado una joven independiente el día 15 de Agosto.

Strix aluco - Les oí en el monte de Alceda en el verano del 42 y vi una pareja y un solitario en el robledal, pero no tengo la absoluta seguridad de ser Strix porque no conocía a Asio. Me parecieron sin orejas.

Me dijeron de una pareja que anidaba en el muro hueco de una cabaña. Se distribuyen por los bosquetes de la falda de la montaña.

---

Me dijeron que no era común Athene en Obregón y según papá en Alceda, pero no le he oído.

Buteo buteo - Alceda, la rapaz más común en las laderas, junto a bosquetes. La Peña del Águila, montes de Bárcena, Alceda, Onteneda y -- S. Vicente. En el año 1942 me trajeron 2, una cria volandera y creo que aún en ceba el día 30 de Julio. No bien seguro. Creo que ambas Fasciatus.

Pernis apivorus - En el año 1950 me trajeron uno, cogido enfermo, hígado ablandado y con manchas blanquecinas, en S. Vicente el día 7 de Septiembre ¿en claro paso.? Quizá fueran Pernis estos que vi antes. Este era como fasciatus y bastante claro.

Valv.

Alceda. Obregón

Falco - Vi en la alera del Pas 2 ó 3 veces lo que me parecían F. subbuteo, posados entre los Salix, en 1950.

En el año 1942, vi también 2 veces, pero quizá fueran acesalón (o A. nisus?) aunque no es probable.

Falco tinunculus - Alceda, no vistos. En Obregón anidan en la mina, de donde estropearon un nido en el año 1950.

Accipiter nisus - Uno en un eucaliptal del monte de Bárcena, el 2 de Septiembre de 1950, atacando a Erithacus y merodeando.

Accipiter gentilis - En 1942, atacó ante mí a un pollo tomatero uno (pecho bandeado, vuelo torpe) el día 23 de Julio. Indudablemente - anidan y son los que roban las gallinas que atribuyen a Buteo.

Hieraëtus pennatus - El 26 de Agosto de 1951, uno en el monte de Bárcena, atacada por Corvus.

Columba palumba - En 1942, vi alguna en maizales y soto del río, -- chopos y roble, solo una vez, como nidificante debe ser escasa, 31 - de julio y 8 de agosto.

En 1950, parejas y un bando de unos 12 en la ladera del Costal, muy localizadas. Han anidado allí.

Streptopelia - En Obregón me dijeron se mató alguna desde mediados de agosto.

Charadrius dubius - Vistos varias veces en el Pas en 1942.

Actynioides hypoleucus - En 1942, anoté el 17 de Agosto "muchos zarapitos", probable llegada de estos, en el 1950, vi 5 el día 26 de Agosto y alguno sólo después, sitios en arena entre piedras.