

5
Valv. 1951.

4-Marzo. La Nava (Palencia)

2ª Visita. Día claro y sin viento, cielo despejado y sol espléndido. Hacia las 10 h. of., se levantó un ligero viento. Recorrido. Entrada por Villamartín, desde la Colada al Puente del Diablo y parte de la orilla, aproximadamente de 9 a 12. Después por la carretera a Mazariegos y entrada a la laguna por el camino de herradura, hasta cerca del P. del Diablo; toda la parte superior de la laguna, al N.W. del puente y regatos: Prado de las Pezuelas. Horas. 9 - 16, oficiales.

La laguna ha cambiado mucho desde la primera visita. Ahora está casi totalmente inundada, los regatos adyacentes rebosan. Con las lluvias el barro de la charca aunque sigue siendo consistente se ha vuelto untuoso y se pega a las botas, pero es demasiado denso para que se marquen las huellas de pájaros. En las orillas se acumulan restos de phragmites y excrementos de oveja formando manchones pardos, los phragmites siguen allí, secos y ralos. En ningún sitio apuntan todavía retoños de este año.

En la mayor parte de La Nava el terreno pelado está sembrado muy esparcidamente de carrizos que solo se arraciman en corros de la parte W. y en una gran extensión cerca de Guñijota, aunque no tan denso.

Al llegar estaba la laguna helada completamente (ver fotos) aunque a media día fundió, los regatos estaban también helados excepto - alguno con agua corriente.

Lista de especies.

En la misma Nava, encontramos.

C. cinonia - Un solo individuo, en el Puente del Diablo.

V. vanellus - Dispersos aquí y allá, por la laguna e inmediaciones, encontramos algunos, generalmente se reunían en parejas, tríos, 4 ó 5. Algún bando más numeroso volaba sobre la Nava, en grupos apretados.

Preferían las partes herbosas y con carrizos, aunque se diseminaban por toda la charca.

Migración -

Durante toda la estancia estuve viendo pasar en dirección N E. a S W. de Villaumbrales a Villamartín, grupos y bandos de una docena a 30 ó 40. Creo que en paso activo, aunque por el viaje no veo a donde pudieran dirigirse. Si a alguna hora fué más acusado, el paso, fue hacia las 1330 a 14 h. No vi ningún bando en dirección contraria.

Creo que muchas de estas especies se dirigen a los campos a comer y pernoctan allí, las heladas aprisionaran muchas estos días, aunque se liberten pronto.

Calcúlo que en total vería pasar a unas 400 a 600 aves frías.

En la laguna y a pesar de no abundar eran las aves más ostensibles y comunes, exceptuados Charadrius y Paseves

Charadrius sps. - A lo largo de la orilla encontré muchos. Preferían las partes más desnudas y arcillosas y correteaban sobre el hielo, con querencia a los lugares en que había Vanellus. En general les ví en bandos de hasta veintitantos, mezclados con ptros - Limicolas y Anthus.

Creo que eran más comunes en la parte central de la laguna, al menos no encontré apenas en el extremo W.

Valv. 1951.

4-Marzo. La Nava.

Con los gemelos pude apreciar que la mayoría eran Ch. dubius. En ninguno noté el collar interrumpido pero creo que había algunos de mayor tamaño y colorido más acusado, probables Ch. hiaticula, - casi con seguridad una pareja.

En conjunto los Charadrius eran muy comunes, en clarísimo paso de retorno ya que allí no crían. Estos días no se ven por Valladolid (Pisuerga), lo que puede indicar que el paso máximo se realiza a saltos de charca en charca y solo en las postrimerías se dispersan por los ríos. No puedo calcular el número aproximado, pero en unos 2 kms. de borde levanté unos 50 al menos.

Acompañando a Charadrius vi un par de andarios parduscos, más oscuros, quizá Calidris, y por lo menos un Actynioides hypoleucus, que debieran haber sido más comunes en fechas atrás. Casi todos los andarios se levantaban tan largos que no pude observarles bien, pero creo que habría muchas más especies. (T. ochopus, glareola, muy probables).

Todas las limícolas (exceptuando Vanellus) se posaban en corros y - con ellos los Anthus y E. schoeniclus.

Pluvialis apricarius - Un bando de 36 se levantó de la laguna dirigiéndose a las tierras. Junto con las avefrías vi otro probable, y alguno más por la charca.

No pudimos cobrar ningún ejemplar. Creo que vi un par de Numenius de pequeño tamaño, muy largos, lo mismo pudieron ser Phylomachus.

Burhinus oenedicnemus - Uno solo, el 1º del año, junto a Vanellus, Pluvialis y Charadrius.

Anas crecca - Solo vi dos emparejadas en un regato de circunvalación; al perseguirles se tiraron a una charca abundante en carrizos. La pareja venía siendo empujada por un rebaño que seguía el arroyo, desde casi un Km. antes.

Anser fabalis - A poco de llegar pasó un bando de 12 gritando y volando bajo. Debieron arrancar del prado de las Perezuelas y se dirigieron a Villaumbrales. Otro bando de Anser de más de 30 individuos pasó a gran altura y formado en V en la misma dirección.

El bando 1º era sin duda de esta especie por el colorido oscuro que destacaba mucho. Al volar se notan negros casi las alas y muy oscura la cabeza. El pico parecía rojizo amoratado en la base, probablemente por influencia del gris.


Me han dicho los pastores que durante todo el invierno no han habido pocos gansos y patos (!Y el invierno ha sido lluvioso!).

Emb. schoeniclus - Vi un macho, al menos. Había grupitos entre los carrizos.

Anthus praetensis - Me parecieron de esta especie casi todos los que se veían por la laguna. En las tierras cercanas había algún A. spinoletta. Un individuo cobrado. 2º, 3º, 4º y 5º los más grandes, patas pardo claro. Pico Pico fino, dedo algo más largo que la uña, poco encorvada. Long. T. Ala. Cola. Tarso Pico

Me parece praetensis, quizá algo mayor.

En los alrededores de la laguna vi las siguientes especies.



Valv. 1951

4-Marzo. La Nava.

En los alrededores de la laguna vi las siguientes especies.

Phoenicurus ochrurus - Un ♂, en un árbol, en Mazariegos. Seguramente hay ya paso. Aquello es muy llano y desnudo.

Alauda arvensis - Grupitos pequeños y alguna pareja. No había bandos en las tierras, ya han partido casi todos.

Galerida cristata - Común por doquier. Alguna me pareció de colorido diferente. Carretera y pueblos.

M. alba - Pocas y cerca de los pueblos.

Turdus - No hay allí, aunque viesen el camino T. merulae.

Parus major - Solo uno en la carretera.

Corvus corone - Revoloteaba y planeaba una pareja sobre la laguna. Vimos en los alrededores, pero escasea. Probablemente había Coloeus en Villamartín.

Sturnus unicolor - Cerca de Mazariegos levantamos bandos pequeños cerca de la carretera. No veríamos más de 50.

P. pica - Emparejados y no muy comunes. Algún nido ya parecía arreglado en los chopos lombardos de la orilla de la carretera.

M. milvus - Solo vi una pareja volando en círculo en Mazariegos. Esto me confirma en la partida de migrantes (Ver últimos de Febrero en el Habanero). Seguramente quedan únicamente los sedentarios o estivales.

Falco naumanni - En la iglesia de Mazariegos una pareja. Hice foto del tejado donde se posaban. Había muchas palomas en ella.

Todos estos pueblos, Mazariegos y Villamartín, cuentan con muchos palomares, los palomos son casi todos grises, tirando a típicas. Hay alguna blanca. Me parece un buen sitio para probar la influencia de C. livia invernante.