


Valv. 1952.

27-Julio. La Nava.

Grijota - Villamartín de 10 a 14 h. Dando vueltas.
Villamartín - Grijota de 16 h. al oscurecer. Dando vueltas.



Scirpus pub.
Terreno cubierto casi completamente de Carex, en algunos sitios -
alto hasta la cintura. Seca excepto en algunos canales y unos --
charquitos de hace 15 días, (desagüe de riego del arroyo de Retor
tillo. Hay otra planta, blan
co morado, sepalos pe
tales, 9 estambres en 3 grupos y 6 --
ovarios. 3 P. 35, arroyos -
húmedos, ahora en plena flora
ción. Phragmites? rarísimos,
(lo parecen en pequeño).
Gramíneas con Carex en ceped
denso. *Scirpus pub.*

Passer domesticus - Cerca de unas obras.

Alauda arvensis - Canta bastante. Es probablemente el alaudido --
más común.

Melanocorypha - Veo 2 ó 3

Calandrella - Varios, cerca del final de la laguna.

Galerida malabarica - Muy gris, gris bajo el ala. Moño adelanta
do. Bien una.

Motacilla alba - Familia en un desagüe.

Motacilla flava - 2 familias en un desagüe. Una pareja en el cen-
tro, los juv. cara muy rayada y pecho sucio. Quizá hubiera M. ci-
nerea.

Acrocephalus arundinaceus - Uno bien visto

Todos en regatos centra-
les, pero les veo muy mal
en general, volando. Carex
altos.

A. schoenoboenus? - Vistos unos 10

Phy. trochilus - Unos 5, uno bien visto.

Oe. oenanthe. - Familia cerca de pueblo.

Hirundo - 2 ó 3.

Apus - ~6. En Valladolid aún no se han ido.

Falco tinnunculus - En 2 puntos en yerba baja bandos ~ 10 y bastan-
tes dispersos. Se paran en terreno malísimo.

F. subbuteo - Veo 2 veces ♀♀, quizá la misma.

M. migrans - Tres juntos, chillan.

Circus aeruginosus - Plumaje normal, Uno revolotea continuamente,
al menos hay 2.

Ciconia ciconia - En bandos. Cuento 84 - 30 - 60 - 82. Calculo
que habrá unos 150, porque habré contado 2 veces muchos. Me dicen
llegaron hace 4 días y partirán antes de primeros de Agosto. Hay -
muchas juv. Alimento, acarididos (numerosísimos) y probablemente rani-
llas y sapos. Parece dormirían en grandes grupos en los ribazos.

Valv. 1952.

27-Julio. La Nava.

- Numenius arquatus - Grupo de 3. En la pequeñísima parte encharcada bastante rala.
Limosa limosa - (6) Los ochopus, vuelan juntos, pero se separan mas Numenius.
Tringa totanus - (4)
Tringa ochopus - (2) ó 3
Actynioides - Les oigo (habrá 6 al menos) al anochecer en la obra.
C. coturnix - Canta por doquier. Abundantísima. Hace días nido con huevos.
Otis tarda - Una ♀.

Rana sculenta. Bufo calamita. Pelobates cultripes - Todos los Calamita (menos uno) y todos los Pelobates, pequeños, de tamaño así.
A las 10'30 h. solo había en el fondo de regatillos húmedos, a la tarde, al llover, les encuentro en -- cantidades enormes junto a la zanja y por doquier. Allí el único Calamita grande. Ranas aún más pequeñas, abundantísimas, mañana en los regatos. Grandes en el Arroyón.



Sapos muertos en lo quemado y caminos en gran cantidad, los incendios deben hacer hecatombes.

Valv. 1952.

27-28-Jul. La Nava.

Pleurodales o Molge - Les conocian de algunos charcos.

Bufo calamita - Abundantísimos, hacia las 10 á 11 h., todos los individuos de este tamaño ~~aproximado~~, en las partes húmedas (tierra negra agrietada o barrosa) de los regatos centrales que sólo tenían agua en un par de puntos, entre matos de la Planta X -- (ver nota). Junto a ellos gran cantidad de ranas del mismo tamaño. (R. sculentata). Ambos - igual de comunes.

Sólo cogí un ad. grande (como los de Orihuela) en los taludes de la excavación. El único sapo ad. que ví.

Todos andaban, no saltaban. Algunos cerca de la excavación.



Pelobates cultripes - Por la mañana no vi ninguno, pero al atardecer, después de 2 horas de lluvia había miles cerca de la excavación del desagüe y en el prado próximo, (no se si en el resto). Tamaño como la anterior sp. No ví ad., todos saltaban, no andaban. Colorido diferente, en uno más limpio, en otros más rojizo o amoratado por transparencia. Vi bastantes -- muertos, pero no lo achaco a las cigüeñas.

Ranas - Enormes en el canal de desagüe. No miré bien, pero no ví ninguna clase de Renacuajos.