

Valv. 1952.

12-21-Jul. Excursión a Gallocanta - Albarracín - Peralejos.

Entre el valle del Jiloca y Albarracín, pasando las laderas gypsofilas, hay una xeroacantofilia (seco agudo) de la que no vimos nada.

Es matorral bajo, punzante, antes hay como un piso calizo de *Quercetum*.

En las partes más altas y no lejos de Gallocanta, una planta ~~vastre~~ ra muy verde que no encontramos en el húmedo y silíceo Albarracín ni Tajo y que forma en Guadarrama casi un piso.

No recuerdo nombre (es Gayuba): *Artoctastilos uva-ursii*

Matorral de *Buxus sempervirens* (hay 2 sp.), solo una salvaje, la otra de jardín) donde cobramos *Psammodromus*, en terrenos silíceos?

Albarracín.

Albarracín. Pinetum sylvestris sobre prado de *Nardus stricta*, *Berberis* suelto. Formas ecológicas de cumbre que *P. sylvestris*, desgarrados en la cima de Gamodorro. Matorral que apenas levanta una cuarta, de *Quercus pyrenaica* = toza en humbrías húmedas parecido al de Alceda, pero no helechos.

En las partes bajas de Orihuela, sabinas almohadilladas en rosetón.

Crataegus disperso y excasísimos endrinos en toda la zona del Tajo. Hay *Quercus pyrenaica* arboreo en algunos valles y se asocia con *P. sylvestris*.

Escasos *Pinus laricio* (negral) en Albarracín. En las solanas retama, ahora en flor (*Phy. collybita*).

Turberas de *Sphagnum*, con turba calidas. En ellos plantas carrizosas.

En gramíneas de prado, *Nardus*, *Poa*, *Deschampsia*, etc. Abunda la fresa silvestre en el fondo del valle, ahora en fruto.

En Pedralejos y Checa.

Zona alta de páramo con *Berberis*, *Crataegus* raro una (Del grupo del caucho). Una gramínea como plumas retorcidas común a corros, enebro en pilón de azúcar y *J. phoenicea*, sábina almohadillada rastrera, ambos comunes.

Parece una etapa subserial del Pinetum laricii que queda de testigo escaso. Es altura límite entre *P. laricio* y *sylvestris* y hay ambos. Creo que es un xeroacanthofilia claro. (*Genista* o *Ulex*).

Abunda mucho una mata espinosa, un brezo gris. (*Sylv. cantillans*, *Sylv. communis*, *Anthus campestris*, *Coturnix*, *Alauda*, *F. tinunculus*, etc.)

Tajos del Tajo.

Pinetum laricii y *P. sylvestris*, en laderas rincones humbríos con *Coryllus avellano* y algunos tilos a la sombra de las peñas. En solanas *Crataegus* y *Rubus* (Conejos. *Sylv. communis*). hay arnica, té(?). En la orilla del Tajo *Salix*.

En Gallocanta. Salino.

Densa vegetación de algas; quizá haya *Utricularias*, las algas de bastantes sps.

Zona de barro que perfora un gusano comedor.

Zona de salicornia herbacea. Hay otra planta muy común y parecidísima que también tiene ahora un color rojo.

Después zona de cepéd de una gramínea particular y *juncigraminetum*.

No. 496

Picazaza = Pica (Picaraza)

Fraxa = auidan zocas en Odon (Pyrrocorax?)

Cardelina maja = jilquero " verderol " gorriato.

Ruisetor = ? " Pajaro nido = nido " Tordo = sturnus?? " Charla = F. cal.

Caracilla = A. arundinaceus.

Andarrios } = Motacilla
neveros }

Gollaría = Calandria

Pajarillo mediano = alondra

P. monudo = Galerida

trastica = Calandrella

burlo pastor = lullula.

Zurrubalca = oenanthe

plandrina = } Helidon
 } Hirundo.

baubo = abubilla.

oucejo = vercepo = alpus.

uco = Cuculus

Mochuelo .. kchuza , buho kchicilla = asio.

Aguila blanca real.

Aguila negra con la frente blanca.

tuna . + nuhas = Pt. orientalis

ganga + pocas = Pt. alchata

Fino nastro fino + = sion

amutande +

gulla . = paro isira ~ S. Joré. (atu tierra gulla, aunque se con una pat)

gallina ciega = Caprimulgus (sola).

Uno prese donne detalles de Panurus biainicus, pero no es uide claro y la localidad es muy mala por falta de caninos. Describen uido redondo entre caninos y loblan bigote.

Cerceta (2 clases) Not. = crua.

Carraquillas. Not. = querquedula.

Cucharaues. (2 clases, pardo y pintado). Not. = spatula.

Pato fino - ~~patito~~ (viejo mucho) = platyrhynchus.

Chilladero } de alas blancas = penelope
 } chico ~ ?

Cabrerudete negro (con moño) = Ay. fuligula

Cabrerudete de calera roja = Ay. ferina.

Cuellobarzo -- acuta

Capuzador } grandes = Podiceps sp
 } pequeños = pod. P. ruficollis.

Gansos. = pequeños más oscuro = Anser

Oca = grande más claro. A

Cisne = Mataran ~~dos~~ inicos que se ha visto hace un año.

Fodra = Fulica.

Partenera +. = Himantopus

Chorlitejo de laguna = { Ch. apurcanis

 } L. minor etc.

Chorlito aliaquero = Alcaravan.

Quincetas = anas " no crían.

Pájaro perdiz: chodue.

Recachadera = capochodine. distinguen clases.

Lasarrañ. Cria huevos más grandes que Himantopus. (Poult. Numenius.)

Gaviota = larus ridibundus.

Oucejo marineru = chlidonias (solo de pau diou).

Sangartera = lagartija

ardacho = lagarto.

sapo maldito = B. vulgaris y otros.

Escorpion... " Si el escorpion viera

la vibora oyea gente no hu-

biera "

Paniguera. = comodreja.

Topo = Arv. talpides.

Gato montés "

Guinea = garruña.

ratón " Hare dentro al arapan. Lepo de

puirais  que hacen allí.

tajuco. = tejou

En lo que Comodoro vi un cenante^{sp.} ♂ ad. reclamando, que confundí con Monticola! por lo grande que parecía.

Neophron solio' uno de la peña

Hay bastantes lagartijas (2 Mus.) con muchos anillos blancos y un paravento rojo diminuto igual que el que se ve en Jolos.

Entre de los requeredos, donde clare el bosque, abundan Serinus, Eub. vilus y Acanthis citrinella.

Abunda el Buzo real (Visto uno vivo en Orihueche, buen plumaje, parece ♂ por lo pequeño, que consisten de un pelo mientras le atascaban grasas, buen anillo puros y vivos.). conocen el cáralo. Me informan de Tichodroma, visto una vez en un nido de una casa en pueblo próximo, pero hay fácil confusión con Ph. obscurus, aunque el grito está bien descrito. Lo mismo en los Tapis de Peralejo, donde me dicen se han fijado en el un jar de veras. La gente no sabe nada de pájaros pequeños.

Bufo vulgaris 7. en las inmediaciones de la fuente, entre ellos uno pequeño y flaco. En Orihueche, uno bajo; ¿helechos? en pleno robledal de faginas.

B. calamita 4.

Alytes ♀ ya puesta? - ♂ con huevos.

Llamam cucharitas a los renacuajis. laguna del curso de la laguna.

Hyla arborea. trae una caja Bernis de la charca, todos pequeños, sin banda oscura lateral completa. Subespecie típica, si dos juvs. de ella tienen algo negro.

Vipera. Una muerta se ve en la carretera. Parece abundar extraordinariamente. Una mató a una niña al pisarla en la casa, muerta durante traza curso.

OJO - NO COPIADO.

Museo de Madrid