

Valv. 1952.


14-Julio. Orihuela del Tremendal.

Llegamos día 14 por la tarde y estamos el 15 por la mañana. El 15 por la tarde vamos a la Casa Forestal, el 16 desde esta al Caimodorro (1900 y pico mts.) y desde el 17 por la mañana a casa Forestal.

Desde el coche se vio.

Cuculus - 1

Oe. hispanica. - 1 ♂



15-Julio. Orihuela - Casa Forestal.

Taxiado (Bernis).

Desde el empalme de la carretera al Kilometro 72 de la de Orihuela a Albarracín. 7'30 - 10'30 h. Unos 4'5 kms.

Emb. cia - 2 pt.

Ph. boenlli - 9 pt. bando disperso. Total unos 15.

Parus ater - 19 pt En 2 puntos muy juv. probablemente ceba.

Corvus corone - 2 pt

Garrulus - 1 pt

Pinzón - 22 pt

Parus major - 1 pt

Sitta - 4 pt

Dryobates - 3 pt

Parus cristatus - 4 pt

R. regulus - 3 pt (canta en 2 pt. y ceba en uno)

C. palumbus - 2 pt (un nido).

R. ignicapillus - 2 pt

Erithacus - 3 pt

Lullula - 2 en claros. pt

Certhia - 3 pt

T. viscivorus - 5 pt (un pt. juv. colicortos)

Serinus - 1 pt

Cuculus - 1 pt

Emb. cirrus - 1 pt

Troglodites - 1 pt (vaguada húmeda).

Fuera taxiado. Un Mirlo y Motacilla cinerea en un arroyo.

Valv. 1952.

14-Julio. Orihuela del Tremedal.

Que Nombres vulgares. 3 cabreros.

Cuervo = (C. corone)

burraca

ranglajo

Verderol

Colorin

Cardelina = Carduelis.

Escribe cartas = Emberiza

Espiñador = Loxia. Anida con nieve en peano invierno; En otoño? vienen al pueblo a comer el yeso de las paredes y los chiquillos les matan a tirador. Hay más en Abril-Mayo.

Gorrión.

Chillandra

Graja = pico colorado.

Nevero

Zurrigalva = Oenanthe

Zarcero

Zarcero blanco

Colirroja = P. ochrurus

Picarrilla = Sitta - Certhia.

Piñonero = P. ater?

Ruiseñor = Troglodytes

Chocolatera = Luscinia.

Tordeja negra = mirlo.

T. blanca = T. viscivorus.

Tordo (de paso)

Oncejo = Apus

Martina blanca = M. alba

M. amarilla = M. cinerea.

Totovia = Lullula (anuncia buen tiempo. Peralejos, nido 4 h. el día 16.

Busca pastor = Galerida.

Cuco.

Aguila sapera = Buteo

Aguila lebrera - puis, tripa blanca, quizá Circaetus, quizá pennatus.

A. real - No anida.

Milano real - Anida común.

Alcotán = cernícalo (picos y riscos anida).

Garrapiña = F. subbuteo?

Bu = Buho. (picos y riscos)

Calvo = Cárabo. Hay prob. también Asio communis y les confunden.

Lechuza = Confunden con Otus? pino.

Buitre - Sólo hay Gyps.

Chorlito = Alcaravan

Torcazo, tórtola, paloma zurita (que anida en riscos). Tórtola, no anida.

Chocha = perdiz. Buena descripción. Dicen anida, 3 - 4 h. gordos, en el suelo, vaguados húmedas. Han cogido un par de nidos, uno en Gargantave-

llanos. El médico contradice a cabreros. Estos saben que agujerea -- suelos húmedos y describen bien vuelo y ave.

No hay pajareros allí.

Valv. 1952.

14-Julio. Orihuela del Tremedal.

Nombres vulgares. 3 cabreros.

Tajugo - Hay alguno.

Gilina = Garduña. Bastantes, los pagan a 1.500 - 2.000 pts.

Gato montes - "turón". Paniguesa = comadreja. Lirones.

No abunda mucho el conejo, tras 2 años malos. Antes si había:

Liebre, poca. Caza mayor extinguida hace tiempo, aún hablan de -- raros Jabalies perdidos en zonas proximas. Hay bastantes ratones (Vemos uno) y topos (Pytimis) en el huerto. Abunda la ardilla, -- cazan con perros de muestra.

La nieve queda meses en el campo. Quedan incommunicados a veces.

Langartera = Chalcides.

Ardacho = Lagarto

Ligaterne = Lagartija.

Sapo maldito = bufónidos.

Abunda mucho la víbora en toda la zona, (una muerta encuentro) y dicen salen más antes de llover, tiempo fresco.

15-Julio. Orihuela del Tremedal. Casa Forestal.

El terreno del taxiado es pinar de sylvestris sobre prado de diente.

Regulus - en pino joven y ¿prieto? ¿claro? terreno muy húmedo y silíceo (Hay ~~tu~~beras).

Pueblo

Gorrion y Petronia (común), Pueblo.

Vencejos - (comunes)

Alondras - (prados)

Pica y Mirlo - En las huertas, entre casas.

Yo recorro.

- (1). Pinar sylvestris, con querqus pyreanica, (un Bufo vulgaris)
 - (2). Prados ladera inferior con huertas (~~muros de piedras~~ sin árboles), rasas sabinas achaparradas y alguna mancha de Quercus pirenaica.
 - (2) ~~1~~ - Pardillos - 6, bien 2 ♂.
 - (2) - Saxicola torquata - 2 parejas. Ceban juv. nido entre mato de Quercus.
 - (2) - M. alba - Juv. pecho manchado. 2 en roquedo.
 - (2) - Oe. oenanthe - 2-3 ♂, tapias de huertas.
 - (1) - Ph. bonelli - El más común en el pinar X m. no baja al suelo, sólo en pinos. ~~Cobrado~~ ad. en muda (Mus).
 - (1) - P. ater - Muy común, apenas canta. Cobrado ad. mudando cabeza casi pelada y juv.
 - (1) - Pinzón - Muy común X m.
 - (1-2). Emb. cia - Juv. que vuelan independiente???. Creo que no. Hay pareja con nido, en Quercus. ~~Cobrado~~ ad. abdomen -- pelado (Mus), tres parejas en límite pinar-quercus pedriza. Todas probables con juv. o huevos.
 - (1-2). Sylv. communis - Una pareja anida en quecus, límite pinar.
 - (1) - Turdus viscivorus - 3 puntos; fam. juv. colicortos en uno ✕ (Mus).
 - (1) - Erithacus - 2 ♂ X m. en las inmediaciones de un arroyo, sitio muy húmedo y denso arbolado, con próximas pedrizas y quercus en soto bosque.
 - (1-2). C. corone - 4 juntos, seguro familia, uno sigue a Buteo.
 - (2) - Buteo - Uno, fasciatus, buen plumaje probable juv. independiente diente. (me dicen cria nido no volaba aún el día 10).
 - (1) - Torcaz - Una.
- Ph. ochrurus - En Roquedos, muchos juv.

15-Julio. Orihuela del Tremedal. - Casa Forestal.

Resumen general de la casa Forestal, junto al huerto.

Sylvia borin - Cantaval menos 2 ♂. Cobramos un ad. y el guarda coge un juv. colicorto que aún no vuela bien.

M. cinerea - Se presenta por allí una. Dicen hace 15 días estaba toda la familia y que debieron anidar en la casa.

Mirlo y Troglodites - Canta cerca y en las humbrías.

Garrulus - Se acerca a las casas. Cobro un ad. en completa muda, de un grupo, les cazan para comerlos.

Cortados.

En los proximos a la Casa Forestal hay bastantes parejas de Emb. cia, que anidaran en los matos de Berberis o parecidos. o en las grietas. Cantan. Casi todos deben tener ahora juv.

Ph. ochrurus - Es muy común. Se ven pocos ad. pero infinidad de - juv. del año, independientes. Al atardecer se meten entre las grietas.

Persecuciones y movimientos activos. Cantan algo. Debe de haber parejas con una 2ª y 3ª nidada.

Valv. 1952.

15-16-Jul. En Orihuela del Tremedal.

Capturamos.

Bufo vulgaris - Entre matorral Quercus pyrenaicus, en Pinus sylvestris, terreno pedregoso y húmedo, no lejos de prados. Uno grande. Mus Madrid, el 15-VII.

En la casa forestal encontramos 6 más, uno pequeño. Se cavía otro Mus Madrid. Aquí prado de diente bajo Pinetum sylvestris. De noche, en las fuentes uno, Era pequeño.

B. calamita - Casa Forestal. Vemos 4, de ellos 2-3 al Mus Madrid. Son muy gordos todos. Uno lo traigo yo. Parece sp. que se mueve mucho.

Alytes sp. - Un ♂, con huevos y una ♀, misma localidad y también en los charcos. Ambos Mus Madrid y creo que otro pequeño.

Un Alytes, casa forestal, 1750 ms. altitud. Orihuela, el 16-VII.


♂, con huevos (unos 45-50, quizá 55) de unos 2'5 mm. con ojos, y otros dos puntos bien marcados.



Sin huevos. ♀? Pata delantera. { llega a ras
rebaso 1 m. hocico con el tuberculo plantar.
llega punta a rabadilla.

Pata trasera. { Tuberculo plantar 2 mm. delante
del hocico.
Tarsos nivel arranque ojo.

Hyla sp. - Laguna al S. del Caimodorro. Coge Bernis 10 pequeñitas, con la línea lateral negra interrumpida. Hay invasión, todos pequeños.



Lacerta muralis - Laterales del cuerpo manchados de azul pálido. Una en muda de piel. Cobramos 2-3 Mus Madrid. Están en los roquedos de la casa Forestal y pie del Caimodorro y es bastante escasa.



Vipera amonites - Hay dibujo.