

Válv. 1952.

17-Julio. Casa Forestal.-

Phy. collybita - Entre los cistus grandes, al menos 2 pares, en --
ceba con pollo grande si mal no recuerdo. Cobro uno muy destrozado,
Mus Madrid, ♂, cantando, creo.

Al regreso, E. cia, cantando X en los lugares bajos rocosos cercanos
a Orihuela.

18-Julio. Orihuela - Mejina, en coche. Llegada al salir el sol y salida, con
un burro, a pie hasta Peralejos.

Mejina,

Pica, Petronia (pueblo). P. domesticus (pueblo). A. cannabina,
A. campestris, Alauda, Ciconia (nido en árbol seco, sacó 3 pollos
este año).

Mejina-Peralejos

Gargantas calizas, con cortados. Laderas con Buxus y alguna mancha
de pinos, entre ellos los primeros laricio que veo.

Coloeus - Una gran colonia en roquedo, cerca de Mejina.

P. Phyrocorax - Bando cerca de Peralejos, los primeros que veo.

E. hortulana - 2 - 3 pt.

T. merula

E. cirrus - X 6 pt.

S. torquata - varios pt.

E. calandra - 2 pt.

Oe. oenanthe - un juv. cobrado.

Hypolais - 4 - 5 pt.

Cernícalo - 1

Sylv. communis -

Buteo - // - 1.

Luscinia -

Alimoche - 1 ad.

Llegada a Peralejos hacia las 12 h. Tarde salida al río.

C. corax - 1 Garganta del Tajo.

Coloeus - Bandos, al menos de 100, bebiendo al atardecer. En muda.

P. pyrocorax - (10)

Valv. 1952.

18-Julio. Mejina - Peralejo.

Biblis - En 2 pt., sendas parejas y ③

Chelidon - Bernis me dice hay una colonia de varias docenas.

Ph. ochrurus - En 2 pt. ceba en el acantilado.

A. apus - Grupos fijos, parejas, entrando a nidos. Atacan a Cernícalo.

A. melba - ⑩ y bastantes sueltos. Muchos juv. quizá aún en ceba.

F. tinunculus - 2 - 3 pt.

Neophron - //.

Gyps - 3 juntos, tercio superior de los gigantescos riscos. Han cogido hueyos en la cueva del Moro. Veo 2 nidos probables y Bernis otro más. No creo que haya más de 3 ó 4 nidos aquí.

Hay colonias importantes en los riscos de la Campana, los Pollales y Navarejos (en este en la Peña del Rincón de Casa Orduña) todos - aguas arriba del pueblo, frente a la 2ª fabrica de la luz.

Se han envenenado bastantes con estricnina (a lobos??) estos años pasados, pero ahora se ven más.

A. chrysaëtus - Un individuo ad. totalmente negro casi, da vueltas en lo alto de riscos perseguido por Corax y Grajillas (ambas), tiene unas plumitas dispersas claras en las subalares.

En la mañana del 19, vi el nido, en una sabina que sale de la pared, fuera de tiro desde arriba y largo desde abajo (donde está desnudo el terreno). Ver croquis. No saca aquí todos los años. (Hay río abajo otro nido). Era en el Ceñajo de la Graja.

C. livia - ⑦ y 2 sueltas, que se posan en agujeros.

C. oenas - ⑥ ② ②

C. palumba - ⑧ y varios pares bebiendo con Coloeus, (reunidos en enorme bando) en el pradillo orilla del río. Canta en los pinos del Tajo.

Dicen hay Cinclus abundante.

En las laderas hay algunos tilos. En un bosquecillo de avellano. boj - Q. lusitánica - Rosa - Algún P. laricio.

Pinzón - 1

Sylv. borin - X

Sylv. communis - Fam. ceba.

Ph. collybita - En 3 pt. Uno X p; otros 3 pájaros; otra pareja respondiéndose.

Erithacus - Cobrado un juv. mudando a ad.

Ph. bonelli - X p., "huidí"

Valv. 1952.

18-Julio. Mejina - Peralejo.

T. merulae -

Troglodites - Cobrado un juv.

Regulus?

Ladera, "Crataegus y Rosa".

Conejos - Abundantes.

Carduelis - Alectoris - fam. tamaño codorniz.


Sylv. communis - Fam. ceba.

Arrendajo - 1 nido.

P. major - Pinos borde.

P. ater - Pica - colicortos.

Serinus - Gorrión.



pardo-verdoso
negro
amarillento
(cuasi audas que
en este cuerpo, era)

Culebra de Peralejos.

Partes imp. manchados de negro.

(Es Natrix maura, 1958).