

Valv. 1953

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo (Leon).
Con Rubioles.

Acaban de caer buenas heladas. Empieza el buen tiempo, que con una tormenta el 10 por la tarde (fuerte granizo y piedra que debió deshacer muchos nidos) nos acompaña todo el tiempo hasta el 13.

Todos los días en Villoria, excepto excursiones.

Día 7, Al monte, terminos de

Día 9, A Carrizos coche, confluencia andando y regreso.

Día 11, A la dehesa de Hinojos, caballo-burro, pasando por Valdesandinos del Páramo.

Lista de especies.

Corvus corax - Uno torca grande de Barrientos.

Corvus frugilegus = Cuervo, Grajo. - Notas aparte.

Coloeus monedula = Choya, choa - Común por doquier en el valle bajo. Faltaba en Carrizo y confluencia del Luna. Esta adaptada.

A. - A las torres de los pueblos, en col. no muy numerosas.

B. - En las torcas, en col. bastante numerosas. (Ver habitat).

C. - En Salix y arbolado.

En la iglesia llevaban ramas. Una tan grande que solo pudo meterla de pico, después de habersele caído en tentativas. Examiné allí 3 nidos en que aún no había empezado la puesta el día 4. Había juv. y ad. muertos en bóveda de antiguo.

El día 11, examino nido, tronco de Salix (Palera) podrido con gran cavidad y un agujero lateral al ras. 4 huevos frescos. (Ooteca) sobre la capa de serrin y - nido **escaso**.

En el soto de Hinojos era común, anidando en los alrededores colonia C. de frugilegus, en Salix viejos. Alguna probable en huecos de chopos. Varias parejas en cuadra, a unos 6 ms.

La abundancia parece ser cada día mayor, pero se les conoce de siempre. Dañina.


Pica pica - Pega. Algo común soto, anidando chopos a enorme altura e inaccesible. Ni un sólo nido bajo. Provee a cernicalos y alcotanes de nidos. Algo común en el encinar.

"P. pyrrhocorax" - Se cobró una, en el monte, este invierno. No sue le versela, los bandos trashumantes de los "Grajeras" del Norte se detienen pues antes.

Garrulus = Gallo - Sólo en el encinar, y en las partes de Q. pirenaica = toza, escaso más bien. En el Luna.

Oriolus - En el soto, un poco por doquier. Péndula o péndola.



Sturnus unicolor = Tordo - Adaptado a tejados. Le ví llevando cebo (2 pares) en Carrizo y Villoria. Un nido examinado con 4 huevos, - terminando la incubación, en tejado, el día 4.



Valv. 1953.


5

4-12-Mayo Villoria de Orbigo. (León).



Sturnus unicolor - Nido bajo teja (levantada). Capa exterior, raices finas y paja seca. Capa interior, con un buen almohadillado de plumas de gallina.

ENTRADA



En al bóveda, muertos de antiguo, juv. y ad?.

Ánidaban parejas dispersas en los nidos de Picus (agrandados mucho) del soto.

Comian por el prado y soto, entre árboles, etc. En toda la región y valle del Esla. En Villoria imitaban al Alcaravan muy bien.

Passer domesticus = Pardal - Comúnas por todas partes. Haciendo los nidos, la mayoría. Uno me llevó más de 3 ms. de cordel. Al tirar de él, a las 9 de la mañana, salió con un manojito de plumas y crines.

Alcornoque -

4-12-Mayo Villoria de Orbigo. (León)

Patronia = trigalero - Común en el pueblo de Villoria, casi mezclándose con Passer, pero más bien a corros y en edificios bajos. La oí en otros pueblos. Por doquier. Un grupo en la ladera de la confluencia del Luna. (7)

Passer montanus - Común en el soto o poco común. Anidando en las paleras de Carrizo a Hinojos.

Serinus = Verdecillo - Común en el soto. Vi huertás. Algunas construían X M. En el encinar, parte alta. Q. ilex puro, alguna pareja y otros en el Luna.

Vi nido en un manzano de 4 ms. en rama a 5 ms. contra ella, con 4 h. la ♀ incubaba desde hace 3-4 días.

Chloris = Verderon - Muy común proporcionalmente en el soto, mucho e más que en Valladolid. Reclamaban y pedían de continuo. Se les solía ver siempre muy junta la pareja, en matorral entre bosque claro. Chops sobre todo. Vi un grupito (5). Persecuciones.

Ambas sps. comiendo en los prados, aún muy húmedos.

Acanthis canabina - Pardillo fino - Falta totalmente del soto. Algún par en las huertas. Un nido 2'5 ms. en manojito terminal de yedra, contra muro, 4 huevos, la ♀ incubando. Más común en la zona de cultivos de secano, yendo a comer en prado húmedo. Algunos en el encinar, más quizá en Ilex puro y en el Luna.

C. carduelis = Jilguero - Poco común en general, bastante en las huertas. Tiene gran querencia al piño albar huerta, donde se reúnen varios pares. Un nido en construcción, en ramita punta de manzano, a 4 ms. 2 en piel estropeó gato, la ♀ mucho más gris que la de aquí.

Emb. calandra - Relativamente escasa, y en la zona de secano despejada con enclaves de prados. Por tanto, terreno abierto y ligeramente o bastante húmedo, sobre todo.

Pardillo basto

Emb. cirrus - Extraordinariamente común en el soto, comparando con - Vallo 2 parejas construyendo, entre zarzas muy bajas, en lugares semi húmedos. Dispersión general por el soto, huye de enclaves húmedos como Chloris. = Pardillo basto.


Emb. hortulana - ♂ x en A. toza solitario. ladera de Carrizo. Debe ser muy escaso en esta zona baja.

Fringilla colebs - Una pareja anidando en huerta y raros soto, ♂ en encinar del Luna. No canta.

P. major - Algo común en el soto. El 10 las primeras crias del año, oídas.

P. coeruleus - Mas raro, soto.

Aegithalus candotus taiti - En unos 3 pt. del soto, cerca del pueblo, entre olmos y Salix predominantes y junto a al agua. Un nido, sin puesta el 8, aún en construcción. El 12 seguía el ♂ trayendo plumas y tenía 4 h. muy frescos. En Alnus. contra el tronco a 5 ms. y sobre un arroyo. Cobrado un ♂, resulto indistinguible de los Vallisoletanos, y por tanto Taiti.



♂ ∞ A. 59'5. P. 7. T. 17. Sin cola.
Los huevos miden, 13'75 x 10'5; 13'75 x 10'60.

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo (León)

Alauda arvensis - Dehesa de Hinojos, bastante común. Eran bastante grises y me dió impresión de incubación.

Lullula - Común en el encinar, canta algo diferente de la de aquí. Apenas "te ví - te ví" y solo casi "piñá-piñá".

Melanocorypha - Vi bastantes en las tierras de secano y perdidos cerca del monte de Villoria y páramo.

Calandrella - Común en los mismos sitios (quizá 5+1 en relación con Calandrias o más).

Galerida cristata - Cobrados 3, todos de esta sp. Una padecía una afección oftálmica. Era común en secano cultivado y cerca de pueblos.



Anthus campestris - Vi 2 ó 3 parejas en los pedregales arenosos del lecho del Orbigo, con Galerida y Burhinus. Será común allí.

Motacilla alba - En el pueblo y soto escasa.

M. flava - Iberiae indudables todos los que ví. En la Dehesa de Hinojo, un nido acabado aún sin puesta a 6 ms. charca, en manojos de hierbas. Muy común en todo el valle, entre arboleda clara -- incluso, abundante en los pastizales lindantes con secanos.

Certhia - Le oí rara vez en el soto.

Muscicapa hypoleuca - En 4 pt. solitarios, soto fresco y huertas. Rubio dice anidan. No cantaban. Una ♀ del 8, ad.? ovario nulo, bandeada de blanco las 3 rectices externas y manchada base primaria desde la 6ª, creo indudable típica en paso.

M. striata - En 2 pt. del soto, solitaria? Uno localizado (7-10-V) estuvo al menos 3 días, no se si partió. Aún hay paso. (En Valla dolid uno en el sotillo el 15). Una en Carrizal, cerca del soto.

Phy. collybita brehemi - Extraordinariamente común en el soto, donde haya arbolado, preferencia quizá por Salix, lo mismo en humbrías que en claros. En el Luna, común en Q. toza arbóreo, - falta en cambio en el encinar, distante unos 6 kms. del soto -- (en el Luna 600 ms.)

Los ♂♂ cantando continuamente, casi todo el día, menos a las horas de más calor. Creo densidad máxima, a saturación. Conté unos 35 pasos en 3 territorios definidos por peleas ♂ x ♂ en los límites, cada uno comprendiendo una línea de árboles. (uno de chopos solo). Alturas media y alta. Una ♀ construía a las 9 h. en talud contra -- canal, entre Rubus rastrero de una cuarta y ortigas y yerbas. Nido a 15 cms. del suelo y muy bien oculto. Cobrada. Otra ♀ ya con mancha incubatriz y ovario atrofiado. A juzgar por la escasez de ♀♀ que se notaba (no presentes con el ♂ en la mayoría de los corros) la mayoría incubaban. Ni uno cebo. Cópula. El canto es muy variado en la longitud. Siempre con partes bien definidas. "In sittu".

Ti-ti-ti chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip.

tuí-tuí-tuí ---- tuí-tuí-tuí. descendiendo.

La terminación es la que más varía. A veces es de uno o dos notas nada más.

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo (León).

En el examen de ejemplares, 7 ♂♂, 2 o (una semidestrozada) la 2 queda entre 6ª y 7ª en todos, ~~menos~~ en 1 en que iguala a la 6ª, dato típico en Brehmi.

Phy. bonelli - Cantaban algunos en el robledo de Q. toza más Q. ilex de Luna, menos abundante que collybita. Uno llevaba hojas, uno sólo en el encinar cantando.

Hypolais poliglotta - Algo común en el soto, sobre todo en grandes zarzales soleados. Cantaba bastante en Salix, a bastante altura.

Sylv. atricapilla - Un ♂ solitario en Rubus Salix. Paso?

Sylv. borin - Escasa y solitaria en el soto, y huertos. No cantaba o lo hacía poco. Debe criar pero no vi muestras.

Sylv. communis - En el soto era común en zarzales bajos y densos, soleados, junto a la carretera de Carrizo en valisimos matos de Ulmus juv. y Rubus, era el ave más común. En el encinar una pareja, cobrado ♂ ∞

Canta poco, al vuelo y desde alto de árboles y por eso quizá escapó en taxiado. Sólo el chorr sordo, solo audible de muy cerca, ~~la~~ señala. También había escasez de ♀.

Sylv. hortensis - Un ♂ enormes, cantaba por la tarde en el encinar, cerca de toza semi arbóreos, pero entre ilex. No vi pareja.

Sylv. cantillans - En el encinar era muy común (el ave que más con Lullula) en parejas. El territorio debe ser amplisimo y no se recata de recorrerlo. ♂ ∞

Una ♀ poniendo o a punto de hacerlo. Se las veía más en parejas y cantaba bastante.

Turdus merula -

Turdus merula - Común en las huertas y menos o escaso en el soto donde le faltan grandes matos. Vi 3 nidos en yedra contra pared. Restos de un juv. completamente emplumado, víctima de los gatos, cuando llegué. (podrían ser de un mes igual). Uno cantaba en el Luna, entre Ilex más toza arbóreos y matos.

Troglodytes - Escaso en el soto.

Cinclus - Vi uno disecado molino, cobrado allí. Era apenas pardo bajo la pechera. Dicen que le hay todo el año allí pero Rubio solo le ha visto una vez (no lo vimos ahora) y es raro. Probable visitante de invierno.

Luscinia megarhynchos - Muy común en el soto, alcanza mayor densidad que aquí por la excelencia del habitat. En pleno encinar cyntho en toza más encina arbórea en el Luna. Cantaba uno en una hondonada entre ilex con algún torbisco. En el soto se adapta a zarzas muy pequeñas. Parecen flojos cantores.

Cettia cetti - Extraordinariamente común. El habitat es ideal. Infinidad de riachuelos humbrios, con zarza abundante. El difícil que sobrepase en muchos sitios la densidad que tiene aquí. Cantaba mucho, pero como lo hace de rato en rato en taxiado hay que ir muy lento para no pasarlo. Cantó igual al de aquí, adquiere una sonoridad enorme cuando emitido en oquedades de verdura. Es tan o más ruidoso que el del ruisseñor.

(En Valladolid, del 2-V al 15-V noté menos frecuencia en canto que se reveló en mayor escasez al taxiado).

JAV

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo (León).

Oe. oenanthe - En el páramo vi bastantes, más ♂.

Oe. hispanica - Sólo en el monte y donde se mezclaba ilex con tozo más o menos arbóreo. Cantaba bastante. 1 ♂ aurita y 2 stapacina.

Hirundo rustica - Común en todos los pueblos. Muchas cogían barro. En un nido de la casa, sin arreglar (estaba nuevo) 4 huevos frescos.

Chelidon - En el pueblo hay un par de pares, les vi, bastantes, en Palazuelo de Orbigo, y en Veguellina. Ya hay en pueblos señalando transición al N. pero es escaso o raro, como en meseta.

Riparia riparia - Le ví en 2 pt. en el río, aguas abajo, mezclada con Hirundo. Es escasa. En años ha anidado en número.


A. apus - Común por doquier, anidando en casas de 2 pisos. Ocupaban un nido antes con Sturnus, arrojados seguro. Cobramos uno. Vi cópula en vuelo.

Upupa - Escasa en el soto, más común cerca del pueblo, toda la reg. algunos pares en el encinar, quizá anidando en los pequeños torcas. En uno o dos pt. llevaban ¿cebo?.

Alcedo atthis - En 2 pt. en el río. Vi juv. y ad. disecados. Parece ser común.

Merops - En Villoria, no llegan a 6 pares río. En el encinar en 3-4 pt., laderas. En Carrizo, 1 pt. y otros cerca de la Dehesa de Hinojos. En total parece bien extendido por toda la región y adaptado a varios habitat. Varios informan que hace años no se veían, la fecha más larga conseguida es de uno 6. En otros pueblos ocurre lo mismo.

No ví Caprimulgus, que cria algo común en el encinar y es probable europaeus.

Jynx torquilla - Sólo cerca del pueblo localicé 3 pares más el de la Huerta, cobrado un ♂. 8-V que cantaba a gusto. Otra pareja en Salix bajos,  sobre el río, se contestaba alegremente. Le han visto - . Nidar . No creo sea nada raro en la región.

Picus - Soto donde construye para Sturnus, encinar y A. toza -- arborea de Carrizo. Es común o muy común en toda la región.

Dryobates -- No vi, que ~~que~~ Apenas se conoce como errático de invierno.

Cuculus canorus - En 2 pt., laderas de Cimanos entre toza arborea. Vi uno, grás, cantando, alas colgantes, puntas secas de robles y muy escamón.

Conocen muy bien a Clamator = Cuev pego y saben parasitiza a Pica "comiendola un huevo" según unos. Creen llega ahora. Onopatopeya grito "Crialo = criale" (que les dicen a las urracas después de poner).

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villorio de Orbigo. (León).

Falco tinunculus = Gavilucho - Algo común, adaptado sobre todo a 2 biotopos.

1º - El soto, donde escasea (predominando quizá F. subbuteo) está blecido en nidos de Pica.

2º - Las torcas, donde anida en semi colonias de 3-5 parejas en - unión de Coloeus. Vi varios nidos en los agujeros de la arcilla, altura 2 ms. y fácilmente aseguibles. Las ♀ debían - incubar, porque sólo salían ellos al palmoteo. El cazadero de estos son encinas y tierras incultas o barbechos, donde - les vi tirarse.

Dicen que anidan en palomares pero probablemente confunden - con F. naumanni. Les vi dispersos por el Esla y páramo de León desde el tren.

Falco naumanni = (Gavilucho. No distinguido) Vi perfectamente un macho ad. que entraba nido tejado casa solitaria de 2 pisos, a 2 Kms. del río Luna (En Cimanos de Tejar), en el valle. No había palomas allí. En Carrizo volaban 2 pares sobre el convento. Una reunión de 5 en cazadero, cereales, a menos de 1 K. del pue blo. No le hay en Villoria.

Es el límite Norte. Probablemente se establecen en la región muy pocos pares, alrededor de pueblos viejos con grandes edificios_7 que les sirven de núcleo.

F. subbuteo = Alcotán. - En el soto de Villoria 2-3 pares y un - par en Carrizo. Frecuentan las líneas de chopos, entre prados - tan abundantes en pajarillos. Inf. anidan nidos Pica.

Una pareja se posaba y chillaba, probablemente en celo, el día 14.

Dicen que el Alcotán que come palomas (probablemente F. peregrinus) anida en las torres grandes de Barrientos. No le ví pero el sitio es bueno.

M. migrans - Pareja 2 veces en Villoria y un solitario en el río. Otro solitario en Valdesandinas, perseguido por frugilegus que le daba pasadas y otro en Hinojos. Debe ser raro.

Hierahetus pennatus - Una pata (Rubio) de una cobrada en el monte.

Hieraetus fasciatus - Una pata (el Molinero), de una cobrada ~~per~~ León o la Bañeza.

Es extraña la escasez de rapaces. Ni siquiera conocen a Buteo. Hablan de nidificación en torcas de Aguilas. El Azor juv. que - examiné de octubre 52 fué cobrado en una ladera de Ilex más toza, entre 2 torcas, que vi de lejos. Este si que parece ser algo - conocido y le llaman Galforro.

Accipiter nisus - Vi ♂ y ♀ ad., disecados. (Molinero). No parece criar.

Neophron - Un ad. sobre el río en Carrizo y una pareja de ad. en la confluencia del Luna, estos haciendo acrobacias. Otro ad. en Valdesandinos (sobre el río). Vi otro ad. disecado en el Molino.

No parece ser raro en la región. Debe haber cortados favorables para la nidificación y esto en la baja Ribera parece difícil.

Valv. 1953.

4-12-Mayo- Villoria de Orbigo (León).

No conocen apenas a Gyps, pero en la zona apenas se emplean mulas. Todo el trabajo corre a cargo de bueyes y vacas y por otra parte entierran a las bestias muertas y no les dejan sobre el campo.

En la zona montañosa no parece ser tan raro, aprovechando la abundancia de ovejas trashumantes.

Oediconemus - Pernilero, grita "Perní-perní". Vi y oí bastantes en el prado-cascajeras del río en Villoria, donde Sturnus unicolor imitaba su grito, dentro del pueblo, a la perfección.

Abundaban mucho en las partes más secas del prado de la Dehesa, entre los Vanellus. Al parecer crían algunos en las tierras de labor y perdidos entre el monte y el valle.

Himantopus - Vi uno en una charca de S. Martín del Camino, en el paramo, desde el tren, y otro en el río, en Hinojos. Nos dicen que hace días se ha visto un par en la dehesa, pero no damos con ellos.

El punto donde anidan en el Orbigo es una gran cascajera junto a prado-seco donde el río hace charcas, en el estiage. Apenas le conocen. Probablemente anida en las lagunas del paramo y algunos puntos del río que al secarse le obligan a desplazarse por la región. En la baja Ribera deben criar, remontando hacia Villoria en busca de agua.

Charadrius dubius - Por doquier, en cascajeras del río desde el Luna a La Bañeza. Densidad muy elevada, unos 3 pares por km. El hábitat es excelente, con islas pedregosas entre brazos del río.

Tringa totanus - (14) en Villoria. En los brazos del río del Hinojos vi al menos 3 parejas con aire de establecidas y un grupo de

(4) En la Dehesa, una pareja establecida junto a una charca, al llegar volaban alrededor dando gritos. Se posaban muy cerca inquietos, corrían entre la yerba y se tiraban allí en cuanto me alejaba unos 50 ms. Uno se echaba en una islita del charco, pero no pude encontrar nido. Era junto al pollo de Avefría. Al escándalo acudieron 4 más, estos con aire de no criar.

Les oí en otros 3 puntos del prado y vi otra pareja. Indudablemente crían allí bastantes y seguramente parejas dispersas en otros pt. favorables.

Vanellus vanellus - Vi la 1ª en Valdesandinos, volando sobre la colonia de frugilegus. Delante de Hinojos, en los prados ribereños había al menos media docena de parejas, pero la gran masa estaba en la llanura de la Dehesa, alta de 12 ms. sobre el río.

Cálculo de 50 a 100 pares, quizá más en aquellos ~ 3 x 4 kms. de pastizal. Ocupan igual las lomas algo más secas, con pedrisco y Thymus, que las hondonadas húmedas. Probablemente la máxima densidad de nidos corresponde a la parte semiseca donde empiezan a mostrarse gregues de juncos. En una parte de la llamada, los juncos extinguidos han dejado una especie de almohadillas de tierra y en lo alto de un montículo de esos encontramos el nido C.

Hay intercambio entre avefrías de la Dehesa-soto, que pasan volando bastante altas. En las lagunas vi agrupaciones de hasta 9 individuos, de los cuales 1 ó 2 pares debían tener crías allí y el resto estaba comiendo. Picoteaban por doquier. En las tierras aradas no vi.

Valv. 1953.

4-12-Mayo- Villoria de Orbigo (León).


Encontramos 4 nidos, uno vacío.

A.- Pedregal con tomillo (pocas piedras). Caverna de 11 cms. Ø, por 3'5-4 de profundidad.

En un cono chato; bastante visible por ser más clara que los alrededores.

4 h. Ooteca, 2 de ellos semipartidos y agujereados, probablemente por las ovejas que pastaban allí.

Tenían pollo grandón con todo el plumón y reabsorbiendo el saco abdominal. A falta de unos 2 días. Algunos creo que picaba el huevo.



B.- Entre yerba y cerca de juncales, al S. de un matito, (como el anterior. El N. es viento dominante allí). Dimensiones como el anterior. Tapizado de trozitos secos de junco. Tres huevos con un día de incubación lo más, si alguno. Nos dicen que ha puesto en estos 3 últimos días.

C.- En lo alto de un mogote de tierra y con 3 brotes de juncos pequeños y ralísimos alrededor. Tenía 4 h. (uno muy roto ahora) con unos 4-5 días de incubación, en alguno quizá una semana.

Otro nido vacío, entre yerba rasa.

Cerca de una laguneja, corría un pollo del tamaño casi de una codorniz, con blanca nuca e infs., los padres chillaban mucho al acercarnos, volando sobre las cabezas.

Comportamiento análogo en 3 parejas más, todas junto a charcos. Al menos una de ellas con pollos (muy pequeños) que vió un pastor el 10, Los padres pues, llevan la cría al agua apenas nacen.

Las parejas con huevos no se acercan. Algún padre vuela en círculos largos, dando gritos, pero son entonces mucho menos valientes que con los pollos.

Las puestas frescas deben ser de reemplazo. Esta mañana un solo perro ha comido 4 nidos, y hay 4 ó 5 rebaños con 2 ó 3 perros cada uno en la llanura, (de merino casi puras). Abandonan estos pastos el día 14 para ir la valle de Luna. Entonces podrán criar tranquilas las "ffrancesinas".

Al parecer anidan todos los años en la dehesa, y siempre en abundancia. No se les da importancia.

En Villoria me señalan Las Huergas como punto de cría. Es un extenso prado raso, entre tierras, con unas lagunejas. No vi ninguna. Dicen les gustan los sitios "solidos" = solitarios. Hay alguna pareja anidando 3 km. al N. de Villoria, según informes.

Villoria.

E. ciouie esquieta, a las rias esquietales, las vi cuidando todos en iglesias y casi todos en Espudana en Villoria, Camino. Dehesa de Huesos.

Por cualquier en los puros del río uno o 2 individuos. (hasta 4). Un nido en chopo grande machado, junto al Molino, donde se han establecido este año. A 1 Km. de allí se ha derivado un chopo-nido este invierno y prob- la misma pareja es la que me aceptado este, más todo por el dicho molinero con los nombres de otros que el viento les trajo varias veces en esta primavera. ^{empieza este año la misma pareja.}
En casi todos los nidos un ad. echado. En uno se veían pollos ya bastante grandecitos.

Anas platyrhynchos curro. Solo los vi en Huesos en la dehesa. (♂♂ ♀) volaban entre las charcas. A las 6:30 h. en el nido ^{huelto} en una charca pedregosa, un nido junto en los bordes, una reunión de 44 ♂ ad + 2 ♀ + Penelope, poco esquinas. Es una reunión de ♂♂ apurados de los ♀ que incubaban o incaban dispersas. ~~En~~ Algunos empezaron a mudar, perdiendo pluma, pero no orona el de eclipse y aún vuelan a la perfección.

En Villoria ha salido ^{ya} el 3. una nidada, rompiendo con el día 5. en un trigal. La ♀ se dejó cargar a mano. Junto a los Huesos. se veían bastante nidos en la región.

Anas penelope. Dehesa de Huesos. 2 ♂♂ con magnífico plumaje en la reunión de arulones. Ambos se separaron juntos, se fueron cerna y volaron, este vez al agua.

En el río vi una pareja 2 veces cuidando los puros con charcas donde cuidaban Anas, Anas y Tetanus. Es muy probable que bien aquí algunos pares.

Se habla de Spatula, penelope y zarcetas invernantes.

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo. (León)

Podiceps ruficollis = Chapucinos - Vi 2 ó 3 disecados en el Moli no. Anidan bastantes al parecer en los charcos del rio, ocultos entre alisos y matos. Hay buenos sitios.

En charca de la Dehesa, un nido de ovas, con huevos, destacando limpiamente en la pelada charca. Vi al ad. al acercarme tirarse al agua y 1/2 m. del nido chapuzar y desaparecer, no sé como.

Larus ridibundus - Un juv. de cabeza aún semiblanca, en el prado, se posaba en la hierba.

Conocen bien las "gaviotas" que son "comunes en invierno".

Otis tetrax = Sisa, Sison. - No logré verles. Sólo excrementos en los secanos al pie del monte. "Anidan algunos". Vi el sitio en que mataron jóvenes, barbechos y tierras en un claro de encinar.

Avutarda - Parece se aventura a criar en escaso número en el páramo y se deja ver en la Dehesa de Hinojos. Más al N. dicen falta.

Gallinula = polla de agua - La oí en 2 pt. del rio y vi ejemplares disecados.

Rallus - Vi disecado uno. Dicen cría en las charcas.

Alectoris = Perdiz - Cantaba 1 pt. del encinar. Una pareja en el prado algo seco soto, entre arbolado. Escasa.

Coturnix = Codorniz - Cantando por doquier en toda la región, pero no mucho. Prefiere los cultivos cerca de pastizales al prado arbolado del soto.

Vi plumas de Perdix cobrada en invierno en el monte a donde se aventura rara vez nunca cria.

Valv. 1953.

4-12-Mayo. Villoria de Orbigo.

Rutilus arcasi (Steind) - Es común en el Orbigo en bandos asociados con Gobio (más escaso). Obtuve unos ejemplares en Villoria. La especie no está citada en este río, aunque sí en el Tera Lozano (193) ni por Velez Medrano (1944).

Gobio gobio - Algunos en el Orbigo en bandos. Disperso en las acequias de riego donde apenas tenía sitio para nadar (aguas frecuentadas por Tropidonotus natrix).

Leniscus cephalus - Me trajeron de comida bastantes.

Lacerta ocellata - Vistos en 1 ó 2 pt.

M. nivalis - 2 tipos. a/- Dorso verde dorado uniforme y cola pardo verdosa uniforme. Cobrados 2. Lugares herbosos junto al río.

b/- Común, sin manchas azules. En el borde del paramo, y en un sitio As. con A.

T. viperinus - Ver notas.

T. natrix - Algo común, arrollos probables con ramas y peces.

Bufo vulgaris - Común, en la zona del soto.

P. cultripes - Uno en la torre de una Iglesia.

Hyla arborea arborea - Zarcas ribereñas y prados, forma típica 6 examinados.

M. marmoratus - Huerta, común bajo piedras y en mayoría de uno X cms. una gran o media.

Erinaceus europaeus - Un individuo muerto en Villoria.

Talpa occidentalis - (Cob) 3 ejemplares capturados con el bifido sup. de esta sp. Es muy común en toda la zona de Restos en la bobeda de la iglesia devueltos por las lechuzas, que a falta de topillos deben hacer de él su principal víctima, junto con Arvicola sapidus.

La abundancia del topo puede explicar escasez.

La falta de topillos (Pitymis) que a penas conocían uno o dos labradores. Es probable que las des sps. esten en competencia. Al menos en el centro donde falta o es raro Talpa, abunda Pitymis extraordinariamente en el junci-graminetum y regadíos.

Putorius putorius? Turon - aureolus - Bennett-Hamilton? - Vegellina. Vi ad. con la borra amarilla fuerte de esta forma y un juv., ambos naturalizados.

Mustela
Mustela erminea = Mostorella - Vegellina, 2 ejemplares naturalizados cobrados allí. Uno aun no había terminado de mudar el plumaje de invierno. Cabrera de Asturias y Burgos como límites S.W. de la especie, pero por mi parte le he visto de Valladolid y Palencia.

Con el mismo nombre concen a M. nivalis que sin embargo, diferencian. Un viejo alimañero me dió la proporción 5-1 a favor de estos últimos.

Villoria.

4-12-V-53.

S. Maestre del Convento. Vespertino

Ciencia 2.

Humantlapas 1

Lo uno ~~primo~~ valle Eda Jandancia de
St. unicolor.


~~Externa. Nido específico alto en el monte.
St. unicolor. Colores ~ 10 pies.~~

~~Botada. Nidada que vuela algo. ~~2~~~~

~~St. unicolor? St. unicolor? ~~2~~~~

Topo. 1 Nidada

1 vez. 1 tipo de parrot salvaje




Nido St. unicolor

4 h, folla parvulo para

bolna abdominal

Victoria de Orizaba 4-V-53


JAV



altura. 5/5 dedos
 diámetro. 5 "

4h.

capa exterior rojizas, puras, papiraceas
 abertura del lado de pluma de gallina



~~carona~~ ~~paran~~
 Orulus - X huerta, sito

~~Colores unidos, unidos. 3 bien en
 superficie en punto.~~

~~Pelobates cutreces entera ^{frontera unipennis}
 Petronia, andia auto. Teps.~~

La cigüeña en folia, es muy papiracea
 una parte de Motacilla alba en tejidos
 jóvenes. goniones.

plumaje de oto.

~~Milvina
 Junco.
 Pindillo.
 cordobés.
 Mestizo.~~

~~Euro. culus, - designa
 M. hypoleuca.
 Syris, warris
 Cettia
 P. senos.~~

Sylvia borin. - Colando. 67.

~~de dorado.~~

~~Picus -
 Pica.
 Oriotes
 P. una por~~

JAV

M. miqueloni // Reptiles

muerto. Paredes, pasaje por la salida.
Muito juv. en cationes muertos por
el gato. 2 vidrios muertos en pedras
contra la pared. Hace dias ingresaron vidros
con 3 huevos.

Reptiles.

lagartija, entre piedras y juncoos vallas no.
Infs. amarilla oscura o amarillada excepto en
la mandib. inf. Mas fuerte cuello.
Infs. blancos, desde la zona dorsal se demarcan
la zona de coronas y parte post. verde-amarillenta
panderosos, negro dorado. Pesta. nardo-gris claro

con l. banda laterales bien definida desde
un poco detras del oido al arco cigural de la
cabe. desvaneciendose en esta. En Fossil
cuellos. 3, vallas H₂O - Puhos + vallas y
Puhos litos muertos. Poduzcas uniformes
lomos (no se calera) punto T. natural.

Bufo vulgaris 2 casquidos muertos, en el
foso.

Molge maculata 1 ♀ sus crestas dorsal
en absoluto y muy negra

Cuco pepo = *Clamator*, - quito/crisalo
my esus
Crisalo

Cuco no comen.

Papas murce = *Copmilpus*.

Ripon ripon - anidada hace años
ene Villoria y anidada hay estigma

Volcans =

Princulis = *Anthracis* dice anida

Bahonuel, a natos en nubes

Machetes / abalos
Juanillo

Eugariadores = *Cesthia*
hijos vena raro en unicus

Ha unida cris y no se hunden.

La Huenga.

~~proalpa = abada, p. r. r. r. r.~~

No juda qis.

Adona anida nulos

conchota = *pt. orientalis*, p. r. r. r.

Fonac - Ramme nd. en verana mas
ver anida abedus

Zoramugares = *P. ruficollis*

alcatraz = *F. subbetos* +

Yanulcha = *F. trunles* +

mitano - criso, apuarse, Nibias. no me
auto

Galforro = *Mitans veyos* = *Angentilis*

siguere = los liebres

o Ace. nirus

Cigüerites, - *Crocis juv*

Pitona = *Sulopoc* ++

Pollo de MO = *Fallucula*
chapasinos = *P. ruficollis* ++

Zancetos = *A. vena* ++ *grua.*

Curros = *parthen* ++ *Curro de odros =*
panulcha

Sina o sison = *O. Tetung* ++

Peruiteros hace perni. = *Dedemellus* +

Franconas = *Vouelles* +++

rempalper = *innocue pepueto* ++

Galmas = *agochodinos* +

Ganotas = *L. nidius* ++

Paloma tricalia = *Strophopus*

Torkalina +

ledura = ++

Cuco pepo = *Cucules*. Pave vides pagas.

Papas murce = *mochneto* +

auganapastor = *Copmilpus* *Colambella*

Vucio = *opus* +

Merisio Vago el 48

++ *apulitero* = *abada*!

Abubilla - +

Acudo J. de agujero para huerta

retención = Pica + Tanulera Pito +

Coguzada = Golanda + +

Alondras = ? andan vinas +

Salandras +

golondras = Hueso +

Amoros = chulona = venoso?

Pendulas = pendolas = violetas + +

Gala = anadupis + Pega = Pica

~~los~~ las silencio + siempre se notaba.

~~los~~ los los los +

golondras se paraban cuando amena
los vientos.

Buites nublados

Tocnero = P. mapo. porque se come los +

de = ventura

Carbonera = Ph. chubasco + +

Puñeteros + Puñeteros = Eristros No

mier los = neu taralulo blanca = acanto

Mirlos, negras = mirlos + +

rojas = los rojas Mahon. + en la

Pajaro del rey St. M. alba +

Tordo, del rey = St. unido los

montesinos = St. vulgaris ?

+ Pardalos = pinces = +

Trupalos = Petronia + +

Vendelillo: + + Pardillo = plumero de muñeta

alguno: + + (1) Pajaros del rey señor = Malle

Vanderson: + + Nuestra Señora = M. lance

gauré.

gauré no viene en invierno.

Zorro o raposo.

huron = " Turon " gardenia +

Doroncilla = Mutela +

Nutria = Lutre ? =

nato de agua. algunos venen

topo. No conoce topillo. +

Euro. +

Salamaquena. + El agua de los rios

este mes no.

Sapos. + Troyas = sapos quien de vulgaris

Brama = Pevacuajo

Pava de S. Autemis +

Calabras. +

lirio = augus not. +

bagarto = un un

antanda en pinces

argano partes = calandrella

Muecos. = En S = Colanilla no los hay.

Ha Villoria hoy 2 años

Guarando = un un

en carnotas 1^{er} en cañones

JAV

5-V-53.

talpa. L.T. 165. E. 27 T. 175.

Entre las piedras al amanecer.

Colletes *populus*. Una vez, entre
árboles.

Py. voluptya.

+ + + + + chp. chp. chp. chp. chp. chp.

Colinas q? incubando donde
separó a la agua y q? con algunas
otra zona montaña y otras algunas
de tramas entre algunas y algunas.

Hay colinas más pequeñas en algunas zonas
Montañas, y en 2 zonas. Saturación
en temperatura + 30 gr.

Aridation (o aridation) en la campesina,
Vegetación.
Aridation en los huertos de la transición.
Herencia de tiempo inmemorial aridation.

Troncos

latra - X - X

rub en los 5-X-X

Pis - 1

purpur - 1 - X

senes - 1 - X

syb. *univ*!

brun X-X

albas - 1

Phyll. *W* - X-1

trichodytes!

Alnus *in* *Alnus* *algunas* *zonas* *de* *los* *árboles*
algunas *de* *los* *árboles* *en* *algunas* *zonas*
a *veces* *con* *algunas*

Chryso *mez* *pequeñas* *de* *los* *árboles*

Genista *florida* *esporádica* *en* *algunas*
zonas *de* *los* *árboles*.

Chaetomium *laevigatum* *en* *algunas*
zonas.

Rio.

U. dubius

// // // // 2 pocs muros. quise 3.

Totanus (13)

Cicadonia ^{abundante} harta 3 al tiempo. 2 krus

equis abais

Anthus campestris // en el arena pobre-

gall pino

Galimelia alguna en idem

Alcaravan. Al menos en 3 pt. parece que

este el imio psittacus aqui.

Gallicula Scotia 1 pt.

Gobio - handitus, mesochorus con

Puteilus en mas pt. Cusonus 3.

El no. con Ranunculus y ovens, est
reserva. no veranus.

Los Puteilus. (alvial)

Parvus

Coctus

Calandrella.

Reptiles.

Impetia. modo proanus.

Penduliparidella. Murias de Paredes
cuau. En mano de vino de uva

Pica puerca L. exarbitris

Campanero = Olytes

Mostacilla = doronilla

Fucus pugilopus

1 39 X 27'5 39 X 27

2 37'5 X 26 39'5 X 25'75

3 40 X 26'5 Medio 39'8 X 26'5

	27'5
39	26
37'5	26'5
40	27
39	25'7
37'5	13 27'5
	32 26'5
	27
	2
14 4 65	
44	39'8
40	

^{Tercera}
Penduliparidella ; novo Colandrea - Pica
unicolor

Pica
M. flavo. com.
Eula colandrea - com.

Pardalis
It unicolor / feeding

Syl. communis - // - juv. ad. ad.
Doradon - m. h. d. d.

Laminas 12 Tropicodontus v. p. m. m.
muestras, de dimensiones que oscilan entre
~ 15 cms. (5) y 40 (2) los dos de
~ 25 (3) y 30.

A 200 ms. p. m. Otra ms. 40 cms.

Sialis ? - com.
Colandrella - 8
Colandrea - 3.

1. Jernat // en cerco silvestre + Pica

com. //

Fornios = *Sybra undata* *thata medio*
gato = *Paratya* *undata*
Furnios = *undata*

Opuntia grande
californ

Antirrhinum: muy pocas, como sea.

charlas - 2 charlas de carne, hino negro.

Muy chico, chico.

Ordovizos - *Hoban* *temm.*

Furnios

Ternisco = *una* *para* *matas*

Moraculas

Prans de S. cutan.

Eggnipulos *ruente*.

1º Polo numeral, mediano

3º 3 dedos de *Perdis?*

Una medusa, bifido, *para* *amabilis*
o *avejo*.

El emular, aunque no es nada calizo, resulta ser un esclavo medit. que se encuentra juntamente con el atlantico-soto. Incluye los de amulos. Segl. *bertoussis* y *Phy* *collybita*.

Talpa, abunda ya pero en los prados ~~de~~ *prunavera*; mas arriba falta en absoluto. Es un buen "indice zonal".


Las tonas son importantes como centros de dispersion de semillas y huevos. Mantienen evidencias el presentel de conejos reproductores:

Exuvia emular 1lb - 20h. *huevo* *sol*, no visto. *tracido* ~ 6 Kms. (\pm 500 ms).


Reunapio solo 2 tamaños (y uno mayor) en charca vieja *parame* 15-20 x 8ms con *B. aquatilis*.




Prepusulas.

Imex. ♂  - 8-V-53.


Syl. cautellous ♂  7-V-

♀  no pines.

Syl. romans ♂ 

Galeuda - 603. ♀ 
610 ♂ 
604 ♂ 

Phyllonopus vir stipitatus ♂
9-10-V-53.

Syl. latamii ♂ 

8-V. Trade

M. striato

Cepithalus. Heavily plumed at sides. In
clump, contra el viento, a 5 m, y sobre el signo
de un orango.



Gajina. ~~agua~~

El estudio de abajo de Veguellina.

El solo nuevo. Ha crecido.

Gajina, Reserva del Marques de Pimajo.

La Bañera. (león).

→ Han cumplido ~~nace~~ 3 años

~~Pa~~

Alta despena curvada y recta. En un
arbolito un grupo de ~ 50 ácaros, tan
alto como los árboles, y en ellos los nidios.

Hay 16 ocupados.

2 - 7.6 - 2.4 - 1.5 - 3 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3.

altura 20-25 mts.

Un padre incubando otros plena muda.

Vuelan sobre nosotros con un Kyva - Kyva
rónico.

En 1949 se destruyó la colonia de la cometa
general de caballos

Bajo colonia, infinidad de cometas

Nunca se encuentran el cura pero.

Popines y otros descendidos en el momento.

Neophila, ad. a 1^o - II - 53, Veguellina
del fondo. Uno ayer que.

P. otis ~ Detritus en el momento.

Rallus, ad. ad. de 10 igual en verano
que en invierno.

birds, apenas fondo bajo la potencia
(nido de agua). Todo el año en la mesa.

Podiceps ripidus 2 plumas invernales

Amurto, Mostrella igual que a
se muerto pero blanco del todo. cometas

Tamias ad. ad. y un huevo.
un ovario, huevo amarillo.

Accipiter nervosus.

♂ ad. huevo dorsal huevo ovario
y ovario. bastante ovario. huevo huevo ovario
huevo en la base de la cola y sobre los patas
anteriores.

Reys. - huevo huevo ovario.

Hieracetus fasciatus. Uno patas ovario
en Buapenta (Zonura) ovario ovario a
un huevo de huevo.

JAV

Phymosus pygmaeus. Colando uno
la tuerca, en invierno o invierno. Eba
el solo

Fulv. ciris = pautilla brata.
caudatus = " fino

Nido Torcas de Santibáñez de
Valdecañas, en la de Poniente

Myiurus pinnus. Nidobles del Pinar
Moral

Resaca la utria a 250 y las vander
a 500. Viene a cargar 203 el año.

Densip. folio E. puz. beryus.
No bastante podrido. Remiges en posición
larga. - Cation. cumplido en cabera.



19.20cm

2 crías de la
misma edad. a unos 4 años una de ellas
Cuentos 93 amstandolo de un Tiro.
Hay otros que se en Valdecañas del
Pinar.

antes había un nido más por el nido
ahora y uno en Villoria

JAV

~~Carduelis. Nido en aban. murales.
4 nidos. Puerto narvaja
Seruus. Nido Ph. 250 nros. proutus
murales de 6 nros.
anillo, rebato.~~

Syrax aquella reclama con pape. re.
hace salve reiterados. Voz en 4 pl.
Umpu Pasa con celo.

~~P. murales. construye en 2 nidos~~

Acridalis nido 4 n. y otra pared. 2 nros

Alcedo Nido solo no.

lunulo.

Ph. ochurus ♂ " 162 ♀ en el tejado de la casa

Preparas. En Hospita, comtina de Leon - bonina en las praderas de Puente de Orbigo.

Cobetes para amatarlos. Alcolera, hay grajos.

anidaron en Quintanilla de Solana de Leoro desde 20 años no anidan.

Hoye 15 años que no anidan en cimbras, abanos, albares, etc. y otros en raras.

Lamita del rio. Prob. anidan de nuevo a dormir hace 8 dias.

Auturus Moro. preguntas

Quiden Frente a S. Martin de Torres el SE del pueblo.

; frente al Marquesado de Huidobro.

Anidaba uno 2-3 años en Villanueva de Jarama.

Quise hacer comtina Leon a la Magdalena. a unos 2 Km de Leon. Mucha huida

Ph. ampers - 11-1
susacbe torquata ♂
Olimacris - ad. // de ad.

Phyllotritu. -
Pom. montana
P. sinensis
centricolus 1-11
Cettia.

Bufo Velupis.
Uta. sinensis
Sely. cornis +++
aberrans

P. cal. (P. cal.) 8
plagueus 5

Pt. orientalis // 11-1
Ch. dubius - 11-1
A. flava

Scopus
Hyla calceola
Pardalis - 11-1

Chloris
Galerda
E. v. hortulana x

Upupa 1
F. namayana ♂

Falco subbuteo //
Nisus pus
T. sinensis - X

Cinnyris de Java. In lignea
- ex ^{la} ~~expedativa~~. Sturus y igolindrimas

Trichostema - toza
Cinnyris - X

No hay Colinus en esta parte del río.

Chalcidion ~~malacoptera~~ en palanquillo de
orbejo.

En canal ~~cehalan~~ ~~palas~~ 2 parejas
de Sturus ~~al menos~~

Tom. + *caecus* *albicans*...
 bouelle - R. papa - X
 Sgl. *caecus* *lun.* // - X
 Pondillo. // - //
Pomelun. - //
Colligita - X - X - X - X - X
Purpurus X
Reptans 5^o
Miles X
Pian. X
Potomus (Z) *Redama* *Lodica*
Janus X

11. I.


E. *sinaxers*. *cur. cur.* *des* *Taccis*
mesetas en el pueblo

~~*Mun. caecus* *lun. stans*. ♀. 8-11. *condens* *de*
stans lo 3 *retinas* *externas* *de* *lun. miles*.
Pom. y *manchados* desde la 6. *Tipica*. en *parce*~~

Hirundo 10-11. *Puerta* 1-2 *dias* *st.*
Vulvas *construyen* *ahora*. *regiendo* *bano*.

Pardis // *fructus* *soto*

Tropidometes *notus*. *long* 275 *caes*
lucido *duo*. *qui* *oliva* *ment* *prune*
colera *idem*. *los* *mandib* *duos* *collos*. *del*
qui *oculos* - *verdens* *para* *noturna* *que* *tenere*
con *el* *limite* *coludo* *susp* *a* *int*. *de* *los* *colera*
 y *supante*. *los* *mandib* *mejores* *apertus*
se *colocaron* *en* *el* *ped* *ante* *emargin*.
los *lun.* *mejores* *en* *los* *intus* *de* *los*
labiales *ap.*



Insp. *Horus* *verdens* *en* *el* $\frac{1}{3}$ *del*
arepo. *donde* *empicaron* *recorcher* *que*
des *de* *la* *unidad* *de* *caecus* *y* *en* *la* *colera*
con *bander* *contra* *caecus*

Parosmo
Galeriella X-X
Lobandrella XXXX
Vernante, mica - 888

Cacti et frugibergus per

- 1^o Granos viejos ~ 50% (con piedritas)
 Pequitos blancos ~ 30
 2 semillas como manzano (concha)
- 2^o Gyltholpa I Huevo Luchillo
 insectas 1 tonto abeja
- 3^o Gyltholpa II Piedras
 Coleo ~ 6 (Elaterido cocchi)
 Partes vegetales ~ 35%
- 4^o heces verdes como de
 sabon en vaho ~ 1%
 Coleopt ~ 5 ()
 cut. animal 100%
- 5^o Vegetales 30% huchillo y vaho
 Coleopt pequitos ~ 50% piedritas
- 6^o Gyltholpa I.
 Coleopt del seto (Escudo de - etc)

50
2014
25
50
26
86

Valderandinas - Hovijps
Neophyn - ad
M. niguan - 1-1+ frugibergus.
Oc. oemulle - ♂
Riparia
P. montana
Petronia
Varellus 1/1 - Pareja pundo nto - 1 pundo nto
Mendps X
Colum. // // //
Pica //
Riparia //
T. totanus //
Civone //

Varellus, pundo nto // // // - 1/

JAV

Alameda E. Puyallup

Volobesandinas del Paríamo

Varellas - una para volar

Buzuellos 50 abarros a 50 ms
del pueblo. Suidan desde hace 3 años

Nidos.

$$2-4-2-7-6-3-4-2-2 = 32$$

$$2-3-3-7-4-3-2-3-2-3 = 32$$

Algunos nidos más fuertemente ocupados,
más en los cueros de la zona
con todos en los mismos direcciones.

En una tercera parte de los nidos, al
menos, hay juvenes que vuelan bastante
bien. Otro ~~grupo~~ grupo de juvenes de los nidos

cueros 35 ad al tiempo. Encuentros
ad. a 15 kms de la colonia

Keu - Keu agitando y dulce hace
una al volar, ¿goma piva?

Proceda de hijos.

Pato //

Sancton (Pog)

Vandher

Totales (4)

A Colonias de heras de Huejotepetl

1F-2F-1F-1F-1F-1F-1F-1F-1F-1F
 2FF-2F-1F - 3F-2F-1F-1F

15
 15
 15
 10
 15
 1

~100 entes

71
 26
 5
 102

A Piquete colonias Escudada

1A-1A-2A-2A-1C-1A-1A-1A-1C-1A-1A
 1C-1A-2A-2A-1C-2A-1A-1A-2A-2A-2A-1C
 5A-2C-1A-2A-2A-5A-5A-1A-2A-1A
 3A-2A-1A-2A

A1-1A-1A

Unos 180 mas de foto. pegando al mas,

800 jts formales coheteros
 tienen 4 chivos



de lado de Veracruz
 Ven pedregueros

Paranillo
 11-2-4-2

JAV

Exha. pubeo ray
Alcaram ray comi.

Souelles

M. Jama visto nois

Alaude

Calandrella

Otro visto

~~3. h. ~ 3 dias en el mismo
ante puestas.~~

~~al. Ni en junquero. Diana
7 dedos. p. 25 topm
de guiso con musculos.~~



Carbones (44 ♂ + 2 ♀)

+
Q. perelara 2 ♂♂.

t. t

T. totanus junto a charca, cotas

Junco duboisi

Podiceps nigricollis charca desecada, solo,
aroma en h. se ve carbonales,
larva nict. Un juv.

Turdid. virens junto a charca, una de 60

Hyle. Virens 3. se de noche melancolico
Lophus canus vuelta

Bana a nubes

Carbones se van deuto de 9 dias


Valladolid sitella 15-V-53

Species	Count	Other	Notes
M. l.	8-11		
P. m.	XXXXXX	X	
H. p.	XXXXXX	X	
C. s.	XXXXXX		
C. l.	XXXXXX	X	
T. m.	X	X	
P. d.	XXXX	X	
P. n.	XXXX	X	
P. l.	XXXX		
P. m.	XXXX		
H. p.	XXXX		
T. m.	XII - II - I - I - I - I - I - I		
M. s.	I		
M. a.	X		
S. l.	XXXXXX		
P. h.	XXXXXX		
G. m.	II ad		
A. l.	II		
C. d.	X		
M. s.	XXXX		

contorno

diploma. Al propagarse la cría de los pavos, los guelleros se han convertido en paveros, según me asegura don Laureano Díez Cansado.

Poptil negro con cabeza ondulada de blanco en Victoria



JAV

Estampas de la vida en Leon durante el siglo
X - Por Claudio Sanchez Albornoz.

Cap II - El mercado - pag 33.

... pimienta, grandes patos, queso, sicerá, y
numerosas gnellos que crían para el mercado
de Leon las gentes de una aldea vecina, Guel-
lens.

(En nota) El nombre de Guelarios; no se
olvide que Don Enrique de Villena menciona
los gnellos entre los viandos que se ven-
taban en su época; dice todo como un