

Valv. 1954.

30-IV-54 - Sur le distribution des poisons à Sobru de Bodou.

Baises.- Terrains à demi couverts de *Salicornia macrostachya* (quelque fois) *S. fruticosa*, avec peu d'eau (40 cms. au plus) et fond vaseux. Abondent des *Atherinae?* Ils sont desechés vers Juin - Juillet. (voir notes Trouche). *Gammarus*, etc.

Atherinae en bandos pequeños. Aquí pesca Egretta casi siempre y Sterna. Rana común.

Rubinnes.- Canaux le long des routes.

Canaux.- Vegetation de *Phragmites* et *typha*. Agua relativamente dulce. En el de enfrente de Sobru de Modon.

Poisson chat . . . 1 *Amiurus nebulosus*. Le Sueur.
Perche soleil. . . 1
Anguille 1
Tinca 1

Suelo fangoso, negro y podrido. Aguas inmóviles, con pocos o ningún *gaurmarus*. Rana abundantisima.
Cazadero de Ardea purpurea.

Etang de Fournellet - Angilla et *Atherina*. Muchos *Gammarus locusta* (es la especie más común) y bastantes *Spheronema hookeri*.

Escasas ranas, (2 cogidas Fournellet, cerca de *Salicornia*)