

Valv. 1954.

17-IX-54 - LA ROMANA - NOVELDA

Fringilidos - A las 19'10 h. se tiran a un pino, tres evolucio-
nan largamente en bando cerrado, unos (80).

Phylloscopus - 2 ó 3.

Riparia rupestris - Bastantes en el tercio o mitad superior del
cortado.

Picus - Uno x 6.

Alectoris - x tres veces, en el mismo pt. y solo chacha y otra
casi todo el canto.

Streptopelia - Un juv. muerto por rapaz, probable gavilan, en
en un pino.

Hieraetus fasciatus - El 17, 2 sobrevolaban la peña, a las 18 h.
El 18, se quedan a dormir en el pinar de lo alto, donde
veo plumas el 19, bajo las ramas peladas de los pinos
carrascos, a alturas de unos 4-8 ms.
Ese día entran a dormir en la grieta del muro, a unos
30-40m. del pie. Hay allí una higuera en la grieta, en
rincón recogido del viento, que es donde duermen.

Se cogió un ♂ ad. (veo restos) con liga a med. VIII, la ♀ ha
vuelto a aparearse. Encontraron numerosos restos de lagartos,
culebras, etc. en el hueco.

Ese águila vomitó el 1º día:

- 1 Conejo
- 1 lagarto
- 1 culebra.

Los conejos no abundan y solo en las laderas, que parece ser el
cazadero del águila.

Este año anidó a unos 700 ms. del dormitorio, en un hueco de otro
cortado, pero abandonaron los huecos porque se les tiraban piedras
desde arriba.

Hieraetus fasciatus - Informe de guarda.

Se empareja enseguida. Una se rompió el ala de noche y la
otra escapa. A los 4 días se mató otra y siguen aun allí.
Otro año se mató ♀ y quemo un pequeño. No datos segu-
ros. Anida ^{de} siempre. Se mata una concun conejo. En el
nido, sobre todo lagarto y culebras. Se tiró un día a
palomas. Come placentas y cabritos. Una vez comiendo
un zorro pequeñito, La mayor parte de los años se des-
truye el nido.

18-IX-54 - Novelda - Falco subbuteo - Traen 2 juvs vivos en plumón y plumón-pluma.
Ver Diario gral. de especies. (Puso 3h. y solo quedan estos 2 pull. etc).