

Almería, salida a 0605 h.

C. corax - 3 antes de Sorbas

Upupa - 1

rastrojo

M. migrans - 10 a las 0810 h, volando circulos sobre barbecho a 5 km de Huerca-Overa.

Coracias garrulus - , 1 almendros entre Lorca y Totana.

Alicante. De 1120 a 1200 recorrido de los jardines a unos 100 m. de la costa, entrada S. del Puerto, entre palmeras, suleo pelado y un jardin con uña de león en busca de Lacerta sicula que no encontramos. Buen sol.

En la salida de aguas residuales sobre el mar, aguas sucias y movidas, extremo malecon de piedras con muchas huras de Rattus anoto.

Chlidonias nigra - unas 60, de ellas i/2 ad. con mucho negro, resto juvs.

L. ridibundus - unos 20

L. argentatus - i juv y 1 ad puerto.

Lacerta hispánica ? - 1 juv palmeral de rayado dorso, no cola azul, pero creo de esta especie.

Alicante - Benidorm. - El cambio de paisajes notorio. En las laderas peladas crecen almendros, y siguen Ceratonia, (que comenzaron en Carboneras, visto hace dias). Pasamos Benidorm ( primera vez que lo visito)  
( Murcia- Alicante - Tras de dejar al W. una sierra magnífica con grandes cortados desnudos, tipo Gypaetus, a la altura de Orihuela, entramos en llanuras Tipo Nijar, con palmerales que recuerdan los de Elche, y ya a partir de Orihuela, extensísimos. Es un medio muy modificado pero profundamente estepario, lo más acentuado - excepto cárcavas - de este tipo)

Cabo de la Nao - Llegamos sobre las 15 h. Subimos al cabo, con enormes roquedos coronados por vegetacion almohadillada casi entre calizas dolomíticas muy erosionadas.

Galerida ~~hispanica~~ - x


Apus pallidus - Unos 15 acantilados, cazando generalmente entre las bahias de estos y a gran altura - la del borde superior - y a veces sobre tierra. Son de un color arenoso Gyps, con alas más oscuras, y realmente muy pálidos. Heridos, vitalidad enorme. Uno herido que sigue volando es perseguido por sus compañeros, al menos dos en sucesion, que le ven el extraño movimiento de alas. escapa picando.

Falco peregrinus? - Inf. pescadores que anida aqui, y en cabo de S. Antonio, pero no logramos verles.

Larus argentatus - Unas 10 hacia el N. volando bajas, todos ad. Dicen anidan aqui.



CORTE SARRION - MONEGROS





## SARRION

15-VIII-65. Tras de dormir en llegamos a las 1030 a Mora de Rubielos. Salimos de esta por terreno monticuloso de arcillas rojas con caliza superficial (muros casas y ~~hampós~~) y gargantas calizas en cañon tipo leucura, pequeñas. Cultivos de garbanzos y cereales, almendros en las colinas, y olmos y nogales? carreteras y sotos.

Pica - Enes solitarias colicartas, proeb plena muda

Galerida sp. - 1

Streptopelia - 1 chopos soto.

Cruzamos rio Mijares. Entramos en monte bajo de carrasca con encinar testigo sobre arcillas rojas y caliza. Luego reemplaza a encina Juni-perus aislados (prob. edafico)

Oe. hispanica - 0

S. torquata - 2 ♀ y 2 ♂

Entramos en sierra rocosa con encinar en lastras. Luego comienza el pinar en manchas. A 1.100 m. denso pinar, que a 1300 es de pinos enormes y muy denso entre roquedos.

A 1480 m. nos paramos entre 1130 y 1230 h. entre el pinar, examinando ladera con arroyo seco al fondo en el que surge fuentecita acondicionada con bebedero de tronco hueco.

Lacerta hisp. - 4 ad más 2 juv, capturados (alcohol) y 5 ♂ y 2 ♀ vistas

L. lepida - 1 juv bajo troco fuente.

Psam. algirus - Ad enorme muy gris garganta amarillo-verdosa. - juv listado.

Parus ater - Bando cobrado juv.

Sylv. communis - 1 arroyo

Picus - lomas bebedero

Strix aluco - id id

Seguimos para Vega y Alacalá de la Selva, pasando por el colmado de 1600 m. que según indican sirve límite distrib. eps pino. En Alcala de la Selva.

Sciurus vulgaris - un juv. cobrado, muy pardo-castaña-cremoso.

Coturnix - Casi todos los cazadores, llevan racimos de unas pocas. Es el primer día de caza.

Iniciamos subida a lo alto del monte, que la furgoneta no puede escalar despues de muchos malos pasos. Seguimos a pié, entre Pinus sylvestris sin sotobosque, largo ladera y cortando arroyo.

A. Uites obstetricans? Renacuajos en todos los pozos. Dos recién metamorfosados, uno en alcohol.

Lacerta hisp. - Ad y juv. alcohol

Apus apus - unos 12 grupo, cazando garganta.

E. palumba - 1 muerta por cazadores - otra

C. corone - x x

Descendemos valle de Alacalá de la selva. En los prados junto al pueblo y en tierras altas inmediatas anotamos.

Oe. oenanthe 1-4-3-2-1. Cobrado ♂ ad a media muda.

Falco tinnunculus - 1

L. excubitor - 1

Prados casi norteños con muros piedra y matorral

Pica - 1,1

Passer montanus - unos 20 triguil inmediato.



15-VIII-65, Alacalá de la Selva - Gudar (sigue)

Saxicola torquata - unos 8 juvs y algun ad.

Salimos ya tarde de Alcalá de la Selva. buena parte entre prados verdes y pinares, donde cazan Coturnix doquier. Cruzamos río Alfambra camino de Gudar.

C. corone - 5 - 2 - 3 prados y ladera

Pyrrhocorax - 3 alto risco calizo, ladera de Gudar

Serinus - Común.

Gudar. Pueblo en lo alto de la ladera, casi dominando el llano superior de los Monegros, con roquedos inmediatos

Phoenicurus ochrurus - 1 entra a dormir casa, hueco piedra pared

A. apus - varios

Aquila chrysaetus - L juv ya completamente emplumado, podrido y sin patas ( la prohibición no hace nada por ellas - cogido hace unos 10 dias por pastor en el risco NW. Con piedras logró se tirara nido y cayó volando mal. Anida allí desde tiempo inmemorial.

Hay otro nido en la Peña Palomera de Santa Eulalia, termino de Torremocha de Jiloca, en el camino a Teruel.

Informes Gudar -

(C. lupus) - Los más viejos del pueblo no los recuerdan. Uno de 65 años recuerda que su padre le contaba de tiempos del abuelo ( ver luego, en Alacalá de la Selva)

(Gyps) - Vienen pero no anidan

(Neophron) - Vienen de S. Miguel en S. Miguel, para comer los excrementos de los tereneros recién nacidos entonces.

(Zobros, Tajugos, Fuinas, Turones, Ginetas, Paniquesas, Vibras, y Chalcides hay)

Noche en la fonda de Gudar, con vieja "amable" recia aragonesa

16-VIII-65. Salida 0900 h. para la cima, lado N, a cortados del águila por mal camino. No podemos llegar a la cumbre - no lo intentamos - con el coche. Llegamos valle abierto con laderas en dos pisos por cortados calizos decentes y pinar denso entre ellos aunque no en cimas. 2 fotos color.



Fotos color 1-2.

Lacerta hisp. - 4 ad roquedos

Garrulus glandarius - unos 6 pinos

Apus - Alguno vuelo.

C. palumba - x

En la zona alta, monte bajo almohadillado de enebro y lastón picante. Matas de Berberis y sabinas (J. phoenicea?) rastreras de hasta Ø 3 m. Cima entrellana, trigales con setos piedra, Berberis, algún Cra taegus, Phoenicea y communis.

Oe. oenanthe - 1-3-1-2

Sylv. communis - 1

JAV

175



16-VIII-65 - Gudar - Alcalá de la Selva (sigue)

Serinus - 2-~~1~~-1 ~~observada~~, en matorral, 1-2-1

F. colebs - 2-1- cobrado matorral.

Corone - 4, y x ladera

Pyrrhocorax - // y //

Emberiza sp. - varios

Apus - pueblo

Recruzamos Gudar (fotos color 3 x 6, a 1040 h. y seguimos hacia Alcalá por ladera igual a lo de arriba, excepto valle verde y norteño.

Al llegar río Alfambra ascendemos por ladera S, fracasando en empeño de alcanzar la cumbre en el coche. Llegamos buen arroyo de Algiroides entre Pinus sylvestris, y no encontramos ninguno como de costumbre. A poco fuerte chaparrón. Bueva bajo piedra y goteras, granizada impresionante hasta 1415 h. Regreso a coche. comemos algo, y volvemos a cazar al arroyo, hasta que vuelve a comenzar lluvia.

Bufo bufo ? - 2 juv. alcohol uno y muchísimos renacuajos río,

Lacerta hispanica + Censo un rato en cauce arroyo 8 ad mas 26 juvs. Buscamos orilla entre piedras, troncos etc. lo que sería buen Algiroides-biotop. sin ver más que Lacerta. Al regreso otras 20 más observadas. Apenas ha terminado lluvia y ya salen, aquí y en la ladera entre troncos pinos. Muy fáciles lacear, muerden con furia antes el lazo creyendo comida. Los juvs tendencia neta a andar entre hierba. No coloren azules cola detonantes como en Almería. Unos 8 ad alcohol.

Coronella - Una bajo piedra seca después de lluvia, junto a torrente, enroscada a 1300 h. Vomita una Lacerta hispanica sin cola Alcohol.

Troglodytes - 2 juv cobrado.

Mot. cinerea - Fam. colicorta

Falco tinnunculus - pareja sobre pinar baja.

Parus ater

Aegithalus

Parus cristatus

F. colebs

} Asociaciones en pinar, 3 puntos

Sobre las 1700H llegamos a Alcalá de la Selva. Hablamos con el viejo cazador que acaba de regresar de caza

Eusebio MONFORT Alcalá de la Selva - Teruel

Quedamos en escribirle para preparar excursión montes. que parece conocer intimamente como furtivo y alimañero. Vemos allí:

Sciurus vulgaris - 2 juvs y un semijuv, muy café leche, lo mismo que el que vimos ayer, los juvs, y el otro negreando sobre los lomos. Dos vivas en una jaula. Mata muchas.

Genetta - 1 tipo oscuro como las de Cazorla pero más pintada

Felis sylvestris - ♂ y ♀

Martes foina - Compramos piel de junio 1964, esta localidad

C. palumba - 1 cobrada

(Informes de Eusebio -

Canis lupus - el último se mató hace 70 años en la loma del Asno, inmediata al pueblo, detrás de la Fuente del Cerro, por Manuel de la Torre, con escopeta de pistón. Era una loba

Martes martes ? - Fuinas con la garganta roja se han matado en Linares.

Capra pirenaica - En los puertos de Valdelaceite hay algunas, las mismas que se corren hacia Tortosa, que se ven en mayo en los "cinglos"



16-VIII-65 Alcala de la Selva (sigue, inf. E. Monfort)

(roquedos asperos), Cuando más ha visto han sido 7 u 8. Ahora no dejan cazarlas. En la Peña del Buitre.

Gyps - En la Peña del Buitre, termino de Aliaga, a orillas del rio Alagon al otro lado y aguas abajo del pueblo (quiero entender) hay una colonia.

Bubo y Astur palumbarius, sabe donde anidan todos los años

A las 1820 seguimos ruta hacia Sarrion para dormir allí. Nos sorprende la granizada con piedras de mayor tamaño que he visto, unos 4 cm Ø. Los arboles se desnudan, los arroyos rompen y tierra y granizo cruza la carretera.

17-VIII-65 - Sarrion-Valencia-Jumilla-Almería. Todo el dia.

A 0915 h cruzamos entre Sarrion y Puerto El Rabudo paramos altos con encinar testigo y matorral (piorno, lavandula, juniperus phoenicea) almo hadillado a 9.000 m. altura, y 1000 m. Niebla y recién llovido.

Oe. hispanica - un macho en Barracas.

A 0945 descendemos El Rabudo desde 1125 m? hasta 460 en que llegamos a Jerica, en dos etapas marcadas

- Zona alta - Matorral <sup>no</sup> almohadillado y bajo, bien distinto del de arriba, encinas testigo, y cultivos intensos de almendros y huertas.

- Zona baja - Todo cultivado, cañas, olivos, huertos, nogales y frutales.

Alto en Jerica (Castellón), y seguimos bajando hasta SEgorbe. A unos 4 km antes de este encontramos el primer pinar P. halepensis, a 390 m. pero en las crestas se ve pinar quizá a 450 m. Siguen nogales, frutales etc.

Entramos llano litoral camino de Valencia, y volvemos a verla ALBUFERA, lo mismo que a la ida. Es sabado y está superpoblado de valencianos y turistas. Bellas vistas desde el E. sobre la albufera, y por algunas carreteras en que entramos. Anoto.

Clidonias hybrida = ! 3 posadas en cables y manteniendo bien el equilibrio !. Centenares sobre los arrozales ( ya vistos Gullera etc al ir) y albufera.

Egretta garzetta - uja docena en 1 pt. y algunas más lago

A. purpurea - Media docena.

Ardeola ralloides - Al menos 6 ad. cazando en marea baja ? sobre islitas barro-herbosas, algo separadas de Egretta.

Lacerta hispanica - 2, alcohol, muy rojizas.

COLONIA DE GARZAS en el carrizal inmediato nos dicen los pescadores. No difícil excursion larga de investigacion aquí.

Ascendemos de la costa a Jativa, con algunas colinas de Pinus halepensis. JATIVA - ALMANSA remontando el valle del R. Cañoles, amplio e intensamente cultivado en terrazas, con olivos que ascienden hasta 1/3 o 2/3 de las laderas y viñas, encerrado entre las sierras calizas de Enguera (N) y Grossa (S) desforestadas y con escarpes bajos o algun P. halepensis, en algun lugar cresterias y agujas. Ceratonia remonta por lo menos hasta Mogente, y ~~ya~~ había grandes cultivos a la desembocadura del valle sobre la costa. Pasado MOGENTE el valle se estrecha



17-VIII-65, (sigue)

entre S. Enguera y quizá S. Lacera, con pinar denso y grandes cortados calizos tipo fasciatus. Bajo el puerto de ALMANSA en valle, coronado un estrechamiento, se ensancha con antiplanicie cultivada, viñas, olivo y encinar relicto. El pinar sigue cubriendo las crestas entre unos 400 y 500 m.

Subido el PTO DE ALMANSA, con 700 m. entramos en paisaje monticulado y con colinas rocosas de Pinus, muy cultivados los bajos con cereales, olivo y viñas, anunciando ya la meseta. En Almansa, ya tipo albaceteño, cruzamos hacia el S. los llanos de Chinchilla hacia Yecla. Al W de Almansa se cruza de NE a SW el pico del Mugerón, con sierra caliza escarpada. Para mí todas estas sierras, la de Crevillente que dejamos al NW de Orihuela, las de Novelda y Elda (1954), las de Jumilla y las que se cruzan entre Hellín y Chinchilla en Murcia-Madrid, son de un mismo tipo ecológico con dos facies (Pinetum y desnuda) y dos pisos: bajo estepario de Gal. mal., cultivado con olivos etc. lindando o dentro del Ceratonium, glto con encinar relicto, quizá ahora Pinetum.

A las 1515 h. Almansa-Yecla a través estribaciones de Altos de Chinchilla orientales. Ascendemos hacia el S. por meseta cerealista desforestada excepto escasísimos bosquetes (soto caducifolio) de hemosísimos olmos y encina relicta, por colinas redondeadas de acilillo pedregosas a 850 m de altitud. Algún viñedo aún.

C. corax - 1

Alectoris - Fam, cobrados 2 juvs (piel)

Llegamos a los 900 m. en llanura cubierta de carrasco y encina baja con vallonadas de cereales.

Oe. hispánica - 1-07

Gal. malabarica - pareja

Descendemos algo, a 850 m. con algú de encinar en zonas bajas y entramos en corto pinar ya en Murcia, descendiendo suavemente a 750. Entramos antes de Yecla en gran llanura árida, con viñedos, cereales y escasos olivos en la parte baja de las laderas estos y no en el valle, quizá por inversión temperaturas invernales, como ya habíamos visto antes. Las laderas desforestadas llevan monte bajo con alguna viña. Llegamos a Yecla. Pasada esta, descendemos la rambla de Jumilla entre las estribaciones de S Salinas al S y S. Cabras al N. Sigue el olivar y viñas entre crestas poco forestadas de pinar, con riscos. cruzamos gargantas calizas con retos pinar a 850 m. entre las estrib. sierra Cabras y volvemos a valle de Rambla Jumilla en abrupta bajada hacia los llanos olivareros de Fuente del espino. Hasta JUMILLA sigue al W la crestería con pinar de Sierra de Cabras abrupta.

Entramos en la carretera general. Visitamos Monasterio:

Gypaetus barbatus - Fué envenenado con estriquina puesta a los zorros y murió junto a la fuente, no cobrado a tiro como dijo el Padre

Genetta - 1 huerta del convento,

Las bajas crestas abruptas con pinar en las cumbres siguen a los 580 m. de altura cerrando el valle de viñedos cereales y olivar. Cerca de CASAS DEL PUERTO, en una venta, (Venta de Germán) preguntamos a los Cazadores:

(Aquila chrysaetus y H. fasciatus - Anidan en la Solana del Sopalmo, frete a la venta; en El Carcho, cumbre aislada con mucho pinar y gran cortado al N. con acarreteras; en Piedra del Aguila). Es zona de picachos ya tipo Gypaetus casi, por la dif. de nivel entre montaña y llano, que podría llamarse Gypaetus-fasciatus como tipo.



17-VIII-65. JUMILLA - ARCHENA (sigue)

Dejamos al NE la SierraxPiza que separa del avlle del Vinalapo donde está Novelda !. Toda la zona está sembrada de Sierrecitas abruptas (datos septiembre 1954) con Aquila y H. fasciatus por doquier.

Sigue el valle con laderas de esparto, que no sé donde ha empezado, coronadas de Pinar. Seguimos bajando a llanura de 300 m se altura, amplio semicírculo de muy abruptas al E., que debe ser el valle de la Rambla de la Raja. Entramos carretera gral de Murcia a unos 30 km de esta, y descendemos valle del Segura, gran cubeta con mucho arbolado de frutales y naranjas, de bordes con cárcavas. Desviandonos al S. pasamos Archena, cruzando el Segura entre naranjos tupidísimos y cárcavas tipo almeriense, ascendiendo luego hacia Mula por las laderas abancaladas con escasos almendros y olivos hacia MULA. Coronamos a 425 m. en llanuras aridísimas con cereales, bastate quebradas, pasando gargantas con cereales a un valle rodeado de cerros con esparto y colinas, algún cantil.

Nos detenemos en MULA donde vistamos a  
D. Martín Guillén Perea  
calle F. Baiart 2. Tº 11. Mula (Murcia).

Nos enseña diseado y cazado allí:

H. pennatus - ad blanca

B. buteo -

F. peregrinus - 0 ad brookey típica, VI-VIII-64, que quizá nos dé.

Bubulcus - 1

Picus viridis - 1 bigote negro, cresta roja.

Sciurus vylgaris - I ad que para mi es semialbino, con cara blanca y manos-pies, pelos blancos cola. Ofrece proporcionarnos alguna si le escribimos.

Informa que en la sierra Espuña, que conocen muy bien todos aquí, se puede llegar bien por carretera y es interesantísima por rapaces.

Seguimos MULA + LORCA, por plena sierra de noche. Creo es carretera preciosa.

Vulpes - 2 juvs juntos cruzan sobre 2200 h.

Llegamos a Almería, apretando firme al final, sobre las 2 o 3 mañana.



Primer día (Yede)

(Sims fulvus)

Wids de bunter leonado con la madre dentro. Dos parejas más volando.

*Corvus ptilocorax* con ruido

*Corvus abaculus* (tres)

Pigeo europeo repetido: un ruido en el túnel y 203 parejas volando

*Ferinus hircinus* cantando en los dos lados del túnel  
florante leucura (1)

*Troglodytes naumanni*, 5 ruidos en cortado

" - *tilimulus* varias parejas con ruido

*Corvus monedula*, ruidos con ruido

*Alectoris ufa* varias parejas y un ruido con 12 huevos que me parecen de perdiz de montaña. Color crema con manchas muy poco marcadas y uno sin ellas.

florante hircinus (volando)

*Ferinus hircinus* 2 parejas en el lado del cortado

*Carduelis carduelis*

*Auriparus flaviceps* (1)

*Bombus hortulana* 4 en un modo pegando a fillos

*Neophasia versicolor* 2 ruidos desde la fuente

*Bubo dauricus* un ruido por Mister Sims

*Columba de rock*, varias cantando.

*Petrochelidon lunifrons* varias en el convento y en Yede

*Otus scops* convento.

*Bubo dauricus* "



Segundo día. (cavatero de Galos)

Sipus fulvus, <sup>Maians</sup> cuatro o cinco nidos, dos con los nidos.  
Cyanopice caenea, en que no bueno por el valle y la ladera.  
Pigeo un pequeño nido, una pareja haciendo nido y otros nidos

Talco nanumani, algunos volando

Columba roqueus (no nio)

Ploceate leucante una pareja

Hoenate leucare (en duda)

Motacilla cinerea 3 parejas

Fanius, <sup>senator</sup> uno sin distinción

Geinus 203 parejas

Alectoris ufa 3 parejas

Coracias pimbocora algunos con nido

Corus monedule con nido

Barde (Quinterilla del Coco)

Coracias garrulus, 506 individuos

Talco nanumani, nido

" timunculus (1)

Lynceus epops (1)

Botaurus minor 2 nidos con nido

Ciconia ciconia, cuatro nidos, con nido

Streptopelia oenanthe nido con huevos, con nido

Zuberica cithus (

Alectoris 2 parejas

Día bueno (Quinterilla del Coco)

Chelidon nidos en nido

Zuberica cithus (4)

Sipus (1)

Alectoris ufa 203 parejas

Pice nica 203 nidos

Pigeo pequeño <sup>nido</sup> Barde

Coracias pimbocora

Corus monedule

Sipus fulvus nido

Hoenate leucante

Motacilla flava

Motacilla cinerea

Carduelis carduelis

Floris olivacea

Pigeo pequeño <sup>nido</sup> Barde

Sipus fulvus en nido

Neofren pernoctes 2, 1

Milvus migrans 1

Pice nica

Coracias pimbocora

Corus monedule

Corus corax

Alectoris ufa 203 parejas

Talco nanumani

Pigeo pequeño <sup>nido</sup>

Aps apus

Coracias garrulus una pareja

JAV



Día malo (caracteres de Salas)

- Fins fulvus, quere en unas rocas. Otros muchos  
Neophen pernotes dos muchos  
Pipilo megalonyx varias con nido  
A. mus melba doce vienen venidos, algunos entres en huecos  
H. oenanthe h. oenanthe dos otros parejas  
H. oenanthe hispanice una pareja  
Lanius senatus una pareja  
Motacilla flava, dos nidos (4.6) huecos. Otros parejas  
Musciapa megalonyx una pareja  
Sylvia communis una pareja  
Carduelis carduelis varias parejas  
B. b. b. una pareja  
Monticola saxatilis una  
Columba palumbus varias nidos well  
M. l. l. ubi nido well  
C. c. c. bastante  
B. b. b. una pareja  
F. f. f. " "  
T. t. t. nido well  
T. t. t. h. h. h. dos o tres parejas andando  
P. p. p. quitando  
A. a. a. uno o cinco pares  
L. l. l. cantando  
C. c. c. nidos  
F. f. f. pareja con nido