

Notes. P. Secundas.

Hemicidus austriacus. Illegible.

- 9-IV-31. (postea desap.)
25-III-32. " "
25-III-33.
12-IV-34
24-III-35
9-IV-36
8-IV-37
26-III-38
25-III-39 (desaparecio algunos en los Piqueros)
5-IV-41
3-IV-42

Cebididae

- 26-IV-31. Desap.
10-IV-32. "
9-IV-33.
11-IV-34 ?
13-IV-35
18-IV-36
18-IV-37
9-IV-38
med-IV-40
5-IV-41. ((20st) el 16. g. nivis)
28-IV-42

Illegible.

7-IV-43,
24-IV-43.

Oreocetes.

- 30-IV-31. Desap. 6-V-42
30-IV-33
3-V-35
3-V-36
3-V-37
5-V-38.
10-V-39.
5-V-40
5-V-41

Illegible.

C. mellea

- 23-IV-34
8-IV-37. (Tunel Yedra)
28-III-39
14-III-42

Neophron. Illegible

- 26-III-38
22-III-39
14-III-41
18-III-42
14-III-43 (Visto !)

JAV

JAV

Siguien lais,

Ceros. — Torrecilla de Cameros hacia 1945.

Jabalies — S^o lebollera, quedan pocos.

Toros — Algun toro bestial. S^o lebollera

} hayedo.

Notas del Museo de Silos.

en Noviembre de 1953. Estas notas preceden

- a/. de las etiquetas de los fósiles; se indica M N ejemplar montado y sin etiqueta y P+ en piel y etiquetado.
- b/. de las listas - catálogos de la biblioteca - no consultados a fondo.
- c/. de cartas, notas etc. del P. Santos Domínguez que me preparó todo el material en piel y mucho montado.
- d/. de informes del P. Santos, que lo fie a la memoria, por lo que hay muchas inexactitudes y errores.
- e/. de las cartas de M. de Charnigny a SG, y de SG a Charnigny que se intercambiaron en 1934 a propósito del envío de huevos, las muertes que estan ahora en la col. Charnigny figuran (como sus comentarios escritos) con (ch).
- f/. de la actual colección de huevos, etiquetada por SG, según los informes que le daban los colectores de los pueblos a quienes compraba los ejemplares, y en algunos casos, con datos detallados de S. D o algún otro puebla, en nidos dirigidos por ellos.

SD = P. Santos Domínguez

P = puesta.

SG = R.R. Santos González.

(ch) = Charnigny.

- g/. algo de inf. descriptiva de corredores, fortines y barriadas.

Los fotos los hizo el P. Florentino

Hizo una buena colección de Micromamíferos en piel, con ejemplares del extranjero.

La biblioteca zoológica tiene el Miller, con todos los depósitos del Museo Inst. de los Lépidos (Mamíferos y aves) y bastante americano de entomología.

Hay correspondencia con G.S. Miller, Cabrera, Oldfield Thomas, Boucard, a quienes se mandaron ejemplares a 12 de Lépidos. Se juntó

los nidos de reproducción de Norberto González Salas, que el

British Museum. (subvencionados por Oldfield Thomas, que preparó
 la colección de Miller). Parte de los mamíferos fueron vendidos a
 el National Museum. de U.S.A. y otros a su Mus. italiano,
 algunos casas comerciales. Ha hecho cambios con otros monasterios,
 de la orden.

los localidades citadas por SG e Ch. son.

SL	A	# Liles	a 1000 msnm sobre el mar	y 52 Kms. de Burgos.
PN	B	# Peñacobre	.. 1100	y 5 " " Liles.
HC	C	# Huipón de Cerezo.	1100 s.m.	y 5 Kms de Liles.
CC	D	# Castrocerme.	900 s.m.	y 10 " "
PR	E	Pedrera de Río Ubel	800 s.m.	74 Kms de Liles, 3 Kms de Verdugos y 17 Kms de Burgos
CR	F	Castroillo de la Reina	1200 s.m.	30 y 57 de Burgos
HR	G	Huerta del Rey.	1000 .. 25	y 82 .. "
AS	H	Quarzo de Salce	950	10 Kms. de Huerta del Rey y a 82 de Burgos
PB	I	Puente de los Barruecos.	1080	70 Kms de Burgos.

(1). Ch. dice no veía fuentes de agua.

Cooperantes. Fr. Laurentino Saenz de Buruaga.
 Fr. Alvaro Rodriguez Gouratez.

Nuestros Museos Silos.

11

Cornus coronoides hispanus.

Cabido. ~~C. c. hispanus~~.

Lt. 640, a 412 (yo nudo 424), C 240 (yo 217), E 44, 1027
T. 85 C. 78 G 2 Montado.

Dibujo del hst. culmen medido en linea recta.



P. 1/5 Huerta 15-V-34 (tier triste, il s'agit
s'aus deute d'une morte de naufrageusement.
Il est vrai que C.c. peut souvent tomber en
Espagne, dans le centre). Rocas, 14 m. (ch).

le viro en silos.

Es comùn en la region (sg).

C. cornix. Figura lista por envio SG contiene confundido con Coloeus.
C. corone. Inv. MN. (Bennis dice hay uno en el Museo de Madrid).

P. Huerta 24-VI-34. 3h. Rocas. 9m. (ch. se extravió).

" 7-V-34 9h. Pinos 14 m. (ch)

" " 3 " " "

Corticocinira 2-V-34. 3h. Genoveses 7m. (ch)

Hortioria del Pinar 3-V-34. 2h. pins 12. " (ch)

Castillo 26-V. 4h.

" 20-VI-34

Huerta 31-V-6h. diafora, 2 mrs.

" 7-V 4h

Periacoba 22-V 3h. (dijo dudoso. Seguramente no fresco)

les vi en silos.

C. Fringillaeus. 1 MN.

SG dice que el 14-IV-41 vio un bando entre

Silos y Santibáñez, q. que vienen a la Bellota, Estallo AS. con Torcaces.

No tienen apelos. (Inv. SG). Pero han moltísimos más abajo.

Coloeus monedula 2 MN, 1 juv MN. tad Pt.

P. (ch). Silos 4-VI-34 4h viejo marrón 5 mrs.

" " 19-V 4h

" " 14-V 3h

} Prot. partes incompletas (ch).

Tiene otras partes, no se listan SG.

JAV

P. S. Santa Bárbara.

Ciceronia lengua

26-11-33,
1-11-34
24-11-35
12-11-36, (la otra el 18-11)
7-11-37
25-11-38.
10-11-39.
8-11-40

15-11-41
15-11-42

27-11-43
27-11-44

Visto días ver el 1-11. Marchar, se marcharon 12-VIII. Quedó mi hermano

Funes II-53

Cucarillas 1^{er} cuarto.

18-IV-31
18-IV-32
15-IV-33
16-IV-34
15-IV-35 (8-IV?)
1-V-36
18-IV-37

22-IV-38

22-IV-39

20-IV-40

23-IV-42

(Hinopir).

22-IV-38

22-IV-39

20-IV-40

23-IV-42

(Hinopir).

22-IV-38

22-IV-39

21-IV-40

26-IV-41

23-IV-42

-

<p

Gamulus glandarius 2 MN.

Silos.

2/2

P(ch) } Gamulus glandarius

Puilla-Bermejas. 10-VI. piso 5 h. pin 2 mts. (Ch)
Huerta 20-VI 4 h. (Ch).

P. Huerta 31-V-34 3 h. (prob. de este, pero quise de Pica).
En los viveros silos - merete leñazo y Vulturoides. presunto comis.

"Cyanopice cyanea
" "ameurado".

Falta el epíptilon. los ojos y los pico comis.

Castillo. 10-VI 2 h.

" " 7 h

" 2-VI 6 h

" " 6 h

Huerta 18-V 7 h

" " 6 h. piso. Palos y plumas

" 20-V 6 h

" 18-V 5 h

" 18-V 5 h.

Castillo. 10-VI 7 h

Puilla 20-VI 6 h.

Huerta " " 6 h.

" " " 6 h.

" 9-VI 7 h. piso 3 mts bastante incubados

Puilla-Bonuelos 21-V. 6 h

Castillo. 10-VI

Puilla de los Barruecos. 20-VI-34.

Huerto 3-VI-34. 3 h.

Castillo. 3-VI-34 4 h.

Huerto 3-VI ~ 5 h.

" 3-VI 5 h.

" 3-VI 4 h.

Castillo. 3-VI 5 h.

" 10-VI 2 h.

" 10-VI 5 h.

los viveros. Maternal.

(Ch, heterogeneos
Roble hoja mezcla.
Tiene 3 huevos de
Semilla y cree que
C. cyanea come hoja
joven & varie
color, toques et
volume ")

ch

P. que lleva piso metálico
algunas nubes.

en silos

(Llegó tarde.) acababan de llegar para hacer el cierre el día que
los vi. No les conocen criando salvaje, pero no salen noche. Ver nota viernes.

Huenes. (Ch. - Chonigni). M = Museo Isletas.

Cornus cerasifera. Miqueli. — 1/5 Huete 15-V-39 (très tardive,
ch. { il s'agit sans doute d'une forme de renforcement. Il est vrai que le
pouls devient très fort au Esp., dans le centre (ch.), Rocas 14 mm.
— Voir 58. Mus. 763

ch } C. coronae. Huerta 3 h. Rocas. 9 mrs 84-VI-34
 " " 7-V-34 4 h. Pinus 14 mrs.
 " 7-V-34 3 h " " mrs.
 Centrocerina 28-V. 3 h Generier 7 mrs
 Huerta del Pinos 9-V. 2 h. Pin 12 mrs.
 Cortijo 28-V. 4 h.
 Petrócorne 22-V. 3 h
 Huerta 38-V. 6 h. chaperone 2 mrs.
 Cortijo 20-VI 3 h.
 Huerta 7-V 4 h. (ultimo díadero).

ch { Ph. phy. Huerte 24-VI 4h; Pin? 10ms. (L'nidicotylie puis est nivéale ch)
(ch. en date 2-VIII dice "cruidement P. greculus")! peu de
puis deux autres indistinguables).
Silos 23-IV-36 4h.

Coloces.

ch

Silos 6-VI 4h
" 19-V 4h
" 19-V 3h
Vie
Silos n° 58 ch, no en liste S.
" 19-V-34 3h
" 19-V-.. 3h
" 19-V-34 3h,
" 20-V-37 4h
" " " 4h
" " " 4h
" 17-V-37 3h.
" " " 5h
" " " 4h . inculcades 3-4 dies
" " " 4h
" 20-V-34 6h.
" " -37 4h.
Huetos 7-V-34 2h (hug)
en cortes al P. saturno.)

vieux nuvz. 5 nuvz.

Prob. nuvres incomplètes (ch)

P. p. melanotus.

2 bis

Huerte	20-V	5h	
"	26-V	5h	
Petrazobre.	11-V	8h <u>zorre</u>	
Huerte	20-V	7h. <u>zorre</u> . (Un œuf bleu, ce qui arrive aussi souvent dans Pica. ch)	
"	"	7h.	
Cortillo	24-V	6h <u>chup.</u>	
Huerte	20-V	6h <u>zorre</u> .	
"	18-V	6h "	
"	"	6h "	
"	2-VI	6h <u>zorre</u> .	
Cortillo,	29-IV	6h <u>elviro alto</u> (faible en liste S).	
Huerte	20-VI-34	5h.	
"	8-V-34	6h	
"	20-V-34	7h.	
"	15-V-34	7h.	
"	25-V-"	6h	
"	10-V-34	5h -	
"	18-V-34	6h	
"	22-V-34	5h	
"	6-V-34	6h	
"	15-V-34	7h	
"	2-VI-34	7h	
"	2-V-34	2h	
"	2-V-34	5h	
"	23-V-34	5h	
"	20-VI-34	9h	
	15-V-34	2h. <u>chup.</u>	
<u>Sturnus unicolor</u>	Silos.	7-VI	6h
P.	"	27-VI	5h
P.	"	12-V-	4h <u>Tijado. 15m.</u> (Ch). P.
"	9-V	4h. " 15m	
"	12-V	5h	
"	12-V	5h "	
"	9-VI	3h <u>cúpula iglesia 2^o puente</u>	
"	25-V	5h <u>Tijado</u> <u>especial.</u>	

Según las notas de SD. es migrante. No se mencionaron todos los negros" dice en 24-VIII señalando negrilla de vulgaris. "Vulgaris pica a unicolor".

Unicolor negrilla de eterninos en 15 junio Moro-39 (pájaro) (negro)

Vea Nauja - 28-III-1939 influido por Feto luego? JAV

Pur-pur

ch

F cobellos.

Silos 21-V 5h Pur

~~Silos~~ 23-V-34 9h. Silos 11-VI-38 3h. Fr. abandonado. liquenato
" 24-V-34 9h. " 23-V-38 5h. Bast. tib. 5 mm.

Cortijo de la Cava, 21-V-34, 9h. B. crassus. 3 mm.

Cerrojillo. 28-V 5h. estéril

Silos 5-VI 5h. espino bajo

Pedriza, 9-V-34, 6h. bastante

~~26-V-34~~ 6h. estéril Fr.

Canduelis (prob. C. canduelensis) Huerto 21-V. 5h.

ch

ch

Senecio

Silos

17-V. 4h arbolillo. (vea chardinet. ch),

ch

Poncer domésticas

Silos 11-VI 5h. teñidos

Huerto 23-VI-34 6h.

" " " " "

" " " " "

" 30-VI-34 4h. "

Castillo. 30-VI-34 4h

" " " 6h.

Petrerius

Silos 25-VI-34. 9h + 10h = 25 mm.

" 26-VI-34. 5h. 3B. 2F. hueco profundo. Pelo manífero, yerbas y trozos. 4 huecos.

ch { E. calandrinia.

Silos 23-VI 4h suelo

T. Medellín 12-VI-34. 4h.

VI-34 4h. yerba?

ch { E. ciliata.

Cerrojillo. 8-VI 4h material

" " " "

D. E. ciliata cie. 5 huecos
3 en orillas orugas y otra

hueco. fecales. suelo.

Mar 5/4-21-26 junio a 26 Mayo

Ch { E. catinella (ch. piene que verdades con h de E. ciliata hoy de E. catinella
en 2 huecos más)

Lista de aves.

Coturnix curax.

Coturnos. ♂ 26-V-54, n. 412, (429 ya). Colmena Z-1. Ocio nro 28.
Puentec.

Coturnix. cont.

P. Silos. 19-V-34 3h

" " 3h

" " 3h

" 20-V-37 4h

" " 4

" " 4

Silos 17-V-37 3h

" " 3h

" " 4h

" 20-V-34 6h

" 20-V-37 4h

Huerta Z-V-34 2h.

Silos, carretera de Corazo 3-VI-54, a
3'5 m. de altura, en ... con 5h
cañones frescos.

Silos. - Ruinas S. Francisco 16-V-54,
con 4h. Pájaros, nido en hueco muro,
de palos, int. de lava.

Ví nidos. - No recuerdo nidos. Pero quizás desaparecieron *Phoenicurus*.
Muy dátiles. (SG).

N. nidos -

Ph. phoenicurus, 2 MN. 1 PN. (nido).

P. (Ch). Huerta 24-V. 4h. Piso 10m. La indicación más exacta. (prob. envío con la P.
de Corvo anotada), en fecha 2-VIII dice "evidentemente *P. graculus*," pero después
dice otras *P.* indistinguibles.

P. Silos. 23-IV-36 4h.

Ví nidos. Yela etc. -

P. graculus.

Mur. Mur. hay de silos? ?

Ver en el anterior.

anterior visto puentec 5h, con
5-6 días incubación (calera y espaldas). Nido con
> 5 m. (1050 m. sobre el mar) hacia los charros,
ext. halos rojos + alguna raya. Int. gran
mancha leona apelmazada, y otras manchas de
color ocrea (algunes). 19-IV-54,

SG me dice los hay algunos sitios. No veo.

Pica pica melanotos, 3 MN. 1 M + 1 Pt.
mancha blanca. Confundir ♂ invierno e ♀ verano

Entre ellos gran diferencia extensión
y hay nidos anteriores.

(SD) ♂ huerto 17-III-41.

Muy grande, encerrado muerto. Est. restos de césped (algos),
ver lista 14. - Muy cerca valle, no en monte.

Sturnus unicolor, 2 Pt. + varijs

st. vulgaris. Varijs multitud.

Algunos plomos no los distinguo bien. Parten 1º quincena III, al día
siguiente de la llegada de los negros" = unicolor en 1939. (SD).

Villanueva de la Sierra. 3-IV-35.

Oriolus. ♂ ad. Mt. Poco escaso nublo (SG) pero otros años no es raro verlos.

F. cuellos ♀ MN.

P. Silos 21-V 5h. Piso [Ch].

.. 23-V 4h

.. 24-V 3h.

" 11-VI 3h con pocos. -abandonado.

" 23-V. 9h. Bastante nublados. Tito 5 mos.

Cantocenio. 21-V 9h. Bastante nublado. 3 mos.

{SD). "abundantes huerto desde mid-III, mos duermen allí, otros van al monte en
cuadrillas. En 1925, finales III, tras frío y nieve se ven pocos huertos. Murieron?"
- Natos nulos -

Chloris chloris 2 MN.

P. Castriño 28-V 5h. estepa = cistus. [Ch]

Silos 5-VI 5h. espesos bajos (Ch)

Pedroso 9-VI 6h. B.

26-V 6h. Fr., estepa.

} Cosa habrá bastantes mos puestas.

- Natos nulos -

C. caudatus 3 MN.

P. (Ch). 21-V. Huerta. 5h.

[Prob de caudatus (Ch)]
Numerosas puestas. no distinguibles de serins y acodillos con precisión
en el Marco.

Serinus IP+. Ver puestas jilgueros.

Passer domesticus ♂ y ♀ MN.

P. Silos 11-VI 5h. tejidos (Ch)

Huerta 20-V 5h. " (Ch).

P. Huerta 29-VI-34 6h

Castriño 30-VI-34 4h

" " 4h

" " " 6h.

" " 5h

" 30-VI-34 4h.

- Natos nulos -

Petroica.

y trastelos

P. 25-VI-37. Silos. 4h + pajonillo. hueco falso. 2-3 mos. Pielos manejados. yemas

26-VI-39 " 3h. 2F y 3B. " " 1 nu.

Ver nota más -

4

Hasta silos.

Loxia curvirostra

♂ ad. 14-VIII-30. En la huerta, muy malo. En Octubre 1930 "El Debaté" habla de plaga en Asturias y Francia atacando manzanares (SD).
♂ ad. M.N. Cazado en la huerta en invierno, según (SG) como semillas +

Eub. calandra. 2 M.N.

P. Silos 23-VI 4h suelo (ch) + Medel 12-VI 4h
" " 4h " (ch) ? VI 4h. yemas,

SD dice de las "Pardillanas" (se refiere a E. calandra) que ~~se vienen~~ a finales II, con nieve, se encuentran sue huerta.

Eub. cirrus 2 M.N.

P. Charrigni dice que indistintamente de E. citrinelle los huevos, Coruña -
Castillo 8-VI 4h matinal (ch) que hay nidos de
" " " " (ch) citrinelle en los pueblos. Yo pienso
que : de cie, cirrus o citrinelle?
y 26 Mayo? confuso 3 a orillas arroyo 5 pueblos, fechas 5-14-21 y 26 Junio

de cirrus no habrá tot. de cirrus en el suelo y otros en huerta. Los crece
Ver notas misas -

E. cie. Ver notas misas.

E. citrinelle. Ver E. cirrus en Charrigni.

Panus major 3 M.N

P. (ch). Piñille 29-V 8h. Hueco zolle

(ch) Castillo 20-VI 10h. "

(ch) Piñille 15-VI 4h "

Piñille 29-V. 15h. Hueco zolle, 2 hue-

SD. dice es muy malo y viene a comer pan en invierno. (1941)
- Notas misas.

Porus crenulatus.

SD. "Vino" en I-II-III-41.

Es más desconfiado que P. Major".

P. atter

P. cristatus ; Notas misas.

Rouacus regulus 1 MN. IP+ 11-IV-32. Silos. La fecha indica prob. de
crie. ~~se han jincapillas en el Mato~~ - Ver nota mía. -
R. ignicollis 1 MN.
Tamias excelsus meridionalis IP+, 1 MN.

P. Silos 4-V. 5h. (Ch)

" 12-V 5h. muy inmaduros.] ~~Todos~~ en el. Chiquito, ~~no grande~~
Castillo 12-V 4h. Hay algunos huevos en el mismo tiempo.

L. senator

P. Castillo. 12-VI 4h. (Nid à terre parece Ch)
" 8-VI 3h.

L. collaris.

P. Castillo 28-VI 5h. (Ch).

Silos? 20-VI 3h 5h.

Higuera 5-VI-35, 5h. en zarza.

- 14-VI 4h. algo. Encuentro entre río, a más de 1 m.

Los 3 pueblos del río los distinguí que son el W. Huerto colapsado. Pero eran
muy típicos. Es indudable que allí está el L. sur. Sur.

Alectoris orruis

P. Huerto 4-V-34. 8h. (Ch).

Buteo?

Hay una puerta prob. de ella. La mayoría de los pueblos de
Alectoris (hay algunos) quedaron sin clasificar.

No sé si a Buteo en el Juniperatum.

Anthus campestris

P. Huerto 2-V-34

Matorral alto 1 MN y 2 PN. 6h. anay. (Ch.) y anandio o A. spinicollis? (Ch.).
Todos altos altos.

Porque es común errando (sc). - Ver notas mías -

M. curvirostra curvirostra

IP+. ♂ Silos 29-X-37

La mi común. -

Loxia curvirostra

P. Silos 14-VIII-30. En la huerta, muy numeroso. En Octubre 1930 "El Debate" habla de plaga en Arturis y Francia atacando manzanares (5 ad. MN). Cazado en la huerta en invierno, según (SO) como semillas +

Eub. calandra

2 MN.

P. Silos 23-VI 4h suelo (Ch) + Medel 12-VI 4h
 SD dice de las "Pardillanas" 4h " (Ch) ? VI 4h. yerba.
 en la huerta desde 10-III-25 (se refiere a E. calandra) que ~~se vivían~~
Eub. cirrus 2 MN. a finales ~~II~~, con nieve, se encuentran sus nidos.

P. Chalogni

dice que vio nidos quiblos de E. citrinelle los huevos. Corriente -
 Castillejo 8-VI 4h natural (Ch) que hay nidos de
 " " " " (Ch) citrinelle en los pueblos. Yo pienso
 Hay de cie. cirrus o citrinelle? 5 huevos, fechas 5-14-21 y 26 Junio
 4-26 Mayo? cupidos 3 a orillas arroyo en el suelo y otros en huerta. Los crez
 de cirrus no habrá tantos. Ver notas más -.

E. cie.

Ver notas más.

E. citrinelle

Ver E. cirrus en Chalogni.

Parus major

3 MN

P. (Ch). Piñilla 7-8 P+

(Ch) Castillejo 29-V 8h. Hueco zolle

(Ch) Piñilla 20-VI 10h. "

(Ch) Piñilla 15-VI 4h "

Piñilla 29-V. 15h. Hueco zolle, 2 huevos

SD. dice

es muy numeroso y viene a comer para en invierno. (1941)
 - Notas más.Parus cristatus

SD. "Viene en I-II-III-41.

Es más desaparecido que P. Major". a comer han desaparecido con el buen tiempo.

P. atterP. cristatus

notas más.

Regulus regulus 1 MN. 1 P+ 11-IV-32. Silos. La fecha indica pub. de
cinc. ~~No hay spicilegus en el Museo.~~ - Ver nota mía. -
R. ignobilis 1 MN.
Tamias excelsus meudonialis 1 P+, 1 MN.

P. Silos 4-V. 5h. (Ch.)

" 12-V 5h. muy inmaduros. } todos en sol. Chiquito, ~~ligeramente~~
Castillo 12-V 4h. Hoy algunos huevos en el Museo también.

L. senator

P. Castillo. 12-VI 4h. (Nid à terre puro Ch.)
" 8-VI 3h.

L. collaris

P. Castillo 28-VI 5h. (Ch.).

Silos? 20-VI 36 5h.

Higuera 5-VI 55 5h. en zarza.

— 14-VI. 4h. algo. Encina orilla río, a más de 1m.

Los 3 puestos del río los dirijo que son el Wittenberg ~~desaparecido~~. Pero eran
muy típicos. Es indudable que allí esto el Linn. Sur.

Alaudides ornatus

P. Huerto 4-V-34. 8h. (Ch.).

Buteo?

Hoy una puesta prob. de ello. La mayoría de los puestos de
alaudides (hay alguno) quedaron sin clarificar.

No sé si a butebo en el Juniperatum.

Anthus campestris

P. Huerto 2-V-34

Matorral alto 1 MN y 2 PN. 6h. anay. (Ch.) y andino o A. spinolletti? (Ch.).

Parece es común errando (sc.). — Ver notas mías —

M. curvirostra curvirostra

1 Pt. ♂ Silos 29-X-37

La mi común. —

Silos.

Muscicapa hypoleuca, ♀ NN

- Notes unis -

Hypoleucus fuligineo -

P. Lantillo 12-VI 5 h. (ch)

Pedrera 3-V 4 h. zonas. algo

Pedrera 3-VI 5 h. (ch). Espino bajo, en suelo.

" 3-V 5 h " "

Silos 12-VI 4 h algo. chico.

10-VI 4 h. algo; noble?

Pinilla 27-V 4 h. algo.

Cettia cetti

P - Silos 12-VI-34 5 h. Mata bajo matorales

yo uniu

" 29-V-38 4 h. " " Frescos,

Syntis communis

P. Silos 1-VI 5 h. (ch)

Silos 7-VI 5 h. algo

" 3-VII 4 h. (ch)

" 6-VI 5 h Fr. extensa

Huerta 3-VII 4 h. (ch)

" 20-VI 5 h. Bast. "

" 2-VI 4 h. (ch) Espino bajo cerca

" 1-VI 5 h. Fr. espino bajo.

Pedrera de Rio Ureel 4 h. (ch). arroyo. Bastante.

" 20-VI 4 h. " " " 30 cms.

Silos 14-VI-34, 5 h. Bastantes

2 pares " 7-VI Bastante

" 1-VI-36 5 h.

" 8-VI = 5 h Fr.

20-VI 5 h. Muy.

28-V 4 h. Espino 60 cms.

Syntis atricapilla

P. [ch]. Silos 26-X-36.

Castro 5-VI 4 h. raro. (Notes confundir con Syntis borin?).

Syntis borin 2 MN.

Hay voces parecidas a ella. (un 3-4) pero hay la duda de atricapilla. - Silos 16-VI-38 4 h. espino 0'5 m. Bastante.

Ph. phoenicurus? ♂ P+?

Motacilla solitaria. Viven solas en la Yedra en IX.

M. saxatilis. Vive ♀ MN y varios juv MN. Vagabundos juntos anidando tejado, matorros de ~~styrax~~ (PSG). Es rarísimo.

Ph. ochraceus ♂ P 27-III-3♀. Silos.

P. Huerte 24-VI 4h. agujero naco. (Ch).

Silos 8-VI-35 4h. F.

" 4-IV. 4h. Agujero naco a 2'5 mts. incidiendo.

" 21-V-37 5h. Barrante. Agujero pared 3'5 mts.
2-VI-38 4h. Fr.

" " 1 mts.

Turdus merulae

♂ juv. MN y ♀ Pt.

P. - Silos 20-V 4h.

- .. 22-V 4h

" 28-V 4h

" 15-V 5h

Castillo 20-V 4h.

" 2-VI 4h.

Silos 15-IV 5h.
" 30-V 5h.
" 13-V 5h
[Ch].

→ yedra, 3 mts, en la huerta

" 30-V 5h

" 13-V 5h

6-V-39 4h. algo. Yedra pared a 2'5 mts

ext. yerba + hojas gruesas.

int. " " finas.

Silos 10-V 4h. Fr. Yedra 4'5 mts.

" 8-V 3h. Poco. yedra 2'5 mts.

" 1-V 2h. Barrante. Yedra 2'5 mts.

" 13-VI 3h.

Turdus viscivorus

♂ M+

P. Huerte 20-V 5h.

" 3-V 5h

" 20-V 5h.

" 22-V 4h.

" 7-V 3h.

Cathartes 27-V 4h.

Huerte 1-V 3h.

" 7-V 2h

" 12-V 4h

Silos 20-IV 4h.

" 12-V 4h

" 15-VI 2h. Muy.

Horterio 9-V 5h. Rama pino 4 mts. ext. espigas

Duscinia MN

P. Castillo 4-VI 4h. (Ch)

Silos 31-V 4h. Fr. Mata lejía, cerca suelo.

" 4-VI 6h. (Ch)

" 28-V 4h. 1m. espesas = cebros semidespuntados,

Huerte 5-VI 4h. (Ch)

tanto al suelo / Ext. hojas duras

Silos. - 20-V-38 4h Fr. mata

Fresco. — int. yerba seca.

ext. hojas gruesas

medio matorro fino

int. hoja fina

hoja, 2 mts.

" 4-VI 3h. algo.

EuthacusLuscinia (cont.).

H. Primer vuelo anualdo 1/2 SD.

1931	23-IV	38	21-IV
1932	20-IV	39	21-IV
33	27-IV	40	21-IV
34	16-IV	41	26-IV
35	20-IV	42	23-IV
36	23-V		
37	22-IV		

Euthacus 3 MN y 1 Pt. (σ Silos 10-XII-33)

SD. Inician sus vuelos III; en IV desaparecen. Si se meten varios en el invernadero, se matan entre ellos. En viene con muy pocas.
Vi 2 en Montijo el 13 de Noviembre '30.

Sax. troquata ♀ M.

P.- Lastrilla	12-V 4h (ch)	Silos	12-VI-35 5h. Bortante
"	26-IV 4h (ch)	" "	15-VI 4h. algo?
"	12-V 4h. (ch)	los Vados	22.VI 6h. Fr. Matanza.

Oceanthe ♀ Pt. Petacolva 19-V-34. 2^o primaria. Gran nictemero que le fija

P. Huerta	3-VII	6h	petacolva (ch)	
"	6-VI	4h	" (ch)	Petacolva 20-V 6h horad. (ch)
Lastrilla	9-VI	5h.	horad (ch)	
"	6-VI	5h	"	
"	20-VI	5h	"	

Troglodytes

P. Silos 25-V 5h. (ch).

" 5-V 5h. yedia 3 ues. Muy nictemero [ext. hojas + hierba + rama go my friends]
 " 24-V 6h. Fr. hueco horad bajo arriete. [int. plumillas]

" 31-V 5h. Fr. Huerte

Ciudus ciudus

1 MN + 2 Pt. (jue y viernes). Nido.

P. Silos. 9-IV 5h. (ch).

Hay 20 huecos puestos mas.

JAV

Himantura rusticus 1 Pt.

Llegada. (SD).

19-31 - IV - 4	26-III-38	29-III-39.
32 - III - 25	25-III-40	(Perdieron pero quedó alguno en los Porqueros)
33 - III - 25	5-IV-41	
34 - IV - 12	3-IV-42.	
35-24-11		
36 - 9 - IV	27-III-43. (En Burgos el 23-III)	
37 - 8 - IV		

Notas nrios -

Chelidonia rusticus MN.

P.	Silos	4-VI	5 h. (ch)
	Castro	5-VI	4 h (ch).

Llegada.

26-IV-31	5-IV-41	(un solitario. El 16 ya más de viento)
10-IV-32	28-IV-42,	
9-IV-33		
11-IV-34 ?		
10-IV-35		
18-IV-36		
18-IV-37		
9-IV-39		

Med-IV-40

Riparia riparia. Silos (del catálogo, no se conoce el etimón)

Riparia riparia Ociucas (" " " " " " "),

Apus apus 3 MN. ♀ 22-V-43. Silos. & 175. C84 F 44 LT 182. F 413.

P. Silos. 6-VI-34 3h

" 6-VI-34 3h

" 7-VI-34 3h

— 25-VI-36 2h algo.

Llegada. (SD).

30-IV-34	3-V-32,
30-IV-33	5-V-38,
3-V-35	10-V-39,
3-V-36	5-V-40,
	5-V-41,
	6-V-42.

El 19-VII-39. Un gran bando muy alto por la tarde

20-VII-39. Bando por la mañana.

Cafius nubilus

Nietos de los que viven en la Yecta, de SD.

23-IV-34

8-IV-33

28-III-39

19-III-42.

El 8-X-42 Hay todo tipo de bandos en la Yecta, a favor de mucha lluvia y frío a fines IX. ; se alude a los del Tenuel de la Yecta en otros sitios.

✓

Caprimulgus europaeus, M ♀. Q. 193. Silos.

C. anticollis

M.N. ♂ Prob. Carazo 16-V-43. ♀ LT 280, a 135. t 574, c 1408.)

Una puesta Huerto 10-V-34 2b. parecida al por lo difuso del punteado.

M.N. ♂ Silos 16-VI. a 290

Uipucte. 3 p. M.N.

Parece no ser extraordinariamente común.

Circus aeruginosus

Ibar M.N.

Es el único que se ha seguido al posar.

Cuculus canorus

14 cantos (SD). en silos.

18-IV-31

22-IV-38

18-IV-32

22-IV-39

15-IV-33

(ya el 9, de inform.).

16-IV-34

20-IV-40

19-IV-35

23-IV-42 (Huayopán).

1-V-36

18-IV-37.

Clamator glandarius, ♂ ad. Manzanar. (Se cataloga como Coracias americanus)

Es al posar el único visto. — Chiriquí manzanar sorprende por no encontrarlo en los puestos corrido. — Yo también vi.

Merops apiaster ♂ ad. Covarrubias 5-V-47.

L.T.=292; a=152. T=16. P=36. e=124.

♂ ad Retuerta 21-VI-48. Segundo visto, prob. en el nido

Lt. 290. - a. 157. c 120 T 14 P 35. cont. est. vacío (yo tenido vivo) JAV

Parece que solo en estos últimos años se les ve en la región.

Aleudo et his 1P+ 2M+ 1N.

P. contillo. 3-VI-34 7h fresco, en la Peña del colgar
Ver nota más

Jynx torquilla tenuirostris P. ♂. Huerta del Rey. 16-VII-34. Q. 84-86 + 20 c 67 P 15.
Es común viendo su contillo de la Reina y en Silos (SG),

Picus 3 MN (2 ♀ 1 ♂) - 3 ♂ P+ ♀ M+.

Pf Arauro de Salce. 27-V-34 9h. (Ch. extraña) por numerosas. SG ambiente de

Huerta	1-V	6h.	un nido con agujero de cueva).
..	15-V	6h.	
..	15-V.	4h.	[Pequeños, se ha roto alguno. (Ch.)]
..	2-VI	4h.	
contillo	22-V	3h.	
..	22-V	3h.	

Tepicu 10-V-38 2h F.

Dryobates major.

P. - (Ch). Huerta del Pinar. 19-V. 5b. [Indistintas alas de los de
D. medius, pueden ser de este (Ch)]

Dryobates medius. Figura en catálogo uno de Manotan. Pero no existe. Es probablemente D. major.

Otros scops. 1M+ - 2MN. ; 18-VIII-42. Silos.

P-	Huerta.	1-VI	4h.	
..		3-VI	3h.	
..		10-VI	4h.	muelo pinar.
..		10-V	4h.	" "

(Ch).

Pimilla 12-VI 3h.

Silos 17-VI-39. 4h.. ♀. agujero elenco, la ♀ se queda en el nido, con 4
coleopteros

Anio otus, 2 MN. - 1 M+ - 2 P+, (♂ 19-XI-35, contreras); ♀

♂ 6-X-33, Burgos, cont. est - 1 ratón

cine en la región (SG). No anoto fecha de cine, a 280, cuando bien duró.
Mucho (SD)

Anio flammeus 2 M+. 11-26-X-33, Quintanilla de los Vítores.

Bubo bubo hispanus, Rösch. 6M

♀ 27-X-39, Alcazar, a 440 c 268, + 92. Muñón electrocutado = cont. est.

♂ 10-XI-33, elestros y alas de maniquíe. Lt. 66%

9-IV-39, Aquilas de campo, a. 440 c 260 Lt 620. Fue

2 caronato. a. 420 c 259, + 88. Lt. 615. (Fue curvado)

P.- Silos 24-II-38. En "los charcos", Jerez. 6 yrs. Lengua vueltas dos de
incisivos, y cubre la ♀. Medidas. $59 \times 47 = 70$ grs. $59 \times 46 \frac{2}{3} = 67$ grs.
y $58 \times 47 \frac{1}{3}$, 70 grs. Sólo estos 3. El resto que se trataban sobre la
tierra desecada. Hacía un borde de pelos y mucho muy grueso.

Tyto alba 3 MN - 1 P+ - 1 MN.

la respuesta son de los inmediaciones, creo que 1 o 2 eran fase narda.

Athene, 4 MN - 2 pell MN.

P.- Pedrera 5-IV-34 4h. | Hay dud. dnde de si son de tyto o Otus. swb.

Huerte 3-IV-34 4h.

Strix aluco, 2 M+ - pectorales gris y roja. Ojos de castillo, de la Reina.

P. Huerta 12-V 4h. Peñascos a 14 mrs. (Ch).

Falco peregrinus brookei

- a/ P. ♀ ad. ligeramente 11-XII-34. A. 305. Fauna oscura, Brooke. (sus autores a 370, c. 178).
 b/ MH ♀ ad. j. Silos 28-II-41? A. 335. C. 175. Fauna clara de Brooke. Tiene manchas
 oscuras en la nuca, pero las inferiores casi blancas y bigotes más oscuros. Fronto sólid.
 c/ MNO♂?. A. 261. Fauna más oscura de Brooke, a que son indistinguibles de
 las de aquella. La ♂, pequeño peregrino, con el cráneo bien desarrollado,
 lont. ext. de la ♂. yernos y un trozo de hilo negro (prob. polvillo).
 PS. oídos propios Huerta (eludido una puesta).

Falco subbuteo. Mío en catálogos. No esté ahorr.

Falco tinnieulus

P.- 2 M Silos. - 3 MN - 2 M + 2 P+. Varios setos fuertes.

(ch)	Huerte	3-VI	8 h. 6	
	"	3-VI	8 h. 5	ch extraña y SG confirma el nro. Estaban en zonas
	"	20-VI	5 h.	a 10 mts. y eran los dos únicos nidos del cordón.
	"	15-VI	5 h.	Rosie. 10 mts
	Castillo	24-V	4 h.	" "
	"	20-VI	7 h.	" 6 mts
	Cortocerriza	12-VI	5 h.	" "

Huerte 1-VI. 3 h.

" 18-V 5 h.
" 31-V 4 h.
" 10-V 5 h.
" 15-V 5 h.
" 28-V 4 h.

Pimilla. 24-V 5 h.

" 24-V 4 h.
" 24-V 3 h.

Castillo. 23-V 5 h.

" Cortocerriza 24-VI. 2 h.

Vu nota mis.

Falco tinnieulus naumannii, ♂ juv. Silos 5-VIII-35.

1 P+. (Esco que es de agosto y de puesta temprana).

Circus cyaneus

P. ♂. Peténecles 20-III-39. L. ext. ~ 1 T. amerulae
 Una ♀ juv. anestetizada N.

Artus palumbinus. P. o silos 50-4-34 a. 349-400, c 270 + 87. Euv. 1150.
50. Señala una rito en 31-11-39.

P. Huerta 2-VI-34 2h. pino, 14 mrs. (Ch. parte incompleta)

Accipiter nisus, 2 Pt - 4 MN. (1^o ad), creo que todos de juventino.
P. Huerte 26-VI 4h. Rocas 10 mrs. (ch. rocas inverosimil).
.. 20-VI 2h. " " (ch)
.. 30-V 1h
Huertor 3-VI 2h.

Pernis apivorus 1 MN. pectoral de gerona. tipo. de alas blancas (alas rojas muy raras).
y nuca completamente blanca. SG - es rarísimo, pero ha visto una pareja en paro.

Milvus milvus. Un ad. Hijo castillo de la Reina

Buteo 4 MN (3 mutatus + fasciatus) - 2 Pt.

P. Huerte 4-V-34 2h. pino 14 mrs. (ch).

Circus cyaneus 1 MN. No debe verle así allí (SG). El mismo dice se cobró en Manzanares.

Hieraetus pennatus

P. Huerta 3-VI-34 2h. pino 14 mrs. (ch).

? Huerte 17-VI-35 2h ? No sé si serán de él.

Oceanide chrysostomus.

a. 63. lluv. 62 mm.

P. - Huertor 5-V-35 Lt. 82F. € 340. Euv. 2068. Pico (sin cere) 42.

Parece un 3^o juv.; bastante oscuro. Muy apelillado.

. Silos a 69 lluv. 66. Ad. que muestra la calavera y los ojos
de un ave uro pálido.

Silos a 59, lluv. 62 ad. que muestra

Silos a. 67. " 65 " " "

Otro montado - Estos son ~~los~~ tipo comiente. Ninguno tiene manchas blancas ni negras.
Son todos adultos. de calavera clara, pero distantes del leonado. En la calavera
hay bastante blanco negro, muy manchado.

Puerta Hoy 2 h. $75'0 \times 55$ can blancos puros, con ratas peras pardas.
 Silos 25-IV-36. - 73×57 . Basta tanto nido duro. - Una perra criaba en
 los Hornos de Petacoba. - (Ses). Se veía con frecuencia. - Criaba marie laranzo. - Una
 marie Yesta antes del aperturado carretera. (SG). - Poco cuidado, bajo solapa, mucho ruido.
Neofregon peregrinus. Un ad MN - juv M (de dos SG desde nido y le mató en
 15 años - 1 polluelo de vida.

Puertas, ahora en la colección. —

La Horz - Silos. 25-IV-37. 2h 71×53 y $62 \times 52'5$.

Tenía 2h. que acababan de enterrar la incubación. Roce frus
 Nido oest. unos huevos palitos gruesos - interior liso y tráns. De ahí
 se cogieron los huevos los 2 años siguientes. Despues trasladaron
 los materiales a otro sitio.

Tejada : 1-V-38. (Valladolid) 2h. $69'5 \times 54$ y 62×51 . Peñón no muy alto.

Silos. - La Horz 24-IV-38. Se va cogiendo este nido varios años. Este primavera
 hace mucha calor. 2h. - 52×70 y $71 \times 52'5$, Peñón 8 mts.

Silos - La Yedra 20-IV-38 65×51 y $68'5 \times 52$.

" 10-V-38 $67'5 \times 54'5$ y $70'5 \times 56$,

" 27-IV-38. $70'5 \times 52'5$ y $72'5 \times 55$.

Fechas de llegada (SD). a Silos.

26-III-38

18-III-42

22-III-39

14-III-43. (Vito muerto).

14-III-41

Gyps fulvus. 3 MN. (Hueso de Silos). PS dice no sabe cuál de los 1000 nrs, pero
 si *Aegypius*.

Silos. - N° 5^{er} de la Peña. - 8-II-34 1h. en Roce 7 nrs. - Algo nublado (Ch)

(Ch). Huesos de Cervera - Yedra - 13-III-14 " " 20" (Ch).

" " " 13-II-14 " " 20" (Ch). Cet dernier a quelques
 petites taches, ce qui est rare chez *Gyps*, mais existe cependant quelque
 fois chez l'aigle de l'Europe (Ch) - (Uno se rompió).

Actualmente en el Museo Silos.

Silos 4-II-35 94×69 .

" 10-II-36 93×70 .

JAV

(1). El nido estaba de la Caldera, a la izquierda del río, a unos 6m del suelo. El hueso mide
 74×96 , p. 282 gr. Encubriado 10-15 días. (Sano cubriionario con líneas de rotura).

Circus cernis 4 M.N. - pob. todos de Silos.

Pueblas - Todos proceden de la torre del Monasterio, donde se juntan
de los nidos moltos siguen criando. Nido en un alto, ext. palo, 20120
Silos. 9-IV-34. 3 h. 1 la segunda puesta es de ave real, (ambas) basura etc, yerbas.
" 4-V-34 2 h. Varios días, más apuntando. Peso 84, 84 grs.
Silos. 5-IV-40. 5 h. con una ~10 días de incubación.
Castillo 3-V-34. 2 h. ligeramente incubados.

Llegadas. posiblemente todos del Monasterio. (SD).

26-11-33
1-11-34
24-11-35
14-11-36. (la otra llegó el 18-11)
7-11-37.
25-11-38
19-11-39
8-11-40.

15-11-41
15-11-42
27-11-43. Vida otra vez el día 1-111.
Este año, muy temprano, no crían y
se marchan a finales VII.

27-I-44. (Santibáñez).

Fines - II-53 (P. laurentino).

18-II-54. Llega por la tarde una, desapareció al
mismo día, y volvió 2 días después (PL)

Platalea leucorodia. Un juv M de Cordobilla - Legrotón, pueras negras
en parte.

Circus niger 1 M.N?., en muy mal estado.

SD, anota 4/8 31-III-43 llega una, (que nido más pequeño que
los blancos) y nido varios días por la Torre del Monasterio, seguido por
los otros.

SG, anideban Arlanza, Barbadillo del Mercado, cascajares, en
los peñones sobre el río y con colonias de Gyps. Los ríos así cerca de Vinuesa.

En Viniegras (Legrotón) S. de Neila (anote 15 pares en col. Gyps).
Anas cinerea 9-IV-34 P# (destrozados 2). Fechas 14-II-41 y 8-11-43.

"Todos los anidamientos se ve algunos en Silos" (SD).

SG dice que en cortijo de la Reina, entre casas verdes viejas
rio y tiene 2 h. El anidó uno, de clavo. de referir a C. juncunensis?
Igual me han dicho en Vivedondes?

Ondina purpurea ad. H + (SG dice de Santander)
juv. M +. (>G dice de Salas, Asturias).
Nycticorax 2 ad MN q + juv indent MN.
Ver G. crecer.

Botaurus ♀ ad H. Quintanilla del Río. Diciembre 1926.

Ous platyrhynchus ♀ MN | Ous platyrhynchus
G. crecer ♂ y ♀ MN - ♀ P+. | dice que se vea algunos veces en el río en invierno. (caracoles)

Alcaraván ad MN. - 2 juv MN.

Trencu me piente Nubes, no ondinas.
Vauclus 3 MN.

En bilos el 24-1-40, con frío y nieve (SD). Parece no muy común (SG).

Numenius arquata 1 MN. (no dada clarif.).

Scolopax rusticola 1 MN - 1 P+.

En invierno se ve algunas en el fondo del río, los huevos son cepo (SG).

Otis tarda ad H.F. de Pedraza de Campos.

Hay Pueras Tórtolas 20-V-24. Se consumen 1 h. 85'5 x 52. El ave
bien palido, de mandibula difusa y muy alargado de pecten. Nido, 2 h,
ext. ramitas, hojas secas, hierba, raíces y murex - int. lana, pelo, plumas,
y raicillas.

En la región de bilos no se vea, pero si cerca (SG).

Fulica atra 1 H de bilos.

F. cristata ???. Trive bien dividido lo bilo, pero no cresta.

Gallinula chloropus. 1 MN - 1 P+.

Inf. de que viene bastante Rubus río. - Ver nota mire

Crex 1 MN.

Rallus 4 MN, todos de bilos q 4 P+ en muy buen estado

P - 8-V. 7 h. bilos. (el h), (SG) dice que es muy común en verano
e inviernando en bilos. - Ver nota mire

Ch. cotonensis Castillejo. 2-VI 8 h. (ch).
 " 23-VI 12 h. prado.
 " 2-VI-34 3 h.
 Silos. 12-VIII-39. 8 h. Pocos días de incubación.
 Castillejo 20-VI-34 6 h
 " 20-VI-34 10 h.
 Pedrosa 20-VI-34 10 h.

Hoy 2 ad MN y 1 poll MN. - Dicen que muy comú
 SP. dice Vagabundo (prob oido malo) el 29-III-43.

Perdix perdix ad M. de Mecerreyes. Cuna de corarrubias. El prado es la
 unica que se ha visto por aqui. En Silos no hay.

Actitis rufa 3 MN (uno semiadulto) - 1 pt.

Puentes. -

Hontoria de Piñor	10-V-34 4 h. (ch)	Huerta	18-VI 11 h. bajo mate
Huerte del Rey.	23-V. 11 h. (ch)	Pedrosa	18-VI 7 h
Pedroso de Rio Urbel	20-VI 14 h. (ch)	"	25-VI 8 h.
Cortocenizze.	25-VI 15 h. (ch)	Cortocenizze.	18-VI 11 h.
Silos.	15-VI 15 h. (ch).		

Silos 13-VI-38. El prado. 11 h. nuna; con follaje formado. Nido bajo
 espino. Ext. tapas cortas en gran montón - 2 pt. Jóvenes de perdiz.

Pterocles orientalis ♂ M. 24-VII-44. Una ventis que les comunica al
 P. Santos que se ven en parejas y grupos en Mecerreyes y describe hábitat.

C. pallidipes 2 MN

P. Huerta 18-V-34 2 h + 1 de caprichos. (ch). Dicen que estan en
 " 1-VII-34 2 h. una cuenca de la riera. Nido de tierra, ni tech
 " 1-VII-34 2 h.

SP. anula, en 14-IV-41. Bando entre silos y Santibáñez. Vuela a la
 bellota. - ver grapis.
 Segun FR. Laurentino, hoy gran nido en Gaona-Alava.

C. canescens? Linne x domesticus?

Hoy 2 pueras, froté de ella 1 de C. venus, en el silos.

Pedroso 25-V-34 2 h.

Castillejo 14-VI-34 1 h.

JAV.

Streptopelia

? Pouee sur ramee ?

P. - Pedreira 30.1.34 1h.

Podiceps nigricollis L.M.N.

Ianus ridibundus 1 juv MN. Valladolit. } (SG). Se ven algeus solitarius
Ruise Troydotyle 1 juv MN - Silos. } por virgineus.

Sterna hirundo. Sie felue ni loco de nid. Saya PSG cobrade come
de silos. He tene " por estos rues dectos zulie."