

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE *MONOTROPA HYPOPITYS* L. EN PORTUGAL

On the distribution of Monotropa hypopitys L. in Portugal

Paulo CARDOSO DA SILVEIRA & João DOMINGUES DE ALMEIDA

Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra. Arcos do Jardim,
P-3049 Coimbra, Portugal

BIBLID [0211 - 9714 (2001) 20, 167-168]

Fecha de aceptación de la nota: 18-09-2001

Monotropa hypopitys L., *Sp. Pl.*: 387 (1753)

PORTUGAL: BL: «Góis, pr. Liboreiro», 29TNE7846, alt. 610 m, exp. ±N, «num pinhal, em solo arenoso», 2-VII-2000, P. Silveira & J. D. Almeida 2766, COI.

Durante las diversas campañas botánicas realizadas por la «Serra do Açor», herborizamos en un pinar (BL) algunos ejemplares de esta rara especie en vías de extinción, propia de matorrales sombríos y húmedos (FRANCO, *Nova Flora de Portugal*, 2: 2. 1984). En la BL había sido recolectada en «Buçaco», «Dunas do Pinhal do Urso» y en «Albergaria-a-Velha».

Además de las cuatro provincias señaladas por Montserrat MARTÍ (in *Flora ibérica*, 4: 539. 1993), esta planta saprófita también ha sido recolectada en DL y Mi.

Por todo lo anteriormente señalado y las informaciones indicadas por COUTINHO (*Flora de Portugal*, ed. 2: 547. 1939): «Matas sombrias, junto às raízes das árvores: Pinhal do Urso, Buçaco e Fundão»; SAMPAIO (*Flora Portuguesa*: 450. 1947): «Parasita nas raízes de árvores, desde o Douro à Beira (rara)»; FRANCO (*I.c.*): «CW. aren. e CN. mont.» e M. MARTÍ (*I.c.*): «(BA) (BB) BL (TM)», pensamos que la distribución más correcta de esta especie en Portugal debe ser: rara en matorrales caducifolios, pinares y eucaliptales, en las provincias del Norte y Centro: BA, BB, BL, DL, Mi, TM (0-1.100 m).




FIGURA 1: Distribución en Portugal de *Monotropa hypopitys* L.
 □ herborizaciones realizadas en el siglo xix; ■ herborizaciones realizadas en el siglo xx; ● nueva localidad.

MATERIAL

PORtUGAL: BA: «Entre Mosteiro de Fragoas e S. Miguel», 29TNE89, 26-V-1940, *R. Palhinha & Luiz G. Sobrinho*, LISU P28213. **BB:** «Matta do Fundão», 29TPE24, 7-VI-1900, *C. Zimmermann* 265, COI; «Fundão: Alcaide», 29TPE34, «Nos soutos», 5-VI-1930, *Carrisso & Mendonça* 1710, COI. **BL:** «Buçaco», 29SNE56, VI-1877, Bernardino, COI; «Dunas do Pinhal do Urso», 29SNE02, 18-V-1931, *A. Gonçalves da Cunha & L. Gonçalves Sobrinho*, LISU P28214; «Albergaria-a-Velha», 29SNF4305, «num eucaliptal, abundante», 9-VII-1975, *A. Serra, F. Mota & Bernardino*, PO 21249 (ALMEIDA DA SILVA & CARVALHO in *Bol. Soc. Brot.*, sér. 2, 62: 192. 1989). **DL:** «Vila Nova de Gaia: S. Cristóvão de Mafamude», 29TNF35, 18-V-1880, *Manuel Albuquerque*, PO: GS 6555; *Ídem*, 18-V-1880, *Isaac Newton*, PO: GS 6556. **Mi:** «Esposende: Ofir», 29TNF19, «num pinhal», 9-V-1995, *Jesus Izco & José Carlos Costa*, LISI. **TM:** «entre Bragança e Macedo de Cavaleiros, na Serra da Nogueira, Cruzes x Mosqueiro», 29TPG71, «Numa mata de *Quercus pyrenaica*», alt. 1.100 m, 22-VI-1988, *M. Graça Leitão Serra, Fátima Costa & Amadeu José* 127, LISU 152756.

AGRADECIMIENTOS

A los responsables de los herbarios consultados (AVE, BRESA, COI, ELVE, HVR, LISE, LISI, LISU, PO).